

**ONAM FORMU**  
FSER-C330-02-21-V04

Damardan ve kas içi enjeksiyon uygulaması sırasında, işlemin tüm basamaklarının doğru yapılmasına rağmen aşağıdaki yan etkiler görülebilir. Bunun en büyük sebebi, kişisel(anatomik,fizyolojik,...) yapısal farklılıklarıdır.

**A)Enjeksiyon Yöntemiyle İlaç Vermenin Genel Sakincaları:**

\*Bazı durumlarda enjeksiyon ile ilaç **verilmez**.Örn: Kan sulandırıcı ilaç kullanımı, verilecek ilaca karşı daha önce alerji gelişimi.....

1. Alerjik reaksiyonlar, bayılma, kalp-solunum durması, şok ve ölüm,
2. İğne kırılabilir,
3. Enjeksiyon yerinde ağrı, kanama, doku hasarı.
4. Deride geçici ya da kalıcı morarma,
5. Apse (cerrahi müdahale gerekebilir),
6. Sıratik sinir veya diğer sinirlerde zedelenme sonucu bacakta uyuşma, güç kaybı, felç...

**B) Damardan Enjeksiyonun Yukarıdakilere Ek Olarak Yan Etkileri:**

\*IV ilaçın verilmesine engel durumlar (kolda ödem, ilaca karşı daha önce alerji gelişimi vs.) varsa bu enjeksiyon **yapılmaz**.

1. İlacın damar dışına verilmesi durumunda ağrı, şişlik ve enfeksiyon gelişebilir
2. Damar içi pihtilaşma,
3. Damara hava girmesi (hava embolisi-ölümçüldür)
4. Komşu sinire zarar verme,
5. Enfeksiyon sonucu damar boyunca ağrı, kızarıklık, şişlik,
6. İlaç atardamara verilebilir,
7. Damar patlayabilir,
8. Kan basıncı yükselebilir.

**Bu İşlemenin Alternatifleri Var Mıdır?:** İlaç ağızdan verilebilir.

.....İlacının/İlaçlarının uygulanmasını, yukarıda yazılı olarak belirtilen oluşabilecek her türlü yan etkileri bilerek, aklım başında, kendi rızam ile kabul ediyorum.

Hasta Adı Soyadı:  
İmzası :

Doktor Adı Soyadı:  
İmzası :

Tarih:..../..../20.....  
Saat:.....:.....

Uygulamayı Yapan Adı Soyadı:  
İmzası :