

Диффуры, дз — 4

Бурмашев Григорий, БПМИ-208

22 марта 2022 г.

## Номер 1

а)

$$\begin{cases} x' = 2x + y - 2z \\ y' = -x + z \\ z' = 2x + 2y - z \end{cases}$$

Ищем собственные векторы:

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & -2 \\ -1 & 0-\lambda & 1 \\ 2 & 2 & -1-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + \lambda^2 - \lambda + 1 = -(\lambda^2(\lambda-1) + \lambda - 1) = -(\lambda-1)(\lambda^2+1)$$

Получаем корни (все кратности 1):

$$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = i, \lambda_3 = -i$$

Получили парное  $\pm i$ . По аналогии с семинаром, можем рассматривать только один из них, оставим  $i$ . Подставляем  $\lambda_1$ :

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & -2 & 0 \end{array} \right) &\sim \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ \begin{cases} x = -y \\ z = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Тогда берем вектор:

$$h_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Подставляем  $\lambda_2$ :

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 2-i & 1 & -2 \\ -1 & -i & 1 \\ 2 & 2 & -1-i \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \left( \begin{array}{ccc|c} 2-i & 1 & -2 & 0 \\ -1 & -i & 1 & 0 \\ 2 & 2 & -1-i & 0 \end{array} \right) &\sim \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1-\frac{i}{2} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{cases} x + z(-1 - \frac{i}{2}) = 0 \\ y = -\frac{z}{2} \end{cases}$$

Тогда берем вектор:

$$h_2 = \begin{pmatrix} 1 + \frac{i}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

Поработаем с комплексными корнями:

$$x_{h_2} = \left(1 + \frac{i}{2}\right) \cdot e^{it} = e^{it} + \frac{i}{2}e^{it} = \cos t + i \sin t - \frac{\sin t}{2} + \frac{i}{2} \cos t$$

$$y_{h_2} = -\frac{1}{2}e^{it} = -\frac{\cos t}{2} - \frac{i}{2} \sin t$$

$$z_{h_2} = \cos t + i \sin t$$

Итого:

$$x = -1 \cdot C_1 \cdot e^t + C_2 \cdot \left(\cos t - \frac{\sin t}{2}\right) + C_3 \cdot \left(\sin t + \frac{\cos t}{2}\right)$$

$$y = 1 \cdot C_1 \cdot e^t + C_2 \cdot \left(-\frac{\cos t}{2}\right) + C_3 \cdot \left(-\frac{1}{2} \sin t\right)$$

$$z = 0 \cdot C_1 \cdot e^t + C_2 \cdot (\cos t) + C_3 \cdot (\sin t)$$

**Ответ:**

$$x = -1 \cdot C_1 \cdot e^t + C_2 \cdot \left(\cos t - \frac{\sin t}{2}\right) + C_3 \cdot \left(\sin t + \frac{\cos t}{2}\right)$$

$$y = 1 \cdot C_1 \cdot e^t + C_2 \cdot \left(-\frac{\cos t}{2}\right) + C_3 \cdot \left(-\frac{1}{2} \sin t\right)$$

$$z = C_2 \cdot (\cos t) + C_3 \cdot (\sin t)$$

b)

$$\begin{cases} x' = x - y - 4z \\ y' = -2x + 2y + 12z \\ z' = x - y - 5z \end{cases}$$

Ищем:

$$\begin{vmatrix} 1 - \lambda & -1 & -4 \\ -2 & 2 - \lambda & 12 \\ 1 & -1 & -5 - \lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 - 2\lambda^2 - \lambda = -\lambda \cdot (\lambda + 1)^2$$

Получаем  $\lambda_1 = 0$  кратности 1,  $\lambda_2 = -1$  кратности 2. Считаем для  $\lambda_1$ :

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -4 & 0 \\ -2 & 2 & 12 & 0 \\ 1 & -1 & -5 & 0 \end{array} \right)$$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x = y \\ z = 0 \end{cases}$$

Берем:

$$h_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Считаем для  $\lambda = -1$ :

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & -4 & 0 \\ -2 & 3 & 12 & 0 \\ 1 & -1 & -4 & 0 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = -4z \end{cases}$$

Берем:

$$h_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ранг матрицы 2, значит хотим еще присоединенный вектор

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & -4 & 0 \\ -2 & 3 & 12 & -4 \\ 1 & -1 & -4 & 1 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x = -1 \\ y + 4z = -2 \end{cases}$$

Тогда берем:

$$h_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ -6 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Получаем решение:

**Ответ:**

$$\begin{aligned} x &= 1 \cdot C_1 \cdot e^{0t} + C_2 \cdot (0t - 1) \\ y &= 1 \cdot C_1 \cdot e^{0t} + C_2 \cdot (-4t - 6) - 4 \cdot C_3 \cdot e^{-t} \\ z &= C_2 \cdot (t + 1) + 1 \cdot C_3 \cdot e^{-t} \end{aligned}$$

с)

$$\begin{cases} x' = 2x + 6y - 15z \\ y' = x + y - 5z \\ z' = x + 2y - 6z \end{cases}$$

Решаем:

$$\begin{vmatrix} 2 - \lambda & 6 & -15 \\ 1 & 1 - \lambda & -5 \\ 1 & 2 & -6 - \lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 - 3\lambda^2 - 3\lambda - 1 = -(\lambda + 1)^3$$

Получаем  $\lambda_1 = -1$  кратности 3. Смотрим:

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 3 & 6 & -15 & 0 \\ 1 & 2 & -5 & 0 \\ 1 & 2 & -5 & 0 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$x + 2y - 5z = 0$$

Ранг матрицы равен 1, значит есть два собственных вектора. Но нам нужно найти тот с.в, у которого есть присоединенный, заметим из нашей матрицы, что мы хотим:

$$\begin{cases} 3x + 6y - 15z = 3a \\ x + 2y - 5z = a \\ x + 2y - 5z = a \end{cases}$$

Потребуем, чтобы вектор  $(3a, a, a)$  был собственным вектором. Например, возьмем  $h_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ . Теперь второй можно взять произвольно, лишь

бы он был линейно независимым. Например  $h_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ . Тогда сам присоединенный к  $h_1$ :

$$x + 2y - 5z = 1$$

Подходит:

$$h_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Тогда получаем решение:

**Ответ:**

$$x = 3 \cdot C_1 \cdot e^{-t} + C_2 \cdot (3t + 1) \cdot e^{-t} + 5 \cdot C_3 \cdot e^{-t}$$

$$y = 1 \cdot C_1 \cdot e^{-t} + C_2 \cdot (t + 0) \cdot e^{-t}$$

$$z = 1 \cdot C_1 \cdot e^{-t} + C_2 \cdot (t + 0) \cdot e^{-t} + 1 \cdot C_3 \cdot e^{-t}$$

d)

$$\begin{cases} x' = x + y - z \\ y' = -x + 4y - 2z \\ z' = -2x + 5y - 2z \end{cases}$$

Считаем:

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & -1 \\ -1 & 4-\lambda & -2 \\ -2 & 5 & -2-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + 3\lambda^2 - 3\lambda + 1 = -(\lambda - 1)^3$$

Имеем  $\lambda_1 = 1$  кратности 3. Смотрим:

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -2 & 0 \\ -2 & 5 & -3 & 0 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Ранг матрицы 2, будет 1 собственный вектор, значит нужно еще будет взять присоединенных:

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ y - z = 0 \end{cases}$$
$$\begin{cases} x = y \\ y = z \end{cases}$$

Берем вектор:

$$h_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ищем присоединенный:

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & -2 & 1 \\ -2 & 5 & -3 & 1 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} -x + 3y - 2z = 1 \\ y - z = 1 \end{cases}$$

Возьмем тогда:

$$h_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$



Ищем второй присоединенный:

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -1 & 2 \\ -1 & 3 & -2 & 1 \\ -2 & 5 & -3 & 0 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Отсюда:

$$\begin{cases} -x + 3y - 2z = 1 \\ y - z = 2 \end{cases}$$

Положим тогда:

$$h_3 = \begin{pmatrix} 8 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Получаем решение:

**Ответ:**

$$x = 1 \cdot C_1 \cdot e^t + C_2 \cdot (t + 2) \cdot e^t + C_3 \cdot \left( \frac{t^2}{2} \cdot 1 + t \cdot 2 + 8 \right) \cdot e^t$$

$$y = 1 \cdot C_1 \cdot e^t + C_2 \cdot (t + 1) \cdot e^t + C_3 \cdot \left( \frac{t^2}{2} \cdot 1 + t \cdot 1 + 3 \right) \cdot e^t$$

$$z = 1 \cdot C_1 \cdot e^t + C_2 \cdot (t + 0) \cdot e^t + C_3 \cdot \left( \frac{t^2}{2} \cdot 1 + t \cdot 0 + 1 \right) \cdot e^t$$

## Номер 2

$$\begin{cases} x' = 3x - 5y - 2e^t \\ y' = x - y - e^t \end{cases}$$

Решаем сначала однородную систему:

$$\begin{cases} x' = 3x - 5y \\ y' = x - y \end{cases}$$

Смотрим:

$$\begin{vmatrix} 3 - \lambda & -5 \\ 1 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 2\lambda + 2$$

Хотим:

$$\begin{aligned} \lambda^2 - 2\lambda + 2 &= 0 \\ (\lambda - 1)^2 &= -1 \end{aligned}$$

Отсюда корни:

$$\lambda_{1,2} = 1 \pm i$$

Можем один откинуть, т.к. они сгруппируются в итоге, найдем для  $1 + i$ :

$$\left( \begin{array}{cc|c} 2 - i & 5 & 0 \\ 1 & -2 - i & 0 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{cc|c} 1 & -2 - i & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$x - y(2 + i) = 0$$

Тогда берем:

$$h_1 = \begin{pmatrix} 2 + i \\ 1 \end{pmatrix}$$

Тогда:

$$x_{h_1} = (2 + i) \cdot e^{(1+i)t} = 2e^t \cdot e^{it} + ie^t \cdot e^{it} = e^t(2e^{it} + ie^{it}) = e^t \cdot (-\sin t + 2\cos t + 2i\sin t + i\cos t)$$

$$y_{h_1} = e^{(1+i)t} = e^t \cos t + e^t \cdot i \sin t$$

А отсюда:

$$x = C_1 \cdot e^t(-\sin t + 2\cos t) + C_2 \cdot e^t \cdot (2\sin t + \cos t)$$

$$y = C_1 \cdot e^t \cos t + C_2 \cdot e^t \cdot \sin t$$

Теперь решаем неоднородную часть:

$$\begin{cases} x' = 3x - 5y - 2e^t \\ y' = x - y - e^t \end{cases}$$

Ищем решение в виде:

$$\begin{cases} x_1 = A \cdot e^t \\ y_1 = B \cdot e^t \end{cases}$$

Тогда:

$$\begin{cases} x'_1 = A \cdot e^t \\ y'_1 = B \cdot e^t \end{cases}$$

Подставляем:

$$\begin{cases} A \cdot e^t = 3A \cdot e^t - 5B \cdot e^t - 2e^t \\ B \cdot e^t = A \cdot e^t - B \cdot e^t - e^t \end{cases}$$

$$\begin{cases} A = 3A - 5B - 2 \\ B = A - B - 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} A = 1 \\ B = 0 \end{cases}$$

А значит

$$\begin{cases} x_1 = e^t \\ y_1 = 0 \end{cases}$$

Итого:

**Ответ:**

$$x = C_1 \cdot e^t(-\sin t + 2 \cos t) + C_2 \cdot e^t \cdot (2 \sin t + \cos t) + C_3 \cdot e^t$$

$$y = C_1 \cdot e^t \cdot \cos t + C_2 \cdot e^t \cdot \sin t + 0$$

## Номер 3

$$\begin{cases} x' = -2x + y + t \ln t \\ y' = -4x + 2y + 2t \ln t \end{cases}$$

Для начала решим однородное:

$$\begin{cases} x' = -2x + y \\ y' = -4x + 2y \end{cases}$$

Смотрим:

$$\begin{vmatrix} -2 - \lambda & 1 \\ -4 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2$$

Получаем  $\lambda_1 = 0$  кратности 2. Теперь смотрим собственный вектор:

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & | & 0 \\ -4 & 2 & | & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & | & 0 \\ 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$
$$2x - y = 0$$

Берем:

$$h_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Ищем присоединенный:

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & | & 1 \\ -4 & 2 & | & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -2 & 1 & | & 1 \\ 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$
$$-2x + y = 1$$

Берем:

$$h_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 2 \end{pmatrix}$$

Тогда:

$$x = 1 \cdot C_1 \cdot e^{0t} + C_2 \cdot \left(t + \frac{1}{2}\right) e^{0t} = C_1 + C_2 \left(t + \frac{1}{2}\right)$$
$$y = 2 \cdot C_1 \cdot e^{0t} + C_2 \cdot (2t + 2) e^{0t} = 2C_1 + C_2(2t + 2)$$

Ну и по методу вариации постоянных:

$$x = C_1(t) + tC_2(t) + \frac{1}{2}C_2(t)$$
$$y = 2C_1(t) + 2tC_2(t) + 2C_2(t)$$

$$x' = C_1'(t) + C_2(t) + tC_2(t)' + \frac{1}{2}C_2(t)'$$

$$y' = 2C_1(t)' + 2tC_2(t)' + 2C_2(t)' + 2C_2(t)$$

Подставляем:

$$\begin{cases} x' = -2x + y + t \ln t \\ y' = -4x + 2y + 2t \ln t \end{cases}$$

$$\begin{cases} C_1'(t) + C_2(t) + tC_2(t)' + \frac{1}{2}C_2(t)' = -2(C_1(t) + tC_2(t) + \frac{1}{2}C_2(t)) + (2C_1(t) + 2tC_2(t) + 2C_2(t)) - \\ 2C_1(t)' + 2tC_2(t)' + 2C_2(t)' + 2C_2(t) = -4(C_1(t) + tC_2(t) + \frac{1}{2}C_2(t)) + 2(2C_1(t) + 2tC_2(t) + 2C_2(t)) - \end{cases}$$

Много букв, что аж не влезает, но там все сокращается и остается просто:

$$\begin{cases} C_1'(t) + tC_2(t)' + \frac{1}{2}C_2(t)' = t \ln t \\ 2C_1(t)' + 2tC_2(t)' + 2C_2(t)' = 2t \ln t \end{cases}$$

Из второго уравнения вычитаем первое, умноженное на два:

$$C_2(t)' = 2t \ln t - 2t \ln t$$

$$C_2(t)' = 0$$

$$C_2(t) = D_2$$

Отсюда:

$$C_1(t)' = t \ln t$$

$$C_1(t) = \int t \ln t = \frac{1}{4}t^2(2 \ln t - 1) + D_1$$

Подставляем:

$$x = \frac{1}{4}t^2(2 \ln t - 1) + D_1 + t \cdot D_2 + \frac{1}{2}D_2$$

$$y = 2 \cdot \left( \frac{1}{4}t^2(2 \ln t - 1) + D_1 \right) + 2tD_2 + 2D_2$$

## Номер 4

а)

$$\begin{cases} x' = x + y + 3t + 6 \\ y' = -10x - y + 6t + 3 \end{cases}, \quad x(0) = y(0) = 0$$

Применяем преобразование Лапласа:

$$x(t) \xrightarrow{L} X(p)$$

$$x'(t) \xrightarrow{L} pX(p) - x(0) = pX(p)$$

$$y(t) \xrightarrow{L} Y(p)$$

$$y(t)' \xrightarrow{L} pY(p) - y(0) = pY(p)$$

Ну и для функций справа:

$$3t + 6 \xrightarrow{L} \frac{6p + 3}{p^2}$$

$$6t + 3 \xrightarrow{L} \frac{3p + 6}{p^2}$$

Тогда получаем:

$$\begin{cases} pX(p) = X(p) + Y(p) + \frac{6p+3}{p^2} \\ pY(p) = -10X(p) - Y(p) + \frac{3p+6}{p^2} \end{cases}$$

Выражаем  $Y(p)$ :

$$\begin{cases} Y(p) = pX(p) - X(p) - \frac{6p+3}{p^2} \\ p \left( pX(p) - X(p) - \frac{6p+3}{p^2} \right) = -10X(p) - \left( pX(p) - X(p) - \frac{6p+3}{p^2} \right) + \frac{3p+6}{p^2} \end{cases}$$

Поработаем со вторым уравнением, пусть  $X = X(p), Y = Y(p)$ , чтобы не городить символов, раскрываем скобки, все с  $X$  переносим в левую часть:

$$pX(p-1) + 10X + pX - X = \frac{9p+9}{p^2} + \frac{6p+3}{p}$$

$$X(p(p-1) + 10 + p - 1) = \frac{9p+9}{p^2} + \frac{6p+3}{p}$$

$$X = \frac{\frac{9p+9}{p^2} + \frac{6p+3}{p}}{(p(p-1) + 10 + p - 1)}$$

$$X = \frac{\frac{9p+9+6p^2+3p}{p^2}}{p^2 - p + 9 + p}$$

$$X = \frac{\frac{6p^2+12p+9}{p^2}}{p^2 + 9}$$

$$X = \frac{6p^2 + 12p + 9}{p^4 + 9p^2}$$

Вспоминаем про нашу систему и ищем  $Y(p) = Y$ :

$$Y = pX - X - \frac{6p + 3}{p^2}$$

$$Y = \frac{p(6p^2 + 12p + 9)}{p^4 + 9p^2} - \frac{6p^2 + 12p + 9}{p^4 + 9p^2} - \frac{6p + 3}{p^2}$$

$$Y = \frac{p(6p^2 + 12p + 9) - (6p^2 + 12p + 9)}{p^2(p^2 + 9)} - \frac{(6p + 3)(p^2 + 9)}{p^2(p^2 + 9)}$$

$$Y = \frac{6p^3 + 12p^2 + 9p - 6p^2 - 12p - 9 - 6p^3 - 3p^2 - 54p - 27}{p^2(p^2 + 9)}$$

$$Y = \frac{3(p^2 - 19p - 12)}{p^2(p^2 + 9)}$$

Итого получили:

$$\begin{cases} X(p) = \frac{6p^2+12p+9}{p^2(p^2+9)} \\ Y(p) = \frac{3(p^2-19p-12)}{p^2(p^2+9)} \end{cases}$$

Теперь надо сделать обратное преобразование, упростим дроби до чего-то более понятного, начнем с  $X(p)$ :

$$\frac{6p^2 + 12p + 9}{p^2(p^2 + 9)} = \frac{A}{p} + \frac{B}{p^2} + \frac{Cp + D}{p^2 + 9}$$

Ищем коэффы:

$$6p^2 + 12p + 9 = Ap(p^2 + 9) + B(p^2 + 9) + (Cp + D)p^2$$

$$6p^2 + 12p + 9 = Ap^3 + Ap9 + Bp^2 + B9 + Cp^3 + Dp^2$$

$$6p^2 + 12p + 9 = p^3(A + C) + p^2(B + D) + p9A + 9B$$

$$\begin{cases} A + C = 0 \\ B + D = 6 \\ 9A = 12 \\ 9B = 9 \end{cases} \sim \begin{cases} C = -\frac{4}{3} \\ D = 5 \\ A = \frac{4}{3} \\ B = 1 \end{cases}$$

Итого:

$$\frac{6p^2 + 12p + 9}{p^2(p^2 + 9)} = \frac{4}{3p} + \frac{1}{p^2} + \frac{5 - \frac{4}{3}p}{p^2 + 9} = \frac{4}{3p} + \frac{1}{p^2} + \frac{5}{p^2 + 9} - \frac{\frac{4}{3}p}{p^2 + 9} \xrightarrow{L^{-1}} \frac{4}{3} + t + \frac{5}{3} \sin 3t + \frac{4}{3} \cos 3t$$

Теперь тоже самое проделываем с  $Y(p)$ :

$$\frac{3(p^2 - 19p - 12)}{p^2(p^2 + 9)} = \frac{A}{p} + \frac{B}{p^2} + \frac{Cp + D}{p^2 + 9}$$

$$3(p^2 - 19p - 12) = (A + C)p^3 + (B + D)p^2 + 9Ap + 9B$$

$$\begin{cases} 0 = A + C \\ 3 = B + D \\ -57 = 9A \\ -36 = 9B \end{cases} \sim \begin{cases} C = \frac{19}{3} \\ D = 7 \\ A = -\frac{19}{13} \\ B = -4 \end{cases}$$

Итого:

$$\frac{3(p^2 - 19p - 12)}{p^2(p^2 + 9)} = -\frac{19}{13p} - \frac{4}{p^2} + \frac{\frac{19}{3}p}{p^2 + 9} + \frac{7}{p^2 + 9} \xrightarrow{L^{-1}} -\frac{19}{3} - 4t + \frac{19}{13} \cos 3t + \frac{7}{3} \sin 3t$$

Получаем:

**Ответ:**

$$\begin{cases} x(t) = \frac{4}{3} + t + \frac{5}{3} \sin 3t + \frac{4}{3} \cos 3t \\ y(t) = -\frac{19}{3} - 4t + \frac{19}{13} \cos 3t + \frac{7}{3} \sin 3t \end{cases}$$



b)

$$\begin{cases} x' = -x - y + e^{2t} \\ y' = 2x + 2y + 2e^{2t} \end{cases}, \quad x(0) = y(0) = 1$$

Делаем тоже самое:

$$\begin{aligned} x(t) &\xrightarrow{L} X(p) \\ x'(t) &\xrightarrow{L} pX(p) - x(0) = pX(p) - 1 \\ y(t) &\xrightarrow{L} Y(p) \\ y(t)' &\xrightarrow{L} pY(p) - y(0) = pY(p) - 1 \\ e^{2t} &\xrightarrow{L} \frac{1}{p-2} \\ 2e^{2t} &\xrightarrow{L} \frac{2}{p-2} \end{aligned}$$

Получаем систему:

$$\begin{cases} pX(p) - 1 = -X(p) - Y(p) + \frac{1}{p-2} \\ pY(p) - 1 = 2X(p) + 2Y(p) + \frac{2}{p-2} \end{cases}$$

Выражаем  $Y(p)$ , пусть аналогично  $X = X(p), Y = Y(p)$ :

$$\begin{cases} Y = 1 - X - pX + \frac{1}{p-2} \\ p \left( 1 - X - pX + \frac{1}{p-2} \right) - 1 = 2X + 2 \left( 1 - X - pX + \frac{1}{p-2} \right) + \frac{2}{p-2} \end{cases}$$

Второе выражение:

$$X(-p^2 + p) = 3 - p + \frac{-p + 4}{p-2}$$

$$X = \frac{p^2 - 4p + 2}{p(p-1)(p-2)}$$

Тогда:

$$\begin{aligned} Y &= 1 - \frac{p^2 - 4p + 2}{p(p-1)(p-2)} - p \frac{p^2 - 4p + 2}{p(p-1)(p-2)} + \frac{1}{p-2} \\ Y &= \frac{p^2 + 3p - 2}{p(p-1)(p-2)} \end{aligned}$$

Суммируем:

$$\begin{cases} X(p) = \frac{p^2-4p+2}{p(p-1)(p-2)} \\ Y(p) = \frac{p^2+3p-2}{p(p-1)(p-2)} \end{cases}$$

Начнем с  $X(p)$ :

$$\frac{p^2-4p+2}{p(p-1)(p-2)} = \frac{A}{p} + \frac{B}{p-1} + \frac{C}{p-2}$$

Ищем коэффы:

$$p^2-4p+2 = A(p-1)(p-2) + Bp(p-2) + Cp(p-1)$$

$$p^2-4p+2 = Ap^2-3Ap+2A + Bp^2-2Bp + Cp^2-Cp$$

$$p^2-4p+2 = p^2(A+B+C) + p(3A-2B-C) + 2A$$

$$\begin{cases} A+B+C=1 \\ 3A-2B-C=-4 \\ 2A=2 \end{cases} \sim \begin{cases} C=-1 \\ B=1 \\ A=1 \end{cases}$$

Значит:

$$\frac{p^2-4p+2}{p(p-1)(p-2)} = \frac{1}{p} - \frac{1}{p-1} + \frac{1}{p-2} \xrightarrow{L^{-1}} 1 + e^t - e^{2t}$$

Теперь разбираемся с  $Y(p)$ :

$$\frac{p^2+3p-2}{p(p-1)(p-2)} = \frac{A}{p} + \frac{B}{p-1} + \frac{C}{p-2}$$

$$p^2+3p-2 = p^2(A+B+C) + p(3A-2B-C) + 2A$$

$$\begin{cases} A+B+C=1 \\ 3A-2B-C=-4 \\ 2A=2 \end{cases} \sim \begin{cases} C=4 \\ B=-2 \\ A=-1 \end{cases}$$

Значит:

$$\frac{p^2+3p-2}{p(p-1)(p-2)} = -\frac{1}{p} - \frac{2}{p-1} + \frac{4}{p-2} \xrightarrow{L^{-1}} -1 - 2e^t + 4e^{2t}$$

Получаем:

**Ответ:**

$$\begin{cases} x(t) = 1 + e^t - e^{2t} \\ y(t) = -1 - 2e^t + 4e^{2t} \end{cases}$$