

Бурмашев Григорий. Матан – какой-то там не помню какой



**Макс** 2:21

бля боже

он тупо просит учить доказательства всего

что ни разу не употребляли

ни в семах ни в дз

я просто нихуя не понимаю

он меня заебал

я почти любое его доказательство открываю

и нихуя не понимаю

мне не то что выучить

мне понять хотя бы блять

## Номер 7

2)

$$\int \frac{dx}{2 \sin x + 3 \cos x + 5}$$

Универсальная триг.подстановка:

$$\tan \frac{x}{2} = t$$

$$\sin x = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}}$$

$$\cos x = \frac{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}}$$

$$dx = \frac{2dt}{1+t^2}$$

Тогда получаем:

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\frac{4t}{1+t^2} + \frac{3-3t^2}{1+t^2} + 5} \cdot \frac{2dt}{1+t^2} &= \int \frac{2dt}{\left(\frac{4t+3-3t^2+5(1+t^2)}{1+t^2}\right)} \cdot \frac{1}{1+t^2} = \\ &= \int \frac{2dt}{2t^2 + 4t + 8} = \int \frac{dt}{t^2 + 2 + 4} = \int \frac{dt}{(t+1)^2 + 3} = \frac{\arctan \frac{t+1}{\sqrt{3}}}{\sqrt{3}} + C = \\ &= \frac{\arctan \frac{\tan \frac{x}{2} + 1}{\sqrt{3}}}{\sqrt{3}} + C \end{aligned}$$

**Ответ:**

$$\frac{\arctan \frac{\tan \frac{x}{2} + 1}{\sqrt{3}}}{\sqrt{3}} + C$$

3)

$$\int \frac{dx}{2 \sin^2 x + 3 \cos^2 x}$$

Вынесем  $\sin^2 x + \cos^2 x$  за скобки:

$$\int \frac{dx}{(\sin^2 x + \cos^2 x) \cdot 2 + \cos^2 x} = \int \frac{dx}{2 + \cos^2 x} = \int \frac{\frac{1}{\cos^2 x} dx}{\frac{2}{\cos^2 x} + 1} =$$

$$= \int \frac{\tan^2 x + 1}{2 \tan^2 x + 3} dx$$

Сделаем замену:

$$\begin{aligned} u &= \tan x \\ du &= \frac{1}{\cos^2 x} dx \\ dx &= \frac{du}{\frac{1}{\cos^2 x}} \end{aligned}$$

Тогда:

$$\int \frac{1}{2u^2 + 3} du = \frac{1}{2} \int \frac{du}{u^2 + \frac{3}{2}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{\frac{3}{2}}} \arctan\left(\sqrt{\frac{2}{3}}u\right) + C = \frac{\arctan\left(\sqrt{\frac{2}{3}}\tan x\right)}{\sqrt{6}} +$$

**Ответ:**

$$\frac{\arctan\left(\sqrt{\frac{2}{3}}\tan x\right)}{\sqrt{6}} +$$

4)

$$\begin{aligned} \int \frac{\cos x}{\sin x - 5 \cos x} dx &= \int \frac{\frac{1}{\cos^2 x}}{\frac{\sin x}{\cos x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} - \frac{5}{\cos^2 x}} dx = \\ &= \int \frac{\frac{1}{\cos^2 x}}{\tan x \cdot \frac{1}{\cos^2 x} - \frac{5}{\cos^2 x}} dx = \end{aligned}$$

Сделаем замену:

$$\begin{aligned} u &= \tan x \\ du &= \frac{1}{\cos^2 x} dx \\ dx &= \frac{du}{\frac{1}{\cos^2 x}} \end{aligned}$$

Тогда:

$$\int \frac{du}{u^3 - u^2 + u - 5} = \int \frac{du}{(u - 5)(u^2 + 1)}$$

Согласно степеням в знаменателе:

$$\frac{1}{(u - 5)(u^2 + 1)} = \frac{a}{u - 5} + \frac{bu + c}{u^2 + 1}$$

$$1 = a(u^2 + 1) + (bu + c)(u - 5) = au^2 + a + bu^2 - 5bu + cu - 5c$$

Получаем систему:

$$\begin{cases} a + b = 0 \\ c - 5b = 0 \\ a - 5c = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = -b \\ c = 5b \\ -b - 25b = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = -b \\ c = 5b \\ b = -\frac{1}{26} \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = \frac{1}{26} \\ b = -\frac{5}{26} \\ c = -\frac{5}{26} \end{cases}$$

Значит:

$$\frac{1}{(u-5)(u^2+1)} = \frac{\frac{1}{26}}{u-5} + \frac{-\frac{1}{26}u - \frac{5}{26}}{u^2+1}$$

Тогда:

$$\frac{1}{26} \int \frac{u+5}{u^2+1} - \frac{1}{u-5} du = \frac{1}{26} \left( \int \frac{du}{u-5} - \int \frac{u+5}{u^2+1} du \right) =$$

Посчитаем второй интеграл отдельно:

$$\int \frac{u+5}{u^2+1} du = \int \frac{u}{u^2+1} du + 5 \cdot \int \frac{1}{u^2+1} du = \frac{1}{2} \ln |u^2+1| + 5 \arctan u + C$$

Тогда:

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{26} \left( \ln |u-5| - \frac{1}{2} \ln |u^2+1| - 5 \arctan u \right) = \frac{\ln |u-5| - 5 \arctan u}{26} - \frac{\ln |u^2+1|}{52} + C = \\ &= \frac{\ln |\tan x - 5| - 5x}{26} - \frac{\ln |\tan^2 x + 1|}{52} + C \end{aligned}$$

**Ответ:**

$$\frac{\ln |\tan x - 5| - 5x}{26} - \frac{\ln |\tan^2 x + 1|}{52} + C$$

5)

$$\int \frac{dx}{\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^7}} = \int \frac{dx}{(x+1)^{\frac{2}{3}}(x-1)^{\frac{7}{3}}} =$$

$p+q = \frac{2}{3} + \frac{7}{3} = 3 \in \mathbb{Z} \rightarrow$  интегрируется.

$$= \int \frac{dx}{(x-1)^2 \cdot \sqrt{(x+1)^2(x-1)}} \cdot \frac{\sqrt[3]{x+1}}{\sqrt[3]{x+1}} =$$

$$\int \frac{\sqrt[3]{x+1} dx}{(x+1)(x-1)^2 \cdot \sqrt[3]{x-1}} = \int \frac{dx}{(x+1)(x-1)^2} \cdot \sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}}$$

Делаем замену (по аналогии с семинаром):

$$t = \sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}}$$

$$x+1 = t^2(x-1)$$

$$x = -\frac{1+t^3}{1-t^3}$$

$$dx = -\frac{6t^2}{(1-t^3)^2} dt$$

Тогда получаем:

$$\begin{aligned} \int \frac{-6t^2 dt}{(1-t^3)^2 \cdot \left(-\frac{1+t^3}{1-t^3} + 1\right) \left(-\frac{1+t^3}{1-t^3} - 1\right)^2} \cdot t &= \int \frac{-6t^3 dt}{(1-t^3)^2 \cdot \left(-\frac{2t^3}{1-t^3}\right) \left(-\frac{2}{1-t^3}\right)^2} = \\ &= \int \frac{3t^3 - 3}{4} dt = \frac{3}{4} \int \frac{t^3 - 1}{1} dt = \frac{3}{4} \int (t^3 - 1) dt = \\ &= \frac{3}{4} \int t^3 dt - \frac{3}{4} \int dt = \frac{3t^4}{16} - \frac{3t}{4} + C = \\ &= \frac{3}{16} \left( \sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}} \right)^4 - \frac{3}{4} \left( \sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}} \right) + C \end{aligned}$$

**Ответ:**

$$\frac{3}{16} \left( \sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}} \right)^4 - \frac{3}{4} \left( \sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}} \right) + C$$

## Номер 8

$$I_n = \int \sin^{-n} x \, dx = \int \sin^{-n-1} x \cdot \sin x \, dx =$$

Воспользуемся интегрированием по частям:

$$v = \sin^{-n-1} x$$

$$u' = \sin x$$

Тогда:

$$\begin{aligned} &= -\cos x \sin^{-n-1} x - \int (-\cos x)(-n-1) \sin^{-n-2} x \cos x \, dx = \\ &= -\cos x \sin^{-n-1} x - (n+1)(I_{n-2} - I_n) = \\ &= -\cos x \sin^{-n-1} x - (n+1)I_{n-2} + (n+1)I_n \end{aligned}$$

Тогда выражаем  $I_n$ :

$$\begin{aligned} I_n - (n+1)I_n &= -\cos x \sin^{-n-1} x - (n+1) \cdot I_{n-2} \\ I_n - nI_n - I_n &= -\cos x \sin^{-n-1} x - (n+1) \cdot I_{n-2} \\ nI_n &= \cos x \sin^{-n-1} x + (n+1)I_{n-2} \\ I_n &= \frac{\cos x \sin^{-n-1} x + (n+1)I_{n-2}}{n} \end{aligned}$$

Если  $n$  – четное:

$$I_0 = \int \frac{dx}{\sin^0 x} = \int dx = x + c$$

Если  $n$  – нечетное:

$$I_1 = \int \frac{dx}{\sin x}$$

Универсальная триг.подстановка:

$$\tan \frac{x}{2} = t$$

$$\sin x = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}}$$

$$dx = \frac{2dt}{1+t^2}$$

$$\int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = \ln |t| + C = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C$$