

К счастью эта ересь не имеет смысла.

Номер 8

Какие из следующих утверждений справедливы при $x \rightarrow 0$?

a)

$$\bar{o}(x^2) + \bar{o}(x) = \bar{o}(x)$$

Пусть:

$$\bar{o}(x^2) = \frac{F(x)}{x^2}$$

$$\bar{o}(x) = \frac{G(x)}{x}$$

$$\frac{F(x) + G(x)}{x} = \frac{F(x) \cdot x}{x^2} \rightarrow 0 \equiv \frac{F(x)}{x^2} + \frac{G(x)}{x} = \bar{o}(x)$$

Ответ: верно

b)

$$\bar{o}(x) + x^2 = \bar{o}(x)$$

$$\frac{x^2}{x} \rightarrow 0 \equiv x^2 = \bar{o}(x)$$

А значит:

$$\bar{o}(x) + x^2 = \bar{o}(x) + \bar{o}(x) = \bar{o}(x)$$

Ответ: верно

с)

$$(x + \bar{o}(x))(2x^2 + \bar{o}(x^2)) = 2x^3 + \bar{o}(x^3)$$
$$2x^3 + \bar{o}(x) \cdot \bar{o}(x^2) + 2x^2 \cdot \bar{o}(x) + x \cdot \bar{o}(x^2) = 2x^3 + \bar{o}(x^3)$$

Упростим каждый из множителей:

•

$$\bar{o}(x) \cdot \bar{o}(x^2) = x \cdot \bar{o}(1) \cdot x^2 \cdot \bar{o}(1) = x^3 \cdot \bar{o}(1)$$
$$\frac{x^3 \cdot \bar{o}(1)}{x^3} \rightarrow 0 \equiv \bar{o}(x) \cdot \bar{o}(x^2) = \bar{o}(x^3)$$

•

$$2x^2 \cdot \bar{o}(x) = 2x^2 \cdot x \cdot \bar{o}(1) = 2x^3 \cdot \bar{o}(1)$$
$$\frac{2x^3 \cdot \bar{o}(1)}{x^3} \rightarrow 0 \equiv 2x^2 \cdot \bar{o}(x) = \bar{o}(x^3)$$

•

$$x \cdot \bar{o}(x^2) = x \cdot x \cdot \bar{o}(1) = x^2 \bar{o}(1)$$
$$\frac{x^3 \cdot \bar{o}(1)}{x^3} \rightarrow 0 \equiv x \cdot \bar{o}(x^2) = \bar{o}(x^3)$$

А значит:

$$2x^3 + \bar{o}(x^3) + \bar{o}(x^3) + \bar{o}(x^3) = 2x^3 + \bar{o}(x^3)$$

Ответ: верно

d)

$$\bar{o}(1) - \bar{o}(1) = 0$$

Пусть левый множитель:

$$\bar{o}(1) = F(x)$$

А правый:

$$\bar{o}(1) = G(x)$$

Тогда:

$$\frac{F(x) - G(x)}{1} \rightarrow 0 \equiv \bar{o}(1) - \bar{o}(1) = \bar{o}(1)$$

А значит, исходное выражение **неверное**

Ответ: неверно