

Lie Group and Lie Algebra

by DaDouBi@NJU

April 18, 2016

Just for fun

先把参考文献列出来，就不写那么正式了：

- Brian C.Hall, GTM 222
- Daniel Bump, GTM 225
- R.W.Sharpe, GTM 166
- S Kobayashi & K Nomizu, Foundations of Differential Geometry. Vol. I
- V.S.Varadarajan, GTM 102
- W.Y.Hsiang, Lectures on Lie Groups
- Shlomo Sternberg, Lie Algebras
- Shlomo Sternberg, Semi-Riemann Geometry and General Relativity
- Yvette Kosmann-Schwarzbach, Groups and Symmetries
- J.F.Cornwell, Group Theory in Physics
- Steven Weinberg, The Quantum Theory of Fields. Vol. I

§1 Basic Representation Theory

群表示使得我们把群进行了“外部线性化”，粗略地说就是我们把群元素看做了一个线性变换。

Definition 1. 令 V 是一个域 k 上的有限维向量空间，群 G 的一个表示 U 指存在这样的群同态 $U: G \rightarrow \text{Gl}(V)$ ，使得

$$\pi(g)\pi(g') = \pi(gg'), \quad \pi(g^{-1}) = \pi(g)^{-1}, \quad \pi(e_G) = e_{\text{Gl}(V)}$$

成立。表示 π 的维度被定义为 V 的维度。

如果没什么会混淆的话，就直接略去 π ，写 gx 来表达 $\pi(g)x$ 。如果要用不会混淆的说法来表达群表示的话，就应该用 (π, V) 二元组， π 代表的是 $\pi(g)$ ， V 是被作用的空间。

Definition 2. 如果 π 是一个一对一的同态，那么我们称这个表示为忠实表示。

Definition 3. 设 G 是一个群， (π, V) 是他的一个表示， $W \subset V$ 是一个子空间，如果

$$\pi(G)W = \{\pi(g)v \mid g \in G, v \in W\} \subset W$$

则 W 称为不变子空间。

$\{0\}$ 和 V 是显然的两个不变子空间，略去这两个平凡不变子空间，如果没有其他不变子空间了，则 V 被称为是不可约的，表示被称为不可约表示。

Definition 4. 同一个群 G 的两个表示 (π_1, V_1) 和 (π_2, V_2) 可以：

(1) 直和： $(\pi_1 \oplus \pi_2, V_1 \oplus V_2)$ 即满足

$$(\pi_1 \oplus \pi_2)(g)(x, y) = (\pi_1(g)x, \pi_2(g)y).$$

或者简单地写作 $g(x, y) = (gx, gy)$ 。

(2) 直积： $(\pi_1 \otimes \pi_2, V_1 \otimes V_2)$ 即满足

$$(\pi_1 \otimes \pi_2)(g)(x \otimes y) = (\pi_1(g)x) \otimes (\pi_2(g)y).$$

或者简单地写作 $g(x \otimes y) = (gx) \otimes (gy)$ 。

Definition 5. 如果一个表示能被分解成几个不可约表示的直和，则称该表示为完全可约的。

下面的一系列定义涉及表示的等价，当然还有很重要的 Schur 引理。

Definition 6. 设 G 有两个表示 (π_1, V_1) 和 (π_2, V_2) , 如果存在线性映射 $T: V_1 \rightarrow V_2$, 对任意的 $g \in G$ 都满足

$$\pi_2(g) \circ T = T \circ \pi_1(g).$$

这样的 T 被称为缠结映射。当缠结映射是双射的时候, 两个表示被称为是等价的。

Proposition 7. 如果 π_1 和 π_2 之间存在缠结映射 T , 那么 $\ker T$ 是 π_1 的不变子空间, 而 $\operatorname{Im} T$ 是 π_2 的不变子空间。

因为 $T(\pi_1(g)x) = \pi_2(g)Tx$ 对于任何 x 使得 $Tx = 0$ 的, 都有 $\pi_1(g)x$ 使得 $T(\pi_1(g)x) = 0$, 所以前半句话证明完了。对于 $\operatorname{Im} T$ 中的元素 y 可以找到原象 x , 由于 $\pi_2(g)y = \pi_2(g)Tx = T(\pi_1(g)x)$, 则 $\pi_2(g)y$ 也在 $\operatorname{Im} T$ 中, 后半句话证完。

Theorem 8. *Schur* 引理: 假设在复数域上讨论, 如果 (π_1, V_1) 和 (π_2, V_2) 都是不可约表示, 且两者之间存在缠结映射 T :

- (1) 如果 (π_1, V_1) 和 (π_2, V_2) 不等价, 则 $T = 0$.
- (2) 如果 $V_1 = V_2 = V$ 和 $\pi_1 = \pi_2 = \pi$, 则 $T = \lambda I$, 其中 λ 是一个常数。

如果两个表示不等价, 则 T 不是双射, 所以 $\ker T \neq \{0\}$, 而他是不变子空间, 由不可约性, 则 $\ker T = V_2$, 同理 $\operatorname{Im} T = \{0\}$, 这就是说 $T = 0$ 。

由于在复数域上, 所以 T 一定存在一个本征值 λ , 令 E_λ 是 λ 的本征空间, 他在 π 的作用下不变, 由不可约性, 所以他要么是零空间, 要么是全空间。而本征值的存在性说明了零空间不可能, 所以本征空间就是全空间, 这也就是说 $T = \lambda I$ 。

如果我们遇到的群 Abel 群, 那么他的群表示也是可交换的, 同时其本身就构成了一个缠结映射, 于是我们可以得到:

Proposition 9. Abel 群的不可约表示都是一维的。

如果 (\bullet, \bullet) 是 V 上的一个内积, 如果对任意的 $g \in G, u, v \in V$ 有 $(u, v) = (gu, gv)$, 则我们称呼这个表示为么正表示。

对于有限群我们总可以找到么正表示, 因为我们可以重新构造内积

$$(u, v)' = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (gu, gv),$$

那么

$$(hu, hv)' = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (hgu, hgv) = \frac{1}{|G|} \sum_{hg \in G} (hgu, hgv) = \frac{1}{|G|} \sum_{k \in G} (ku, kv) = (u, v)'.$$

么正表示的好处是，一个不变子空间的正交空间也是不变的。对于一个有限维的么正表示，如果不是完全可约的，那么就分解出一个不变子空间，他是不可约的，然后对这个不变子空间的正交空间，我们又得到了一个可约或不可约的不变子空间，靠着有限归纳（因为有限维），我们就得到了如果群存在一个有限维么正表示，则这个表示一定是完全可约的。结合上面所说的，下面的结论是显然的。

Theorem 10. *Maschke* 定理：有限群的有限维表示总是完全可约的。

Proposition 11. 紧 *Lie* 群上存在么正表示。

换言之，我们可以找到内积 $\langle \bullet, \bullet \rangle$ 使得 $\langle gx, gy \rangle = \langle x, y \rangle$ 。假设原本存在内积 $\langle \bullet, \bullet \rangle$ ，那么再设 dg 是 G 上的 Haar 测度（因为紧所以存在，而且已经归一化），那么

$$(x, y) = \int_G \langle gx, gy \rangle dg$$

就满足了要求。

Definition 12. 令 $\phi : G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ 是一个 G 的复表示，那么复值函数

$$\chi_\phi : G \xrightarrow{\phi} \mathrm{GL}(V) \xrightarrow{\mathrm{tr}} \mathbb{C} : g \mapsto \mathrm{tr}(\phi(g))$$

被称为 ϕ 的特征标。

Theorem 13. 如果 G 是一个紧 *Lie* 群，那么两个表示 π_1, π_2 等价当且仅当 $\chi_{\pi_1} = \chi_{\pi_2}$ 。

从左到右是简单的，假若 π_1 和 π_2 等价，那么存在 A 使得 $A\pi_1(g) = \pi_2(g)A$ ，于是

$$\mathrm{tr}(\pi_1(g)) = \mathrm{tr}(A^{-1}\pi_2(g)A) = \mathrm{tr}(\pi_2(g)).$$

而证明从右到左需要一些准备，我们首先对于 $A \in \mathrm{Hom}(V, W)$ ，定义群表示 $(\pi_1^* \otimes \pi_2, \mathrm{Hom}(V, W))$ 如下

$$\pi_1^* \otimes \pi_2(g)A = \pi_2(g)A\pi_1(g)^{-1},$$

这还是很容易猜出来的，譬如，我们找一个矢量 $v \in V$ ，则

$$\pi_2(g)(Av) = (\pi_2(g)A\pi_1(g)^{-1})(\pi_1(g)v),$$

如果 A 是 $\varphi(g)$ 的不动点，那么就一定有

$$A\pi_1(g) = \pi_2(g)A.$$

此时 A 就是一个缠结映射。假如 π_1, π_2 都是不可约的且不等价的，则 Schur 引理可以改写为：群表示 $(\pi_1^* \otimes \pi_2, \mathrm{Hom}(V, W))$ 的不动点集为零。

现在我们考虑紧 Lie 群上的平均

$$\int_G \pi_1^* \otimes \pi_2(g) A dg,$$

显然, 他是一个不动点, 因此

$$\int_G \pi_1^* \otimes \pi_2(g) A dg = \int_G \pi_2(g) A \pi_1(g)^{-1} dg = 0.$$

特别地, 如果 $A = E_{ab}$ 且 π_1 是么正表示, 记 $(\pi_2(g))_{ij} = \pi_2(g)_{ij} E_{ij}$, $(\pi_1(g)^{-1})_{kl} = \pi_1(g)_{kl}^{-1} E_{kl}$, 则

$$0 = \int_G (\pi_2(g))_{ij} E_{ab} (\pi_1(g)^{-1})_{kl} dg = \int_G \pi_2(g)_{ia} \pi_1(g)_{bk}^\dagger dg,$$

对任意的 i, a, b, k 都满足。

现在如果 π_1, π_2 等价, 此时不妨就直接记 $\pi = \pi_1 = \pi_2$, 那么由 Schur 引理

$$\int_G \pi(g) A \pi(g)^{-1} dg = \lambda_A I.$$

两边求迹, 就有

$$\int_G \text{tr}(A) dg = \text{tr}(A) = \lambda_A \dim V.$$

类似地, 如果 $A = E_{ab}$, 我们也有

$$\int_G \pi(g)_{ia} \pi(g)_{bk}^\dagger dg = \delta_{ik} \lambda_{E_{ab}} I = \delta_{ik} \frac{\text{tr}(E_{ab})}{\dim V} I = \frac{\delta_{ik} \delta_{ab}}{\dim V} I.$$

那么直接计算特征标就可以得到, 对于紧 Lie 群的不可约么正表示, 我们有

$$\int_G \chi_\pi \chi_\pi^* dg = 1,$$

对于两个不可约的不等价表示, 我们有

$$\int_G \chi_\pi \chi_\rho^* dg = 0,$$

其中上标 $*$ 表示复共轭。

令 \hat{G} 是紧 Lie 群 G 的复不可约表示的等价类, 那么由于是紧 Lie 群, 有限维表示必然是完全可约的, 就是说任何一个有限维表示能写作

$$\rho = \bigoplus_{\pi \in \hat{G}} m(\rho, \pi) \pi,$$

其中 $m(\rho; \pi)$ 是乘数, 就是说分解出来的等价的 π 各数。直接计算就可以得到

$$m(\rho, \pi) = \int_G \chi_\rho \chi_\pi^* dg,$$

以及

$$\int_G \chi_{\rho_1} \chi_{\rho_2}^* dg = \sum_{\pi \in \hat{G}} m(\rho_1, \pi) m(\rho_2, \pi).$$

现在证明上面的定理的从右到左, 如果两个表示 ρ_1, ρ_2 特征标相等, 则

$$m(\rho_1, \pi) = \int_G \chi_{\rho_1} \chi_{\pi}^* dg = \int_G \chi_{\rho_2} \chi_{\pi}^* dg = m(\rho_2, \pi),$$

对任意的 $\pi \in \hat{G}$ 都成立, 因此 ρ_1, ρ_2 等价。

Proposition 14. 一个复有限维表示 π 是不可约的当且仅当

$$\int_G \chi_{\pi} \chi_{\pi}^* dg = 1.$$

从左到右前面已经算过了, 从右到左是因为

$$\int_G \chi_{\pi} \chi_{\pi}^* dg = \sum_{\rho \in \hat{G}} m(\rho, \pi)^2 = 1,$$

因此存在一个 $\psi \in \hat{G}$ 使得 $m(\rho, \psi) = 1$, 而其他的 $\pi \in \hat{G}$ 都有 $m(\rho, \psi) = 0$.

§2 Foundation

Lie 群是一个可微群, 即是他一方面有着群的结构, 而另一方面还是一个可微流形, 其中群的运算乘法和逆是可微的。因为 Lie 群有着可微结构, 那么我们就可以对其局部线性化, 特别地, 单位元附近的局部线性化就构成了 Lie 代数的内容。

Definition 15. 一个 Lie 群 G 的 Lie 代数 \mathfrak{g} 就是其单位元处的切空间。

下面还将要陈述另外两个 Lie 代数的等价形式, 从不同的等价形式, 可以比较轻松地得到 Lie 代数的不同性质。

Definition 16. 现在有一个 Lie 群 G , 我们称可微同态 $\phi: \mathbb{R} \rightarrow G$ 是 G 的一个单参子群, 其中 \mathbb{R} 当做加法群。

注意和单参 (可微) 变换群的区别。此外, $\phi(0) = e$ 。

Definition 17. 记左平移 $l_a: x \mapsto ax$, 如果矢量场 X_x 满足 $(l_a)_* X_a = X_{ax}$, 则称 X_a 是一个左不变矢量场。

令 X 是一个左不变矢量场, 对于每一个群元 x , 我们都有 $X_x = (l_x)_* X_e$. 反过来, 我们一定有 $X_e = (l_{x^{-1}})_* X_x = (l_x)^{-1} X_x$, 这样我们就建立了单位元处的切矢量 X_e 和左不变矢量场之间的一一对应。

Proposition 18. Lie 代数 \mathfrak{g} 和 G 上面的左不变矢量场构成的矢量空间之间存在着线性同构。

设 $f: G \rightarrow G$ 是一个微分同胚, 那么从

$$[X, Y] = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} (Y - (\varphi_t)_* Y),$$

其中 φ_t 由矢量场 X 生成, 即对于变换。可以得到

$$f_*[X, Y] = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} (f_*Y - f_*(\varphi_t)_*(f_*)^{-1}f_*Y) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} (f_*Y - (f \circ \varphi_t \circ f^{-1})_*f_*Y),$$

而 $f \circ \varphi_t \circ f^{-1}$ 由 f_*X 生成, 所以

$$f_*[X, Y] = [f_*X, f_*Y].$$

若 $f = l_a$, 那么我们立刻就得到了左不变矢量场的对易子也是左不变的。因此对于 Lie 代数来说, 他容许一个二元线性运算 $[\bullet, \bullet]: \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$, 所以 Lie 代数确实是一个代数。

Proposition 19. Lie 代数上还满足:

- (1) $[X, Y] = -[Y, X]$,
- (2) $[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0$.

第一条反对称性从矢量场的 $[X, Y] = X \circ Y - Y \circ X$ 来看是显然的。而第二条称为 Jacobi 恒等式, 直接计算即可验证。可以如下记忆 Jacobi 恒等式, X, Y, Z 的三种右手方向构成的置换和为 0, 或者说, $[X_i, [X_j, X_k]]$ 中 ijk 是 123 的偶置换。

适当改写 Jacobi 恒等式, 我们可以得到

$$[X, [Y, Z]] = [[X, Y], Z] + [Y, [X, Z]],$$

如果记 $A(X): Y \mapsto [X, Y]$, 于是

$$A(X)[Y, Z] = [A(X)Y, Z] + [Y, A(X)Z],$$

因此 $A(X)$ 就是一个 Lie 代数上面的导子。

应用一阶微分方程解的存在和唯一性定理, 则过每一点 x 存在唯一的积分曲线, 他的速度矢量都属于 X . 令 $\phi: \mathbb{R} \rightarrow G$ 是 X 的积分曲线且 $\phi(0) = e$. 使用 X 的左不变性可以得到 $l_a \circ \phi: t \mapsto a\phi(t)$ 是 X 的积分曲线且 a 是其起点。因此

$$\phi(s)\phi(t) = \phi(s+t),$$

ϕ 是 G 的一个单参子群。这样, 我们建立了单参子群和左不变矢量场之间的联系。由于左不变矢量场和 Lie 代数之间的同构, 我们也建立了单参子群和 Lie 代数之间的联系。

Definition 20. 对任意的 $X \in \mathfrak{g}$, 令 $\exp(X) = e^X = \phi_X(1)$, 其中 ϕ_X 是唯一的以 X 为初始速度矢量的单参子群。映射 $\exp: \mathfrak{g} \rightarrow G$ 被称为 G 的指数映射。

可以看到 $\exp(tX) = \phi_{tX}(1) = \phi_X(t)$. 因此

$$\exp(tX)\exp(sX) = \phi_X(t)\phi_X(s) = \phi_X(t+s) = \exp((t+s)X).$$

就和一般的指数表现得那样。但如果 $[X, Y] \neq 0$, 一般来说

$$\exp(X)\exp(Y) \neq \exp(X+Y).$$

我们找一个函数 f , 他是 G 上的一个光滑函数, 那么 $g(t) = f(xe^{tX})$ 就是一个 \mathbb{R} 上的函数, 我们来归纳证明他的 n 阶导数为

$$\frac{d^n}{dt^n}g(t) = (X^n f)(xe^{tX}),$$

$n=0$ 是显然的, $n=1$ 需要直接计算验证

$$(Xf)(x) = \left\{ \frac{d}{dt}f(xe^{tX}) \right\}_{t=0},$$

这个的计算只要使用链式法则

$$\left\{ \frac{d}{dt}f(xe^{tX}) \right\}_{t=0} = f_{*x}(e^{tX})_{*0} = f_{*x}X = (Xf)(x).$$

注意最后一个等式要依赖于 f 是矢量值的, 某种程度来说这就是 $T\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n$ 的结果。由于矩阵也可以看成在欧氏空间 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 里, 所以 f 也可以取值为矩阵。

假设 $n=k$ 是成立的, 那么因为 $X^{k+1} = X \circ X^k$,

$$\begin{aligned} (X^{k+1}f)(xe^{tX}) &= (X(X^k f))(xe^{tX}) \\ &= \left\{ \frac{d}{ds}(X^k f)(xe^{(s+t)X}) \right\}_{s=0} \\ &= \frac{d}{dt}(X^k f)(xe^{tX}) \\ &= \frac{d^{k+1}}{dt^{k+1}}g(t). \end{aligned}$$

那么使用 Taylor 公式

$$f(xe^{tX}) = \sum_{k=0}^n \frac{(X^k f)(x)}{k!} t^k + O(t^{n+1}),$$

或者

$$f(xe^{tX}) = \sum_{k=0}^n \frac{(tX)^k}{k!} f(x) + O(t^{n+1}),$$

如果可以展开无数项, 那么

$$f(xe^{tX}) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(tX)^k}{k!} f(x).$$

从中可以看到类似于指数函数的展开

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

这使得我们可以更加坚定指数映射和指数函数的关系。

Theorem 21. 对于 $A \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$, 指数映射有如下级数展开

$$e^A = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{n!},$$

对于任意的矩阵 A 都是收敛的。

这个只要让 $f(A) = A, x = I, t = 0$ 就可以了。至于收敛性, 因为对于任意一个矩阵, A 的范数都是有界的, 那么 e^A 就被 A 的范数的级数控制, 因此收敛。

当然可以用其他方式猜出这个关系, 我们考虑 e^{tA} , 将其在 $t = 0$ 附近展开, 有

$$e^{tA} = I + tA + O(t^2),$$

然后对于任意的正整数 n 和固定的 t 我们有

$$e^{tA} = \left(e^{tA/n}\right)^n = \left(I + \frac{t}{n}A + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)^n,$$

然后令 $n \rightarrow \infty$, 就有

$$e^{tA} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(I + \frac{t}{n}A\right)^n.$$

使用二项式展开, 就可以得到其级数展开

$$e^{tA} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(tA)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(tA)^n}{n!},$$

最后 $t = 1$ 即可。

上面的过程可能不怎么严谨, 在矩阵的情况下, 直接用级数定义指数映射反而可能更加简单。

Lie 群 G 的切丛 TG 倒是相当有趣, 因为我们可以定义 $(l_{a^{-1}})_*$ 把 $T_a G$ 始终映射到 $T_e G = \mathfrak{g}$ 来考虑, 所以切丛就被平凡化了。与这相关的概念即 Maurer-Cartan 形式。

Definition 22. G 是一个 Lie 群, 他的切丛记做 TG , 形式 $\omega_G : v \mapsto (l_{g^{-1}})_* v$ 被称为 Maurer-Cartan 形式。

可以看到 $\omega_G : TG \rightarrow \mathfrak{g}$, 因此 Maurer-Cartan 形式可以看做一个 \mathfrak{g} 值函数。且对于任意的 l_h^* , 我们都有

$$(l_h^* \omega_G)v = \omega_G((l_h)_*v) = (l_{(hg)^{-1}})_*(l_h)_*v = (l_{(g)^{-1}})_*v = \omega_G(v).$$

所以 Maurer-Cartan 形式是左不变的。

现在来看具体的例子, 设所有 $n \times n$ 的实(复)矩阵构成的集合为 $M(n, \mathbb{R})$ ($M(n, \mathbb{C})$), 其中 $\det A \neq 0$ 的矩阵按矩阵乘法构成一个群 $GL(n, \mathbb{R})$ ($GL(n, \mathbb{C})$), 我们称为一般线性群, 单位元是 I 。一般线性群是一个 Lie 群, 矩阵群上的微分定义使得我们可以直接计算一般线性群的 Lie 代数。在一般线性群 G 上

$$(l_g)_*v = \frac{1}{t}(l_g(a + tv) - l_g(a)) = \frac{1}{t}(l_g(tv)) = l_g(v) = gv.$$

其中 $v \in T_a G$.

所以一般线性群上面的 Maurer-Cartan 形式即为

$$\omega_G(v) = l_{g^{-1}}(v) = g^{-1}v.$$

其中 g 和 v 都是矩阵, 矩阵乘矩阵还是矩阵, 所以 Lie 代数也是矩阵的形式。设 $dg = (dx_{ij})$, 那么 v 就可以写成 $dg(v)$, 因为 $dx_{ij}(v) = v_{ij}$, 则

$$\omega_G = g^{-1}dg.$$

由于 $GL(n, \mathbb{R})$ 的微分结构是熟知的, 我们可以直接计算其 Lie 代数 $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$ 上的交换子形式。设 $A \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$ 而 $g \in GL(n, \mathbb{R})$, 容易验证 $A_g = gA$ 是左不变矢量场, 因为

$$(l_h)_*A_g = (l_h)_*gA = hgA = A_{hg}.$$

记 $g = (x_{ij})$, 考虑与 $A = (a_{ij})$ 和 $B = (b_{ij})$ 相关的左不变矢量场为

$$A_g = \sum_{i,j,k} x_{ij} a_{jk} \partial_{ik}, \quad B_g = \sum_{i,j,k} x_{ij} b_{jk} \partial_{ik},$$

于是

$$[A_g, B_g] = \left[\sum_{i,j,k} x_{ij} a_{jk} \partial_{ik}, \sum_{i,j,k} x_{ij} b_{jk} \partial_{ik} \right] = \sum_{i,k} \left(\sum_j x_{ij} \sum_r (a_{jr} b_{rk} - b_{jr} a_{rk}) \right) \partial_{ik},$$

或者

$$[A_g, B_g] = (AB - BA)_g.$$

所以 $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$ 上的对易子为

$$[A, B] = AB - BA.$$

Definition 23. 以下矩阵构成一般线性群的子群：

- (1) 特殊线性群： $\mathrm{SL}(n, \mathbb{R}) = \{A \in \mathrm{M}(n, \mathbb{R}) \mid \det A = 1\}$;
- (2) 正交群： $\mathrm{O}(n) = \{Q \in \mathrm{M}(n, \mathbb{R}) \mid Q^T Q = Q Q^T = I\}$;
- (3) 酉群： $\mathrm{U}(n) = \{Q \in \mathrm{M}(n, \mathbb{C}) \mid Q^\dagger Q = Q Q^\dagger = I\}$;
- (4) 特殊正交群： $\mathrm{SO}(n) = \{Q \in \mathrm{O}(n) \mid \det Q = 1\}$;
- (5) 特殊酉群： $\mathrm{SU}(n) = \{Q \in \mathrm{U}(n) \mid \det Q = 1\}$;

我们来考虑最简单的一个群 $\mathrm{SO}(2)$ ，他的群元素由矩阵

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

构成。这是一个 Abel 群，而且可以注意到，他同构于群 $S^1 = \{e^{i\theta} : \theta \in \mathbb{R}\}$ ，这是一个圆周。

Proposition 24. 对于矩阵群构成的空间，我们可以使用 *Heine-Borel* 定理断言有界闭子群是紧的。所以正交群是紧的，但是一般线性群不是紧的。

但是对于 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 的子群来说，正交群就是极大的紧子群了。

Proposition 25. $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 的子群 G 如果是紧的，那么存在可逆矩阵 A 使得 $AGA^{-1} \subset \mathrm{O}(n)$ 。

Proof. 设 $A \in G$ ，则序列 $A, A^2, \dots, A^n, \dots$ 都在 G 里面。如果 $|\det A| > 1$ ，那么 $|\det A^n| = |\det A|^n$ 就可以任意大，和紧性对应的有界性相悖。如果 $|\det A| < 1$ ，那么由 G 的紧性，其 A^n 这个序列收敛到 G 内，但 $|\det A^n| = |\det A|^n$ 却又小于任意的正数，所以 A 不可逆但在 G 内，则和 G 作为一般线性群的子群相悖。所以 $|\det A| = 1$ 。

现在只考虑 $\det A = 1$ ，这就是特殊线性群的情况。然后还设 $\mathrm{SO}(3)$ 在我们的子群里。由于我们总可以将特殊线性群的元素唯一分解为 $A = RP$ ，其中 $R \in \mathrm{SO}(3)$ ，而 P 是正定对称矩阵，且 $\det P = 1$ 。由于正定对称一定可以对角化，适当选择基，我们使得 P 就是对角的，所以 $\det P = \lambda_1 \cdots \lambda_n = 1$ 。

那么 $P = R^{-1}A$ ，由于 R 在我们的群内，那么 R^{-1} 也是，因此 P 也是。如果存在一个 $|\lambda_i| > 1$ ，不妨假设就是 λ_1 ，此时

$$P^k = \mathrm{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k)$$

中的 $|\lambda_1|^k$ 会比任意正数大，这和紧性相悖。所以所有的 $|\lambda_i| = 1$ ，但是由于是正定的，所以 $P = I$ 。因此 $A = R \in \mathrm{SO}(3)$ 。

对于 $\det A = -1$ 的情况类似，对于共轭，也是显然的。 □

现在我们来求这个极大的紧子群 $O(n)$ 的 Lie 代数，因为 Maurer-Cartan 形式取 \mathfrak{g} 值，所以我们只要整理出 Maurer-Cartan 形式就可以了。对恒等式 $AA^T = I$ 求导有

$$dAA^T + A(dA)^T = 0,$$

或者

$$A^{-1}dA + (A^{-1}dA)^T = 0,$$

$A^{-1}dA$ 就是 Lie 代数。 $O(n)$ 的 Lie 代数就是满足方程 $B + B^T = 0$ 的矩阵，换言之，反对称矩阵。

此外，由矩阵恒等式， $AA^{-1} = I$ ，对其求导我们有

$$0 = dAA^{-1} + Ad(A^{-1}),$$

所以

$$d(A^{-1}) = -A^{-1}(dA)A^{-1}.$$

如果 $A(t) : \mathbb{R} \rightarrow GL(n, \mathbb{R})$ 是一个单参子群，那么有类似的

$$(A^{-1}(t))' = -A^{-1}(t)A'(t)A^{-1}(t).$$

以上就是微积分里面 $(1/x)' = -1/x^2$ 的矩阵对应。

下面陈述 Lie 群和 Lie 代数的联系，有些证明是朴实的，有些证明是困难的，然而我都是略去了。首先给出一般的 Lie 代数定义。

Definition 26. 设有一个实数域上面的矢量空间 V ，他上面赋予了一个双线性映射 $[\bullet, \bullet] : V \times V \rightarrow V$ ，且满足

$$(1) [X, Y] = -[Y, X],$$

$$(2) [X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0.$$

则此时 V 以及上面的双线性映射构成一个代数，即 Lie 代数。

一个古典的例子， (\mathbb{R}^3, \times) 构成一个 Lie 代数，其中 \times 是矢量的叉乘。

Definition 27. 如果对于 V 的一个子集 H ，成立 $[H, H] \subset H$ ，则 H 就被称为 Lie 代数的子代数。

Theorem 28. 设 H 是 G 的 Lie 子群，那么 \mathfrak{h} 是 \mathfrak{g} 的 Lie 子代数。

下面这个定理来自 Ado，就像流形中的 Whitney 嵌入定理一样，告诉我们，对于有限维 Lie 代数，其实我们只需要考虑 $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$ 的子代数就可以了。（记得 Arnold 用 Whitney 嵌入定理来说“根本没有抽象的流形”。）

Theorem 29. 任何 \mathbb{R} 上的有限维 Lie 代数总可以同构于 $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$ 的一个子代数, n 为一个足够大的整数。

考虑了子代数, 现在来看看两个 Lie 群和 Lie 代数的联系。

Definition 30. 两个 Lie 代数 \mathfrak{g}_1 和 \mathfrak{g}_2 间的同态 f 首先是一个线性映射, 其次满足

$$f([a, b]_1) = [fa, fb]_2.$$

Theorem 31. 设 $\varphi: G_1 \rightarrow G_2$ 是 Lie 群间的群同态 (同构), 则其诱导了 Lie 代数间的同态 (同构) $\varphi_{*e}: \mathfrak{g}_1 \rightarrow \mathfrak{g}_2$.

上面对于微分同胚我们已经证明了 $\varphi_{*e}[u, v] = [\varphi_{*e}u, \varphi_{*e}v]$, 但 Lie 群之间的群同态使得我们可以做得更好。

让 $u, v \in \mathfrak{g}_1$, 那么我们拓展到 G_1 上的对应的左不变向量场 X, Y 上。因为 φ 是一个群同态, 故 $\varphi \circ l_g = l_{\varphi(g)} \circ \varphi$. 使用这个关系,

$$\varphi_*(X_g) = \varphi_*((l_g)_*u) = (l_{\varphi(g)})_*(\varphi_*(u)) = (\varphi_*X)_{\varphi(g)}.$$

设 f 是 G_2 上任意的可微实函数, 那么

$$\varphi_*(X_g)f = X_g(f \circ \varphi),$$

或者使用 $\varphi_{*g}(X_g) = (\varphi_*X)_{\varphi(g)}$ 写作

$$(\varphi_*(X)f) \circ \varphi = X(f \circ \varphi),$$

同理有 $(\varphi_*(Y)f) \circ \varphi = Y(f \circ \varphi)$. 所以

$$\begin{aligned} ([\varphi_*(X), \varphi_*(Y)]f) \circ \varphi &= ((\varphi_*(X) \circ \varphi_*(Y) - \varphi_*(Y) \circ \varphi_*(X))f) \circ \varphi \\ &= X((\varphi_*(Y)f) \circ \varphi) - Y((\varphi_*(X)f) \circ \varphi) \\ &= X(Y(f \circ \varphi)) - Y(X(f \circ \varphi)) \\ &= [X, Y](f \circ \varphi). \end{aligned}$$

这就是说对任意的 g 都有

$$\varphi_{*g}([X, Y]_g) = [\varphi_{*g}(X_g), \varphi_{*g}(Y_g)]$$

特别地 $g = e$, 则

$$\varphi_{*e}[u, v] = [\varphi_{*e}u, \varphi_{*e}v].$$

上面基本都是从 Lie 群去得到 Lie 代数, 而且是唯一确定的。那么反过来, 我们是否可以从 Lie 代数得到 Lie 群, 如果可以得到, 又能确定到哪种程度? 这些内容是下面两个定理的内容。

Theorem 32. 我们有一个任意的有限维 Lie 代数 \mathfrak{g} , 那么在同构意义下有唯一的单连通 Lie 群 G , 他的 Lie 代数就是 \mathfrak{g} .

如果两个 Lie 群有着相同的有限维 Lie 代数, 我们虽然不能判断他们是同构的, 但是我们可以找到同构的单连通 Lie 群。而下面的定义告诉我们, 这个单连通 Lie 群就是原 Lie 群的万有覆盖空间。

Theorem 33. 一个连通 Lie 群 G , 记 G' 为其万有覆盖空间, 覆盖映射为 $\pi: G' \rightarrow G$. 对于任意的选择 $e' \in \pi^{-1}(e)$, 总有唯一的 G' 上的 Lie 群结构使得 e' 是单位元且 π 是群同态。

本节的最后, 讲一下 Lie 群的结构方程, 我们将 Maurer-Cartan 形式求一下外微分, 可以得到

$$d\omega_G(X, Y) = X(\omega_G(Y)) - Y(\omega_G(X)) - \omega_G([X, Y]).$$

假设, X 和 Y 是左不变矢量场, 则 $\omega_G(Y)$ 和 $\omega_G(X)$ 都是常数, 那么得到

$$d\omega_G(X, Y) + \omega_G([X, Y]) = 0.$$

因为 $[X, Y]$ 在点 e 的值是在 \mathfrak{g} 里面的, 所以这一项也等于 $\omega_G([X, Y]) = [\omega_G(X), \omega_G(Y)]$, 最后就得到了 Lie 群的结构方程

$$d\omega_G(X, Y) + [\omega_G(X), \omega_G(Y)] = 0.$$

由于这个方程是微分过的结果, 可以看成是微分方程, 他确定了 Lie 群的局部结构。虽然我们的证明是选取了两个左不变矢量场, 但是每一个矢量场在在局部都可以变成左不变矢量场的限制, 所以我们的方程总是成立的。如果群是 Abel 群, 那么方程的第二项为 0, 即 $d\omega_G = 0$.

§3 More on Algebraic Structure

这节稍稍谈谈 Lie 代数的代数构造, 很重要的一点就是其为矢量空间, 这样我们就可以谈直和直积复化什么的。

我们这里感兴趣的是群表示是一种矢量空间为 \mathfrak{g} 的表示。这要从伴随作用开始。

Lie 群 G 的伴随和他的 Lie 代数 \mathfrak{g} 的联系来自于伴随 $\mathbf{Ad}(g): h \mapsto ghg^{-1}$ 在单位元上的导数 $\text{Ad}_g = \mathbf{Ad}(g)_*: T_e G \rightarrow T_e G$, 但注意到 Lie 代数 \mathfrak{g} 就是 Lie 群在单位元的切空间 $T_e G$, 所以 $\text{Ad}_g \in \text{GL}(\mathfrak{g})$ 。我们将 $\text{Ad}: G \rightarrow \text{GL}(\mathfrak{g})$ 称为 Lie 群的伴随表示。

Proposition 34. 对于伴随, 我们有

- (1) $\text{Ad}_g : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$ 是一个 *Lie* 代数间的同构, 而 $\text{Ad} : G \rightarrow \text{GL}(\mathfrak{g})$ 是一个 *Lie* 群间的同态。
- (2) 如果 X 是 G 上的左不变向量场, 那么 $\text{Ad}_g X$ 对于任意 $g \in G$ 也是。
- (3) 记右作用为 r , 那么 $r_g^* \omega_G = \text{Ad}(g^{-1}) \omega_G$.

第一个是显然的。第二个首先注意到左作用和右作用是可交换的, 因此他们的导数也是可以交换的, 那么:

$$(l_h)_*(\text{Ad}_g X) = (l_h)_*(l_g)_*(r_{g^{-1}})_* X = (r_{g^{-1}})_* X = (r_{g^{-1}})_*(l_g)_* X = \text{Ad}_g X.$$

第三个设 $v \in T_h G$, 因此 $(r_g)_* v \in T_{hg} G$, 于是

$$(r_g)^* \omega_G(v) = \omega_G((r_g)_* v) = (l_{hg^{-1}})_*(r_g)_* v = (l_{g^{-1}})_*(r_g)_*(l_h)_* v = \text{Ad}(g^{-1}) \omega_G.$$

Definition 35. 设 \mathfrak{g} 是一个 *Lie* 代数, 那么

- (1) $\text{Aut}_{\text{Lie}}(\mathfrak{g}) = \{T \in \text{GL}(\mathfrak{g}) \mid T[u, v] = [Tu, Tv], \forall u, v \in \mathfrak{g}\}$
- (2) $\mathfrak{gl}_{\text{Lie}}(\mathfrak{g}) = \{T \in \mathfrak{gl}(\mathfrak{g}) \mid T[u, v] = [Tu, v] + [u, Tv], \forall u, v \in \mathfrak{g}\}$

Proposition 36. 如下陈述成立:

- (1) $\text{Aut}_{\text{Lie}}(\mathfrak{g})$ 是一个 *Lie* 群。
- (2) $\text{Aut}_{\text{Lie}}(\mathfrak{g})$ 的 *Lie* 代数是 $\mathfrak{gl}_{\text{Lie}}(\mathfrak{g})$ 。
- (3) 令 G 的 *Lie* 代数为 \mathfrak{g} , 那么 $\text{ad}(u)v = [u, v]$ 是 $\text{Ad} : G \rightarrow \text{GL}_{\text{Lie}}(\mathfrak{g})$ 在 e 的导数 $\text{ad} = \text{Ad}_{*e} : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}_{\text{Lie}}$ 。

在第三点中, 我们看到了曾经在 Jacobi 恒等式那边指出的导子, 可以看到, 这确实确实就是一个导数。

我们拿一般线性群举个例子, 前面已经计算过了 $(l_g)_* = l_g$, 那么同样 $(r_g)_* = r_g$, 所以

$$\text{Ad}_g = (l_g)_*(r_{g^{-1}})_* = l_g r_{g^{-1}}.$$

那么

$$\text{Ad}_g(v) = (l_g)_*(r_{g^{-1}})_* v = l_g r_{g^{-1}} v = g v g^{-1}.$$

我们现在求他的 *Lie* 代数, 考虑 $u, v \in \mathfrak{g}$, 我们令 $u(t)$ 是一个以 u 为初速度的单参子群, 那么我们有

$$\frac{d}{dt}(\text{Ad}_{u(t)}(v)) = u'(t) v u^{-1}(t) + u(t) v (u^{-1}(t))' = u'(t) v u^{-1}(t) - u(t) v u^{-1}(t) u'(t) u^{-1}(t).$$

然后令 $t = 0$, 那么 $u(0) = u^{-1}(0) = I$, 而 $u'(0) = u$, 那么就得到了单位元处的切矢量, 也就是 Lie 代数

$$\text{ad}(u)v = uv - vu = [u, v].$$

类似的手段譬如

$$T(t)[u, v] = [T(t)u, T(t)v],$$

求个导, 然后在 $t = 0$ 处的值为

$$T'(0)[u, v] = [T'(0)u, T(0)v] + [T(0)u, T'(0)v],$$

注意到 $T(0)$ 是恒等变换, 而 $T'(0)$ 就是我们需要的 Lie 代数 B , 他需要满足的关系就是

$$B[u, v] = [Bu, v] + [u, Bv],$$

其显然是 Lie 代数上面的一个导子。

Definition 37. 令 \mathfrak{g} 是一个 Lie 代数, 那么他的有限维表示 (π, V) 就是一个映射 $\pi: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$.

所以说 ad 就是一个 Lie 代数的表示。

一个 Lie 群的表示可以引出他的 Lie 上面的一个表示如下:

$$\pi_*(X) = \left. \frac{d}{dt} \pi(e^{tX}) \right|_{t=0},$$

或者

$$\pi(e^{tX}) = e^{\pi_*(X)}.$$

Proposition 38. π 是不可约的当且仅当 π_* 是不可约的; π 是完全可约的当且仅当 π_* 是完全可约的; 两个 π 和 η 是等价的当且仅当 π_* 和 η_* 是等价的。

对两个 Lie 群的表示的直积求导, 就得到了 Lie 代数表示的直积形式应该满足:

$$\left. \frac{d}{dt} (\pi(g) \otimes \eta(g)) \right|_{t=0} = \pi_*(g) \otimes I + I \otimes \eta_*(g) = (\pi_* \otimes I + I \otimes \eta_*)(g),$$

我们就将其作为 Lie 代数表示直积的定义。

迄今为止, 我们都只谈论了实数域上面的 Lie 代数, 当然, 我们可以直接拓展到复数域上面去, 但是复化的手段也是常用的。

Definition 39. 如果 V 是有限维实的向量空间, 那么所有 $v_1 + iv_2$ 所构成的空间被称为他的复化, 记做 $V_{\mathbb{C}}$, 其中 $v_1, v_2 \in V$. 如果我们再定义

$$i(v_1 + iv_2) = -v_2 + iv_1,$$

那么 $V_{\mathbb{C}}$ 就是有限维的复向量空间。

由于 Lie 代数也是向量空间，我们可以对其复化，显然，我们希望复化后对易子满足

$$[X_1 + iX_2, Y_1 + iY_2] = ([X_1, Y_1] - [X_2, Y_2]) + i([X_1, Y_2] + [X_2, Y_1]),$$

也就是说对易子对 i 也是线性的。可以直接验证，我们这样定义的确实是对易子且是唯一的。

因为 Lie 代数是向量空间，所以作为向量空间，两个 Lie 代数可以直积，如果有两个 Lie 代数 \mathfrak{g}_1 和 \mathfrak{g}_2 ，我们在 $\mathfrak{g}_1 \otimes \mathfrak{g}_2$ 如下定义交换子：

$$[a_1 \otimes b_1, a_2 \otimes b_2] = [a_1, b_1] \otimes [a_2, b_2],$$

那么很容易看到 $\mathfrak{g}_1 \otimes \mathfrak{g}_2$ 也变成了 Lie 代数。

同样，两个 Lie 代数也可以直和。如果有两个 Lie 代数 \mathfrak{g}_1 和 \mathfrak{g}_2 ，那么直和的 $\mathfrak{g}_1 \oplus \mathfrak{g}_2$ 上的交换子写作

$$[(X_1, X_2), (Y_1, Y_2)] = ([X_1, Y_1], [X_2, Y_2]).$$

上面的直积直和的 Lie 代数结构的验证，尤其是 Jacobi 恒等式的验证就略去了。谈了直积和直和，我们就可以谈论 Lie 代数的分类和分解。

Definition 40. 令 \mathfrak{g} 是一个实（复）Lie 代数，如果他的实（复）子代数 \mathfrak{h} 满足对所有的 $X \in \mathfrak{g}, H \in \mathfrak{h}$ 都有 $[X, H] \in \mathfrak{h}$ ，则称 \mathfrak{h} 是 \mathfrak{g} 的一个理想。¹

一个代数 \mathfrak{g} 显然有两个理想，一个是 0 一个是 \mathfrak{g} ，我们称这两个为平凡理想。

Definition 41. 一个实（复）Lie 代数 \mathfrak{g} 如果没有非平凡理想，则称其为不可分解的。如果一个 Lie 代数的维度大于 1 且是不可分解的，则称其为单的。

从定义来看，不可分解但非单的 Lie 代数只可能是一维的。对于一维 Lie 代数来说，他没有非平凡子代数，其中任意两个元素的交换子为 0，从而可以看到他是不可分解的。

我们可以将有限群和有限维 Lie 代数类比。Lie 代数的子代数就对应有限群的子群，Lie 代数的理想就对应有限群的正规子群，一维 Lie 代数就对应素数阶的循环群（他是没有子群的，这个很简单就可以证明，使用 Lagrange 公式还可以得知素数阶的有限群一定是循环群）。

Definition 42. 一个实（复）Lie 代数 \mathfrak{g} 如果同构于不可分解 Lie 代数的直和，那么称呼其为可约的。如果其同构于单 Lie 代数的直和，就称呼其为半单的。

下面的定理连接了紧矩阵 Lie 群以及半单 Lie 代数。

Theorem 43. 一个复 Lie 代数是半单的当且仅当他同构于一个单连通的紧矩阵 Lie 群的 Lie 代数的复化。

¹可以搜一搜 ring 和 ideal 的笑话。

我们已经做过了从实 Lie 代数复化得到一个复 Lie 代数, 那么自然地, 我们可以问反问题, 对一个复 Lie 代数是否可以寻找一个实 Lie 代数, 那个实 Lie 代数的复化就是原本的复 Lie 代数。

Definition 44. 如果 \mathfrak{g} 是一个复的半单 Lie 代数, 那么 \mathfrak{g} 的紧实形式 (compact real form) 是 \mathfrak{g} 的一个子代数 \mathfrak{l} 使得对任意的 $X \in \mathfrak{g}$ 都可以找到两个 $X_1, X_2 \in \mathfrak{l}$ 满足 $X = X_1 + iX_2$. 因此, 存在一个单连通的紧矩阵 Lie 群 K_1 使得 K_1 的 Lie 代数同构于 \mathfrak{g} 的紧实形式。

上面一个定理告诉我们上面这个反问题在半单 Lie 代数的情况下始终是有解的。

Proposition 45. 如果 \mathfrak{g} 是一个实的 Lie 代数, 那么他是半单的当且仅当他的复化 $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ 是半单的。

从这个可以推知, 紧的单连通矩阵 Lie 群的实 Lie 代数是半单的。当然, 反过来, 不是任何半单实 Lie 代数都可以找到紧的单连通矩阵 Lie 群。

Definition 46. 如果 \mathfrak{g} 是一个复的半单 Lie 代数, 那么 \mathfrak{g} 的一个子空间 \mathfrak{h} 被称为 \mathfrak{g} 的 Cartan 子代数, 如果满足:

- (1) 对于任意的两个元素 $H_1, H_2 \in \mathfrak{h}$, 都有 $[H_1, H_2] = 0$;
- (2) 对于任意的 $X \in \mathfrak{g}$, 如果有 $[X, H] = 0$ 对全部 $H \in \mathfrak{h}$ 都成立, 则 $X \in \mathfrak{h}$.
- (3) 对于全部 $H \in \mathfrak{h}$, $\text{ad}(H)$ 作为 Lie 代数的表示是完全可约的。

Cartan 子代数的维度称为半单 Lie 代数的秩。

条件 1 说明了 Cartan 子代数是交换子代数, 然后条件 2 就说明这个极大的交换子代数。

Proposition 47. 令 \mathfrak{g} 是一个复的半单 Lie 代数, 令 \mathfrak{l} 是 \mathfrak{g} 的紧实形式, 再令 \mathfrak{t} 是 \mathfrak{l} 任意的极大交换子代数, 定义 $\mathfrak{h} \in \mathfrak{g}$ 为 $\mathfrak{h} = \mathfrak{t} + i\mathfrak{t}$. 然后, \mathfrak{h} 就是 \mathfrak{g} 的 Cartan 子代数。

我们以后下面要谈论 Lie 群和 Lie 代数的表示, 但是却只限制在紧 Lie 群, 特别是紧的矩阵群上面, 从而根据上面的定理, 我们也只要去研究半单 Lie 代数就可以了。

§4 Matrix Group

这一节限制在矩阵群上面, 这节将给出很多可计算的例子, 先来求一些矩阵群的 Lie 代数。

Theorem 48. 任意的矩阵 $M \in \text{GL}(n, \mathbb{C})$ 都可以写作 e^X 的形式, 其中 $X \in \text{M}(n, \mathbb{C})$ 。

这个直接从矩阵幂那一套证明并不那么方便, 但是直接从 Lie 代数作为单位元附近的 Lie 群与单参子群的对应关系, 这个结论就是比清晰的了。

这个定理也可以用来说明, 一般线性群的 Lie 代数就是整个方阵构成的集合。

Proposition 49. $e^{DAD^{-1}} = De^AD^{-1}$.

这个结论我们已经证明过了，前面写作

$$\text{Ad}_D(A) = DAD^{-1}.$$

当然也可以直接用矩阵指数映射的展开来证明。

Proposition 50. $\det e^A = e^{\text{tr}(A)}$.

这个的证明可以将矩阵分解为幂零的和可对角化的两个矩阵的乘积 $A = SN$ ，因为 S 和 N 可交换，所以

$$\det(e^A) = \det(e^S) \det(e^N).$$

如果可以对角化，那么直接对角化为

$$e^S = e^{D\Lambda D^{-1}} = De^\Lambda D^{-1},$$

而 e^Λ 是可以直接计算的，即 $\text{diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n})$. 那么

$$\det(e^S) = \det(De^\Lambda D^{-1}) = \det(e^\Lambda) = e^{\sum_i \lambda_i} = e^{\text{tr}(\Lambda)} = e^{\text{tr}(S)}$$

对于幂零矩阵来说，容易验证 $\det e^N = 1$ ，最后就可以得到任意矩阵都有

$$\det e^A = e^{\text{tr}(A)}.$$

有了上面的一些结论，我们来求特殊线性群 $\text{SL}(n, \mathbb{C})$ 的 Lie 代数 $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{C})$ 。如果 $\det e^A = 1$ ，那么 $e^A \in \mathfrak{sl}(n, \mathbb{C})$ ，而 $A \in \mathfrak{sl}(n, \mathbb{C})$ ，因为 $e^{\text{tr}(A)} = \det e^A = 1$ ，所以 $\text{tr}(A) = 0$ 。这就是说 $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{C})$ 就是那么迹为 0 的矩阵的集合。

作为 $\text{SL}(n, \mathbb{C})$ 的子群， $\text{SU}(n)$ 的元素满足 $AA^\dagger = I$ ，那么

$$dAA^\dagger + \text{Ad}A^\dagger = 0,$$

或者整理成 Maurer-Cartan 形式的样子

$$A^{-1}dA + (A^{-1}dA)^\dagger = 0,$$

这就是说， $\mathfrak{su}(n)$ 是由满足 $B + B^\dagger = 0$ 的矩阵零迹矩阵 B 构成的集合。当然，这也可以用矩阵幂来做，我们略去了。

从矩阵幂的形式

$$e^A = \sum_{i=0}^n \frac{A^i}{i!},$$

我们当然会去遐想，是否其他函数也有这样的幂函数展开？其中最有趣的展开莫过于 \log 了，因为他是 \exp 的反函数。就这样，我们定义

$$\log A = \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^{m+1} \frac{(A - I)^m}{m}.$$

当 $\|A - I\| < 1$ 的时候，这个幂级数显然是收敛且连续的。我们也确实可以证明在收敛的时候他和 \exp 是反函数，适当对角化（不能的话就用可对角的矩阵序列趋近）之后就可以直接计算验证。

前面说过 e^{X+Y} 在 X, Y 不对易的时候是一般不等于 $e^X e^Y$ ，这里我们举一个例子：

$$X = \begin{pmatrix} 1 & \\ & 2 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} & 1 \\ 2 & \end{pmatrix},$$

直接计算就知道 $[X, Y] \neq 0$. 然后 e^X 是容易计算的，因为他是对角的

$$e^X = \begin{pmatrix} e & \\ & e^2 \end{pmatrix},$$

后面的 Y 对角化之后也是容易的，

$$Y = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sqrt{2} & \\ & \sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

所以

$$e^Y = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \exp(-\sqrt{2}) & \\ & \exp(\sqrt{2}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

那么

$$e^X e^Y = \begin{pmatrix} e & \\ & e^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cosh(\sqrt{2}) & \sinh(\sqrt{2})/\sqrt{2} \\ \sqrt{2} \sinh(\sqrt{2}) & \cosh(\sqrt{2}) \end{pmatrix}.$$

e^{X+Y} 的计算不再重复了

$$e^{X+Y} = \begin{pmatrix} 2/3 + e^3/3 & e^3/3 - 1/3 \\ 2e^3/3 - 2/3 & 2e^3/3 - 2/3 \end{pmatrix}.$$

所以 $e^{X+Y} \neq e^X e^Y$.

Proposition 51. 令 X, Y 都是 $n \times n$ 的矩阵，则

$$e^{X+Y} = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(e^{X/m} e^{Y/m} \right)^m.$$

这证明挺简单的，所以略去了。下面这个公式更加复杂，因此证明也很复杂，以至于都需要一个名字来标记这个公式了。证明也略去了。

Theorem 52. *Campbell-Baker-Hausdorff 公式:*

$$\log(e^X e^Y) = X + \int_0^1 \varphi(e^{\text{ad}(X)} e^{t\text{ad}(Y)}) (Y) dt,$$

其中

$$\varphi(z) = \frac{z \log z}{z - 1}.$$

幂级数展开 $\varphi(z)$ 我们有

$$\varphi(z) = 1 + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) (z-1)^{n-1}.$$

带入上面的公式, 就可以得到漂亮的展开

$$\log(e^X e^Y) = X + Y + \frac{1}{2}[A, B] + \frac{1}{12}[A, [A, B]] - \frac{1}{12}[B, [A, B]] + \cdots.$$

级数展开不是上面公式的重点, 重点是展开后全是对易子 $[\bullet, \bullet]$ 的形式, 直接来自于积分里面的 ad . 所以使用这个公式可以证明矩阵 Lie 群和 Lie 代数关系中的映射关系, 因为 Lie 代数同态是可以分配进对易子的但是对于一般的 X 和 Y 的线性组合却是不可以的。

我们现在来对 Lie 代数进行展开, 设 Lie 代数的基为 $\{a_i\}$, 那么

$$[x, y] = \sum_{i,j} x_i y_j [a_i, a_j].$$

但是因为交换子是封闭的, 所以

$$[a_i, a_j] = \sum_k c_{kij} a_k.$$

然后考虑伴随表示的展开

$$\text{ad}(a_i)(a_j) = \sum_k \text{ad}(a_i)_{kj} a_k.$$

对于一般线性群的 Lie 代数来说 $\text{ad}(a_i)(a_j) = [a_i, a_j]$, 这就是说

$$[a_i, a_j] = \sum_k \text{ad}(a_i)_{kj} a_k.$$

使用线性性, 我们最后得到

$$[x, a_i] = \sum_k \text{ad}(x)_{ki} a_k.$$

这样, 我们就可以求得 $\text{ad}(x)$ 的矩阵。

现在来考虑 $\mathfrak{so}(3)$ 的 Lie 代数, 因为 $\mathfrak{so}(3)$ 是那些 3×3 的反对称矩阵构成的集合, 我们取下面三个矩阵作为基

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

然后可以计算对易子如下

$$[\eta_1, \eta_2] = \eta_3, \quad [\eta_1, \eta_3] = -\eta_2, \quad [\eta_2, \eta_3] = \eta_1.$$

如果建立映射 $\eta_i \mapsto e_i$, 其中 e_i 就是 \mathbb{R}^3 的标准基, 而映射将 $[\bullet, \bullet]$ 映射为叉乘, 那么这就是一个 Lie 代数同构。

那么我们也可以计算得伴随表示为

$$\text{ad}(\eta_1) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{ad}(\eta_2) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{ad}(\eta_3) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

有趣的是, 在这组基的选取下 $\text{ad}(\eta_i) = \eta_i$.

下面来看看 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$, 他是所有二阶零迹矩阵构成的群, 我们设他的基为

$$h = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad e = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad f = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

那么

$$[h, e] = 2e, \quad [h, f] = -2f, \quad [e, f] = h.$$

所以

$$\text{ad}(h) = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad \text{ad}(e) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{ad}(f) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Definition 53. 定义 Killing 形式为 $(x, y)_K$ 如下

$$(x, y)_K = \text{tr}(\text{ad}(x)\text{ad}(y)),$$

其中 x, y 是任意的 Lie 代数元素。

在选取基的形式下, 我们可以得到矩阵 $K_{ij} = (a_i, a_j)_K$.

Theorem 54. *Killing* 形式是双线性的, 且

(1) 对于任意的 *Lie* 代数自同构 φ 我们对任意的 x, y 都有 $(\varphi x, \varphi y)_K = (x, y)_K$,

(2) 对于任意的 x, y, z 有 $([x, y], z)_K = (x, [y, z])_K$,

(3) 如果 \mathfrak{h} 是 \mathfrak{g} 的理想, 那么在 \mathfrak{h} 上的 *Killing* 形式 $(\bullet, \bullet)_{K_{\mathfrak{h}}}$ 和原本的 *Killing* 形式 $(\bullet, \bullet)_K$ 对于所有 $x, y \in \mathfrak{h}$ 满足 $(x, y)_{K_{\mathfrak{h}}} = (x, y)_K$.

对于第二点, 注意到 $\text{ad}([x, y]) = \text{ad}(x)\text{ad}(y) - \text{ad}(y)\text{ad}(x)$,

$$\begin{aligned} ([x, y], z)_K - (x, [y, z])_K &= \text{tr}\{\text{ad}([x, y])\text{ad}(z) - \text{ad}(x)\text{ad}([y, z])\} \\ &= \text{tr}\{\text{ad}(x)\text{ad}(y)\text{ad}(z) - \text{ad}(y)\text{ad}(z)\text{ad}(x)\} \\ &= 0. \end{aligned}$$

Theorem 55. 一个 *Lie* 代数是半单的当且仅当他没有一个非平凡的交换理想²。

这个结论经常也被当成定义, 可以看到这种半单的定义自动抛弃了一维理想的存在, 因为一维理想一定是交换的。

Theorem 56. 一个 *Lie* 代数是半单的, 当且仅当他的 *Killing* 形式是非退化的, 即矩阵 $K_{ij} = (a_i, a_j)_K$ 是非退化的, 或者对任意的 a 都成立 $(a, b)_K = 0$ 的话能推出 $b = 0$ 。

靠这个定理, 我们来看看 $\mathfrak{so}(3)$ 是否是半单的。容易计算得他的 *Killing* 形式为

$$K_{ij} = (\eta_i, \eta_j)_K = \text{tr}(\eta_i \eta_j) = -2\delta_{ij}.$$

当然是非退化的, 所以 $\mathfrak{so}(3)$ 是半单 *Lie* 代数。同理 $\mathfrak{sl}(2)$ 也是半单 *Lie* 代数。

§5 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$, $\mathfrak{so}(3)$ and $\mathfrak{su}(2)$

在分析一般的半单 *Lie* 代数之前, 我们先来看看几个比较简单的 *Lie* 代数 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$, $\mathfrak{so}(3)$ 和 $\mathfrak{su}(2)$, 他们之间存在着紧密的联系。

前面已经证明过 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$, $\mathfrak{so}(3)$ 的基和相互的对易关系有

$$[h, e] = 2e, \quad [h, f] = -2f, \quad [e, f] = h,$$

$$[\eta_1, \eta_2] = \eta_3, \quad [\eta_1, \eta_3] = -\eta_2, \quad [\eta_2, \eta_3] = \eta_1.$$

²交换理想首先是一个理想, 然后也是一个交换子代数。

现在我们来考察 $\mathfrak{su}(2)$ 的表现，他是所有满足 $B + B^\dagger = 0$ 的复二阶零迹矩阵 B 的集合。我们选如下三个矩阵作为基：

$$\mu_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \mu_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mu_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}.$$

容易验证

$$[\mu_1, \mu_2] = \mu_3, \quad [\mu_1, \mu_3] = -\mu_2, \quad [\mu_2, \mu_3] = \mu_1.$$

这和 $\mathfrak{so}(3)$ 的对易关系一模一样，于是我们可以引入 \mathbb{R} -线性映射建立两者作为实 Lie 代数的同构，也就是 $\mathfrak{so}(3) \cong \mathfrak{su}(2)$ 。

很容易证明 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})$ 的复化即 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ ，这就是说 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})_{\mathbb{C}} = \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ 。为了分析 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ 的结构，我们来看 $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ 的结构。

任何一个复可逆 2×2 矩阵都可以唯一分解（极分解）为

$$\lambda = ue^h$$

其中 u 么正而 h 是 Hermite 矩阵。现在假如 $\det \lambda = 1$ ，则

$$\det(u)e^{\mathrm{tr}(h)} = 1$$

于是 $\det(u) = 1$ 而 $\mathrm{tr}(h) = 0$ 。前者的一般形式为

$$u = \begin{pmatrix} a + ib & c + id \\ -c + id & a - ib \end{pmatrix},$$

且满足 $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 1$ ，因此其拓扑上等价为 3-球面 \mathbb{S}^3 。而前者的一般形式为

$$h = \begin{pmatrix} e & f - ig \\ f + ig & -e \end{pmatrix},$$

拓扑上等价于 \mathbb{R}^4 ，因此 $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ 在拓扑上等价于 $\mathbb{R}^4 \times \mathbb{S}^3$ 。当然拓扑上的结论在我们这里暂时没什么用。

这样来看 $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ 的 Lie 代数 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ ，在 $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ 的极分解中，令 $b = -ih$ ，则

$$\mathrm{tr}(b) = 0, \quad b^\dagger + b = 0,$$

以及 $u = e^a$ 有

$$\mathrm{tr}(a) = 0, \quad a^\dagger + a = 0,$$

所以 $a, b \in \mathfrak{su}(2)$ ，且 $\lambda = e^{a+ib}$ 。

注意到任取一个实数 t 和 $a \in \mathfrak{su}(2)$, 还有 $ta \in \mathfrak{su}(2)$, 所以任意的一个 $\lambda \in \mathfrak{SL}(2, \mathbb{C})$ 都可以写成

$$\lambda = e^{ta+ib}$$

他在 $t = 0$ 的导数 $a + ib$ 就构成 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$, 那么任意的 $c \in \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ 都可以写成

$$c = a + ib,$$

其中 $a, b \in \mathfrak{su}(2)$, 这就是说 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ 是 $\mathfrak{su}(2)$ 的复化。

单纯从 Lie 代数来看, 我们在 $\mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}}$ 中引入 $L_n = i\mu_n$, 则

$$[L_1, L_2] = iL_3, \quad [L_1, L_3] = -iL_2, \quad [L_2, L_3] = iL_1.$$

再引入 $L_{\pm} = L_1 \pm iL_2$, 则

$$[L_+, L_-] = 2L_3, \quad [L_3, L_+] = L_+, \quad [L_3, L_-] = -L_-.$$

我们令 $h' = 2h, e' = 2e, f' = 2f$, 则 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ 的三个基的对易关系变成

$$[e', f'] = 2h', \quad [h', e'] = e', \quad [h', f'] = -f'.$$

可见一模一样。

这样, 三个 Lie 代数之间的关系就清楚了

$$\mathfrak{su}(2) \cong \mathfrak{so}(3), \quad \mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}} \cong \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}) \cong \mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})_{\mathbb{C}}.$$

现在来看 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ 的有限维不可约表示, 每一个 Lie 代数的元素 a 都变成了有限维矢量空间 V 上面的线性映射 $\pi(a)$, 复数域的代数完备性可以推知 $\pi(h)$ 有一个特征值, 即

$$\pi(h)v = \lambda v.$$

那么

$$\pi(h)\pi(e)v = [\pi(h), \pi(e)]v + \pi(e)\pi(h)v = (\lambda + 2)\pi(e)v.$$

所以 $\pi(e)v$ 也是 $\pi(h)$ 的本征矢量, 本征值是 $\lambda + 2$, 同理 $\pi(f)v$ 也是 $\pi(h)$ 的本征矢量, 本征值是 $\lambda - 2$.

我们反复作用 $\pi(e)$ 和 $\pi(f)$ 到 v 上就可以得到

$$\pi(h)\pi(e)^n v = (\lambda + 2n)\pi(e)^n v,$$

所以, 要么 $\pi(e)^n v$ 也是一个本征矢, 本征值为 $\lambda + 2n$, 或者 $\pi(e)^n v = 0$ 。由于 V 是有限维的, 我们不可能有着无穷多个不同的本征值, 因此存在一个 $N \geq 0$ 使得

$$\pi(e)^N v \neq 0, \quad \pi(e)^{N+1} v = 0$$

这就是说存在一个 u_0 使得

$$\pi(h)u_0 = \lambda u_0, \quad \pi(e)u_0 = 0.$$

λ 是 $\pi(h)$ 的最大的本征值。

我们再定义 $u_k = \pi(f)^k u_0$, 那么

$$\pi(h)u_k = (\lambda - 2k)u_k,$$

也不可能无限地进行下去。就是说存在一个 $m \in \mathbb{N}$ 使得 $k \leq m$ 满足 $u_k \neq 0$ 但 $u_{m+1} = 0$ 。

使用归纳法和对易关系 $[\pi(e), \pi(f)] = \pi(h)$ 可以算得

$$\pi(e)u_k = (k\lambda - k(k-1))u_{k-1} \quad (k > 0).$$

假如 $u_{m+1} = 0$, 那么

$$0 = \pi(e)u_{m+1} = ((m+1)\lambda - m(m+1))u_m = (m+1)(\lambda - m)u_m.$$

这就是说 $\lambda = m$. 那么一个本征值为正整数, 其他的本征值可以通过 $\lambda - 2n$ 得到, 所以也是整数, 这就推出了:

Proposition 57. $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ 的 $m+1$ 维不可约表示中 $\pi(h)$ 的本征值都是整数, 且可以对角化为 $\text{diag}(m, m-2, \dots, -m+2, m)$ 。

到上面为止, 唯一留下的就是要证明对任意的 m 上面的表示都是不可约的, 而且确实是 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ 的表示。为此, 我们可以证明 $\{u_0, u_1, \dots, u_m\}$ 构成一组基, 这是因为每一个 u_k 都是 $\pi(h)$ 对应不同本征值的本征矢量, 于是 $\pi(f)u_k = u_{k+1}$ 保证了不可约性。而他是 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ 的表示则是可以直接计算验证的, 略去之。

将表示的矩阵写出来可能更加清晰, $\pi_m(h) = \text{diag}(m, m-2, \dots, -m+2, m)$ 和

$$\pi_m(e) = \begin{pmatrix} 0 & m & & & \\ & 0 & m-1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & 1 \\ & & & & 0 \end{pmatrix}, \quad \pi_m(f) = \begin{pmatrix} 0 & & & & \\ 1 & 0 & & & \\ & 2 & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & m & 0 \end{pmatrix}.$$

在物理上更习惯用整数或者半整数 $j = m/2$ 来表示维度, 并且会适当调整 $\pi(h)$ 的系数, 这就造成了角动量问题中的半整数的出现。

Proposition 58. $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ 的 $2j+1$ 维不可约表示中 $\pi(h)$ 的本征值或者是整数或者是半整数, 且可以对角化为 $\text{diag}(-j, -j+1, \dots, j-1, j)$ 。

§6 Semi-simple Lie Algebras

对于有限维半单复 Lie 代数 \mathfrak{g} , 我们可以找到其也是有限维的紧实形式。因为是半单的, 所以这个紧实形式也同构于一个紧 Lie 群 H 的 Lie 代数 \mathfrak{h} (直接就看成是了), 所以 $\mathfrak{g} = \mathfrak{h} + i\mathfrak{h}$, 那么 \mathfrak{h} 上面存在着内积在表示 $\text{Ad} : H \rightarrow \text{GL}(\mathfrak{h})$ 作用下不变, 即

$$(e^{t\text{ad}(h)}x, e^{t\text{ad}(h)}y) = (x, y).$$

其中 $x, y \in \mathfrak{h}$, 可以把这个内积推广到 \mathfrak{g} 内取复值的内积, 让我们还是使用符号 (\bullet, \bullet) 来标记他, 那么求导就有

$$(\text{ad}(h)x, y) + (x, \text{ad}(h)y) = 0.$$

所以表示 ad 是反 Hermit 的, 即

$$\text{ad}(h) + \text{ad}(h)^\dagger = 0.$$

此时 $i\text{ad}(h)$ 就是 Hermit 的, 因此根据有限维的谱定理, 我们一定可以对角化 $i\text{ad}(h)$, 也就是说可以对角化 $\text{ad}(h)$ 当 $h \in \mathfrak{h}$, 而且是对角元是纯虚的。特别地, 如果 h 在 \mathfrak{h} 的极大交换子代数 \mathfrak{l} 里面, $\text{ad}(h)$ 也是可以对角化的。因此如果 $h_1, h_2 \in \mathfrak{l}$, $\text{ad}(h_1), \text{ad}(h_2)$ 是可交换的, 那么他们的线性组合 $h = h_1 + ih_2$ 对应的 $\text{ad}(h)$ 也是可以对角化的³。此时 $\mathfrak{l} + i\mathfrak{l}$ 就是 \mathfrak{g} 的 Cartan 子代数, 所以如果 h 在 \mathfrak{g} 的 Cartan 子代数里面, 那么 $\text{ad}(h)$ 是可以对角化的。

我们可以分解有限维半单复 Lie 代数 \mathfrak{g} 为这样的两个子代数, 其中一个是 Cartan 子代数 \mathfrak{h}

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{g}'.$$

令有限维半单复 Lie 代数 \mathfrak{g} 的秩为 l , 那么设 Cartan 子代数 \mathfrak{l} 的基为 $\{h_1, h_2, \dots, h_l\}$, 因为 $\text{ad}(h_j) : \mathfrak{g}' \rightarrow \mathfrak{g}'$ 且 h_j 在 \mathfrak{g} 的 Cartan 子代数里面, 所以 $\text{ad}(h_j)$ 是可以对角化的, 因此存在 \mathfrak{g}' 的基 $\{v_1, v_2, \dots, v_{n-l}\}$ 使得

$$\text{ad}(h_j)v_k = [h_j, v_k] = \alpha_k(h_j)v_k,$$

其中 $\alpha_k(h_j)$ 就是 $\text{ad}(h_j) : \mathfrak{g}' \rightarrow \mathfrak{g}'$ 的本征值。而 Cartan 子代数作为交换子代数, 我们有交换子 $[h_j, h_k] = 0$ 成立。但 Cartan 子代数又是极大的交换子代数, 所以对任意的 k , 我们总可以找到一个 j 使得 $\alpha_k(h_j) \neq 0$, 否则 $[h_j, v_k] = 0$ 就可以推出 v_k 在 Cartan 子代数 \mathfrak{h} 里面了。

设 $h = \sum_{j=1}^l \mu_j h_j$ 是任意的 Cartan 子代数里面的元素, 那么

$$\text{ad}(h)v_k = [h, v_k] = \sum_{j=1}^l \mu_j \alpha_k(h_j)v_k,$$

³这是因为可交换线性变换可以同时对象化。

我们定义 Cartan 子代数 \mathfrak{h} 上的线性函数 $\alpha_k : \mathfrak{h} \rightarrow \mathbb{C}$ 如下

$$\alpha_k(h) = \sum_{j=1}^l \mu_j \alpha_k(h_j),$$

那么

$$\text{ad}(h)v_k = [h, v_k] = \alpha_k(h)v_k.$$

这样定义的线性函数被称为 \mathfrak{g} 的根, 所有根的集合记做 Δ .

Definition 59. 对有限维半单复 Lie 代数 \mathfrak{g} 的一个根 α , 我们将满足方程的

$$[h, v_\alpha] = \alpha(h)v_\alpha$$

矢量 v_α 构成的集合称为对应于根 α 的根子空间。

我们于是把有限维半单复 Lie 代数的分解更加细化为

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{\alpha \in \Delta} \mathfrak{g}_\alpha.$$

其中 \mathfrak{g}_α 是诸根子空间。Cartan 子代数的根也可以认为是恒为 0 的, 那么 \mathfrak{h} 也可以认为是一个根子空间 \mathfrak{g}_0 。

两个根子空间可以进行对易子运算, 即 $[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_\beta]$, 设 $a_\alpha \in \mathfrak{g}_\alpha, a_\beta \in \mathfrak{g}_\beta$, 则 $[a_\alpha, a_\beta]$ 也是在某个根子空间里面的, 为了求他的根, 我们用对任意的 $h \in \mathfrak{h}$ 求 $\text{ad}(h)[a_\alpha, a_\beta]$, 因为 $\text{ad}(h)$ 是导子, 所以

$$\begin{aligned} \text{ad}(h)[a_\alpha, a_\beta] &= [\text{ad}(h)a_\alpha, a_\beta] + [a_\alpha, \text{ad}(h)a_\beta] \\ &= \alpha(h)[a_\alpha, a_\beta] + [a_\alpha, \beta(h)a_\beta] \\ &= (\alpha(h) + \beta(h))[a_\alpha, a_\beta] \end{aligned}$$

因此, 如果 $\alpha + \beta \in \Delta$, 则 $\text{ad}(h)[a_\alpha, a_\beta] \in \mathfrak{g}_{\alpha+\beta}$, 于是 $[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_\beta] \subset \mathfrak{g}_{\alpha+\beta}$, 否则 $[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_\beta] = \{0\}$.

Theorem 60. 设 $a_\alpha \in \mathfrak{g}_\alpha, a_\beta \in \mathfrak{g}_\beta$, 那么如果 $\alpha + \beta \neq 0$, 则 $(a_\alpha, a_\beta)_K = 0$.

这个证明没什么难度, 考虑 $\text{ad}(a_\alpha)\text{ad}(a_\beta)a_\gamma$ 就可以了。特别地, 我们考虑 $h \in \mathfrak{h}$ 且 $a \in \mathfrak{g}_\alpha$, 则

$$(h, a_\alpha)_K = 0.$$

以此和 Killing 形式在 \mathfrak{g} 上非退化可以推知, Killing 形式在 \mathfrak{h} 上也是非退化的。

那么我们就有可能用非退化的 Killing 形式来表示根, 即对根 α 存在 $h_\alpha \in \mathfrak{h}$ 使得⁴

$$(h_\alpha, h)_K = \alpha(h),$$

⁴使用类似定义对偶空间的方式。

因之

$$h_{\alpha+\beta} = h_\alpha + h_\beta,$$

因为 Killing 形式是对称的, 所以 $(h_\alpha, h_\beta)_K$ 可以推知 $\alpha(h_\beta) = \beta(h_\alpha)$.

Definition 61. 我们定义 $\langle \bullet, \bullet \rangle$ 如下:

$$\langle \alpha, \beta \rangle = (h_\alpha, h_\beta)_K.$$

那么 $\alpha(h_\beta) = \beta(h_\alpha) = \langle \alpha, \beta \rangle = \langle \beta, \alpha \rangle$. 那么 $\langle -\alpha, \beta \rangle = -\alpha(h_\beta) = -\langle \alpha, \beta \rangle$ 以及

$$[h_\beta, a_\alpha] = \langle \beta, \alpha \rangle a_\alpha.$$

因为 $\text{ad}(h)$ 是对角的, 且对角元素为 $\{\alpha(h)\}$, 其中 $\alpha \in \Delta$, 那么直接根据 Killing 形式的定义, 就有

$$(h, h')_K = \sum_{\gamma \in \Delta} (\dim \mathfrak{g}_\gamma) \gamma(h) \gamma(h'),$$

特别地, 我们有

$$\langle \alpha, \beta \rangle = (h_\alpha, h_\beta)_K = \sum_{\gamma \in \Delta} (\dim \mathfrak{g}_\gamma) \gamma(h_\alpha) \gamma(h_\beta) = \sum_{\gamma \in \Delta} (\dim \mathfrak{g}_\gamma) \langle \gamma, \alpha \rangle \langle \gamma, \beta \rangle.$$

Proposition 62. 如果 $\alpha \in \Delta$, 则 $-\alpha \in \Delta$.

假若 $-\alpha \notin \Delta$, 那么对于任何 $\beta \in \Delta$ 都有 $\alpha + \beta \neq 0$, 那么就是说, 对于任何的 $a \in \mathfrak{g}$ 都有 $(a_\alpha, a)_K = 0$, 由 Killing 形式的非退化可以知道此时 $a_\alpha = 0$, 这不可能. 那么, 这样也顺便推出了, 对于任意的 $a_\alpha \in \mathfrak{g}_\alpha$, 一定存在一个 $a_{-\alpha} \in \mathfrak{g}_{-\alpha}$ 使得 $(a_\alpha, a_{-\alpha})_K \neq 0$. 因为 Killing 形式是双线性的, 调整系数我们可以使得 $(a_\alpha, a_{-\alpha})_K$ 成为任意的复常数.

Proposition 63. 设 $a_\alpha \in \mathfrak{g}_\alpha$ 和 $a_{-\alpha} \in \mathfrak{g}_{-\alpha}$, 则 $[a_\alpha, a_{-\alpha}] = (a_\alpha, a_{-\alpha})_K h_\alpha$. 这也说明了, $[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_{-\alpha}]$ 是一维的, 且由 h_α 张成.

这个直接计算就是了, 如果我们选 $E_\alpha \in \mathfrak{g}_\alpha, F_\alpha \in \mathfrak{g}_{-\alpha}$ 满足 $(E_\alpha, F_\alpha)_K = 2/\langle \alpha, \alpha \rangle$, 再选

$$H_\alpha = \frac{2}{\langle \alpha, \alpha \rangle} h_\alpha$$

那么计算对易关系

$$\begin{aligned} [H_\alpha, E_\alpha] &= \frac{2}{\langle \alpha, \alpha \rangle} [h_\alpha, E_\alpha] = \frac{2}{\langle \alpha, \alpha \rangle} \langle \alpha, \alpha \rangle E_\alpha = 2E_\alpha, \\ [H_\alpha, F_\alpha] &= \frac{2}{\langle \alpha, \alpha \rangle} [h_\alpha, F_\alpha] = \frac{2}{\langle \alpha, \alpha \rangle} \langle \alpha, -\alpha \rangle F_\alpha = -2F_\alpha, \\ [E_\alpha, F_\alpha] &= \frac{2}{\langle \alpha, \alpha \rangle} h_\alpha = H_\alpha. \end{aligned}$$

总结一下就是

$$[H_\alpha, E_\alpha] = 2E_\alpha, \quad [H_\alpha, F_\alpha] = -2F_\alpha, \quad [E_\alpha, F_\alpha] = H_\alpha.$$

这其实就是 $\mathfrak{sl}(2)$ 的对易关系, 所以呢, 这三个基 $E_\alpha, F_\alpha, H_\alpha$ 生成了一个同构于 $\mathfrak{sl}(2)$ 的子代数, 我们记做 $\mathfrak{sl}(2)_\alpha$.

Theorem 64. 如下三个陈述成立:

- (1) 如果 $\alpha \in \Delta$, 那么 $k\alpha \notin \Delta$, 其中 $k \in \mathbb{C}$, 除非 $k = -1$.
- (2) 如果 $\alpha \in \Delta$, 那么 \mathfrak{g}_α 是一维的。
- (3) 对每一个 α , 我们都可以找到 $E_\alpha \in \mathfrak{g}_\alpha, F_\alpha \in \mathfrak{g}_{-\alpha}$ 以及 $H_\alpha \in \mathfrak{h}$ 使得对易关系

$$[H_\alpha, E_\alpha] = 2E_\alpha, \quad [H_\alpha, F_\alpha] = -2F_\alpha, \quad [E_\alpha, F_\alpha] = H_\alpha$$

成立, 且 H_α 是唯一的, 不依赖于 E_α 和 F_α 的选取。

第三点前面部分刚刚已经证明过了, 而我们定义的 H_α 正比于 h_α , 所以他就是唯一的。第一第二点基本都是来自于 $\mathfrak{sl}(2)$ 的同构。我们下面用 H 代替 h 来看一些公式是怎么变化的。首先

$$[H_\beta, a_\alpha] = \frac{2}{\langle \alpha, \alpha \rangle} [h_\beta, a_\alpha] = 2 \frac{\langle \alpha, \beta \rangle}{\langle \alpha, \alpha \rangle} a_\alpha.$$

Proposition 65. 对任意的 $\alpha, \beta \in \Delta$, $2\langle \alpha, \beta \rangle / \langle \alpha, \alpha \rangle$ 是一个整数。

这个是因为 $2\langle \alpha, \beta \rangle / \langle \alpha, \alpha \rangle$ 是 $\text{ad}(H_\beta)$ 的本征值, 而 $\mathfrak{sl}(2)$ 的有限维不可约表示的本征值只能是整数。如果把 $\langle \bullet, \bullet \rangle$ 当成内积, 那么 $\langle \alpha, \beta \rangle / \langle \alpha, \alpha \rangle$ 就是 β 往 α 方向的投影, 可以看到投影只能是整数和半整数。

我们继续做一些计算

$$(H_\alpha, H_\beta)_K = \frac{4\langle \alpha, \beta \rangle}{\langle \alpha, \alpha \rangle \langle \beta, \beta \rangle},$$

特别地,

$$(H_\alpha, H_\alpha)_K = \frac{4}{\langle \alpha, \alpha \rangle},$$

于是

$$2 \frac{\langle \alpha, \beta \rangle}{\langle \alpha, \alpha \rangle} = 2 \frac{4\langle \alpha, \beta \rangle}{\langle \alpha, \alpha \rangle \langle \beta, \beta \rangle} \frac{\langle \beta, \beta \rangle}{4} = 2 \frac{(H_\alpha, H_\beta)_K}{(H_\beta, H_\beta)_K}$$

都是整数。

§7 SU(2) and SO(3)

上面看到了 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ 的 Lie 代数, 或者说 $\mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}} \cong \mathfrak{so}(3)_{\mathbb{C}}$ 的 Lie 代数, 现在我们回到 Lie 群 SU(2) 和 SO(3)。

首先复习一下 SO(3) 的一些更细的结构, SO(3) 是三维旋转群, 不包括反射。

Proposition 66. 绕着固定单位矢量 \mathbf{a} 右手螺旋的逆时针方向旋转 θ 后的 \mathbf{x} 表示为

$$\text{Rot}(\mathbf{a}, \theta)\mathbf{x} = \mathbf{x} + (1 - \cos \theta)\mathbf{a} \times (\mathbf{a} \times \mathbf{x}) + \sin \theta \mathbf{a} \times \mathbf{x}.$$

为了证明他, 首先注意到当 \mathbf{a} 和 \mathbf{x} 垂直的时候显然有

$$\text{Rot}(\mathbf{a}, \theta)\mathbf{x} = \cos \theta \mathbf{x} + \sin \theta \mathbf{a} \times \mathbf{x}.$$

对于一般的 \mathbf{x} , 分解为平行于 \mathbf{a} 和垂直于 \mathbf{a} (设其单位矢量为 \mathbf{b}) 的两个部分 $\mathbf{x} = \mu\mathbf{a} + \nu\mathbf{b}$, 而平行于 \mathbf{a} 的部分在旋转下不变 $\text{Rot}(\mathbf{a}, \theta)\mu\mathbf{a} = \mu\mathbf{a}$ 。由于 $\text{Rot}(\mathbf{a}, \theta)$ 的线性性, 我们有

$$\begin{aligned} \text{Rot}(\mathbf{a}, \theta)\mathbf{x} &= \mu\mathbf{a} + \cos \theta (\nu\mathbf{b}) + \sin \theta \mathbf{a} \times (\nu\mathbf{b}) \\ &= \mathbf{x} \cos \theta + (1 - \cos \theta)\mu\mathbf{a} + \sin \theta \mathbf{a} \times \mathbf{x} \\ &= \mathbf{x} \cos \theta + (1 - \cos \theta)(\mathbf{a} \cdot \mathbf{x})\mathbf{a} + \sin \theta \mathbf{a} \times \mathbf{x}, \end{aligned}$$

但是 $\mathbf{a} \times (\mathbf{a} \times \mathbf{x}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{x})\mathbf{a} - \mathbf{x}$ 。所以得证。

现在对 $\text{Rot}(\mathbf{a}, \theta)$ 中的 θ 求 $\theta = 0$ 处的导数即可得到其 Lie 代数

$$\left. \frac{d}{d\theta} \right|_{\theta=0} \text{Rot}(\mathbf{a}, \theta)\mathbf{x} = \mathbf{a} \times \mathbf{x}$$

选 $\mathbf{a} = \mathbf{e}_i$, 得到 Lie 代数的三个基为

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

§8 Orbital Geometry of the Adjoint Action

上面看过了 Lie 代数的伴随表示, 现在来看看 Lie 群的伴随作用, 其中担任有趣的角色的就是极大交换子群, 类似于 Cartan 子代数是极大交换子代数。

由于我们考虑是紧 Lie 群 G , 那么我们总可以得到他的 Lie 代数 \mathfrak{g} 上伴随作用下不变的内积, 因此我们就可以定义 \mathfrak{g} 上面的一组正交基, 选定正交基之后我们拓展到对应的左不变矢量场

上,我们就得到了一个标架场,也就是确定了 G 上唯一的 Riemann 结构使得那些左不变向量场在每一个点都相互正交。

这样定义的 Riemann 结构,由于标架场是左不变向量场,所以左平移 $(l_a)_*$ 是等距同构,而伴随作用因为我们定义的内积也是等距同构,那么右平移作为左平移和伴随作用的复合,也是等距同构。

伴随作用的轨道确定了 Lie 群的共轭类,而又因为伴随作用是等距同构,这就是说共轭类在几何结构上大致是相同的。这节中重要的定理即明确了这个事实。

Definition 67. 一个紧 Lie 群的环子群是一个紧的连通交换 Lie 子群。一个极大环子群就是说这个环子群不能真包含在其他的环子群里面。

$SO(2)$ 是 $SO(3)$ 的极大环子群, $SO(2) \times SO(2)$ 是 $SO(4)$ 的极大环子群, 环面 $T^n = \{\text{diag}(e^{i\theta_1}, \dots, e^{i\theta_n}) : 0 \leq \theta_i < 2\pi\}$ 是 $U(n)$ 的极大环子群。由于 $SO(2)$ 同构于环 S^1 , 而 T^n 同构于 $S^1 \times \dots \times S^1$, 所以环子群的名字是十分形象的。

Proposition 68. 令 T 是 G 的环子群以及 $F(T, \mathfrak{g})$ 或 $F(T, G)$ 是 T 在 \mathfrak{g} 或者 G 上的伴随作用的不动点集, 那么 T 是极大环子群当且仅当 $\dim F(T, \mathfrak{g}) = \dim T$ 或者 $F(T, G)$ 包含 T 作为其中之一的连通分支。

让 \mathfrak{t} 是 T 的 Lie 代数, 那么每一个 $t \in T$ 都满足 $\text{Ad}_t \mathfrak{t} = \mathfrak{t}$, 这是 Abel 群的自然结果, 所以

$$\mathfrak{t} \subset F(T, \mathfrak{g}).$$

如果 T 不是极大的, 那么存在一个 T_1 使得 $T \subset T_1$, 且他的 Lie 代数满足 $\mathfrak{t}_1 \subset F(T_1, \mathfrak{g})$. 所以

$$\dim T = \dim \mathfrak{t} < \dim \mathfrak{t}_1 \leq \dim F(T, \mathfrak{g}).$$

反过来, 如果 $\dim F(T, \mathfrak{g}) > \dim T$, 那么存在 $X \in F(T, \mathfrak{g}) - \mathfrak{t}$ 使得分布 $\{X, \mathfrak{t}\}$ 是 \mathfrak{g} 的一个 Lie 子代数, 且上面的交换子都为 0. 于是存在一个 Abel 子群 H 其 Lie 代数为 $\{X, \mathfrak{t}\}$, 我们现在考虑 H 的闭包, 他是一个紧集中的闭集, 所以也是紧的 (Hausdorff 性是流形保证的), 所以他是一个真包含 T 的环子群, 这和 T 是极大环子群相悖。

至于剩下的关于 Lie 群的结论, 显然来自于其 Lie 代数和 Lie 群的联系。

下面这个定理就是这节的主要内容。

Theorem 69. Cartan: 令 T 是紧 Lie 群 G 的极大环子群, 那么每个 $g \in G$ 共轭于某个 T 的元素。

因此所有的极大环子群都是相互共轭的。

令 φ 是 Lie 群 G 的伴随表示在 T 上的限制 $\varphi = \text{Ad}|_T$, 且 \mathfrak{t} 是 T 的 Lie 代数。因为 T 是极大环子群, 所以从上一个命题可以推知 $F(T, \mathfrak{g}) = \mathfrak{t}$, 注意到极大环子群是 Abel 群, 所以他的每一个复的不可约有限维表示都是一维的, 则实的不可约有限维表示都是二维的, 因此

$$\varphi = \dim \mathfrak{t} \cdot 1 \oplus \varphi_1 \oplus \cdots \oplus \varphi_l.$$

其中 1 表示为一维平凡表示, φ_i 是一维非平凡不可约表示, 由于 φ_i 都可以表示为一个么正表示, 也即 $e^{i\theta}$, 那么 φ_i 也可以看成一个非平凡的从 T 到 $\text{SO}(2)$ 的群同态, 那么 φ_i 的核是余维度为 1 的闭 Lie 子群, 他们的并 $\cup \ker(\varphi_i)$ 的补集是 T 的一个开子流形, 我们记做 W .

令 $t_0 \in W$, 则每一个 $\varphi_i(t_0)$ 都是一个不平凡的旋转, 因此 $F(\varphi(t_0), \mathfrak{g}) = \mathfrak{t}$, 令 $G_{t_0} = \{g \in G : gt_0g^{-1} = t_0\}$ 是 t_0 的中心化子, 以及 e^{sX} 是 G_{t_0} 的任意的单参子群, 于是

$$e^{sX} = t_0 e^{sX} t_0^{-1} = e^{s\text{Ad}(t_0)X}$$

对任意的 $s \in \mathbb{R}$ 都成立, 于是 $X \in F(\varphi(t_0), \mathfrak{g}) = \mathfrak{t}$. 所以 G_{t_0} 的 Lie 代数就是 \mathfrak{t} , 那么他带单位元的连通分支就是 T , 因此 $\dim G(t_0) = \dim G - \dim G_{t_0} = \dim G - \dim T$, 其中 $G(t_0)$ 是 t_0 的共轭作用的轨道, 或者说是 t_0 的共轭类。我们下面要证明 $G(t_0)$ 是 T 在 t_0 处的正交补。

注意到两个 $t_0, t \in T$ 是可交换的, 因此 $\sigma_t : x \mapsto txt^{-1}$ 和 l_{t_0} 对任意的 $x \in G$ 都是可以交换的。因此 $(l_{t_0})_*$ 是 \mathfrak{g} 和 $T_{t_0}G$ 对于伴随作用等价的映射, 即 $(l_{t_0})_*(\sigma_t)_* = (\sigma_t)_*(l_{t_0})_*$, 这样 $(l_{t_0})_*$ 就类似一个缠结映射。

因为

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{t} \oplus \mathfrak{t}^\perp,$$

所以有

$$\varphi|_{\mathfrak{t}} = \dim \mathfrak{t} \cdot 1, \quad \varphi|_{\mathfrak{t}^\perp} = \varphi_1 \oplus \cdots \oplus \varphi_l.$$

因为 $(l_{t_0})_*\mathfrak{t}$ 就是 T 在 t_0 处的切空间, 为了证明 $G(t_0)$ 在 t_0 处的切空间就是 T 在 t_0 处的切空间的正交补, 我们可以去证明 T 的伴随作用诱导在切空间上的作用不包含任意固定的方向。

Proposition 70. 令 H 是 G 的紧 Lie 子群, 他们的 Lie 代数分别为 \mathfrak{h} 和 \mathfrak{g} , 则 $\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{h}^\perp$ 。那么在 G/H 基点处的切空间 $T_0(G/H)$ 诱导的 H 作用等价于 H 的伴随作用在 \mathfrak{h}^\perp 上的限制。

设 $p(x) = xH \in G/H$ 是正则投影, 那么

$$p \circ \sigma_h(x) = p(hxh^{-1}) = hxh^{-1} \cdot H = hx \cdot H = l_h(x \cdot H) = l_h \circ p(x),$$

对所有 $h \in H$ 都成立。那么

$$p_{*e} : \mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{h}^\perp \rightarrow T_0(G/H)$$

是 \mathfrak{h}^\perp 和 $T_0(G/H)$ (作为 H -线性空间) 间的一个同构映射。

注意到作为群作用的共轭类, 该作用的轨道就是共轭类, 而给定元素的定点子群就是该元素的中心化子。所以 t_0 的轨道就是 G 和 t_0 的中心化子的商群, 即 $G(t_0) = G/G_{t_0}$, 那么我们就得到了 \mathfrak{t}^\perp 和 $T_0(G/G_{t_0})$ 之间的同构, 而这和 $(l_{t_0})_*\mathfrak{t}$ 的正交是显然的。

Theorem 71. G 上的两个有限维表示 ψ_1, ψ_2 是等价的, 当且仅当他们在极大环子群上的限制是等价的。

ψ_1, ψ_2 等价和 $\chi_{\psi_1} = \chi_{\psi_2}$ 是一个意思, 那么因为每一个 $g \in G$ 都共轭于某个 T 的元素, 而共轭对迹没影响, 所以 $\chi_{\psi_1} = \chi_{\psi_2}$ 和 $\chi_{\psi_1}|_T = \chi_{\psi_2}|_T$ 是一个意思, 而 $\chi_{\psi_1}|_T = \chi_{\psi_2}|_T$ 又和 $\psi_1|_T, \psi_2|_T$ 等价是一个意思, 所以 ψ_1, ψ_2 等价和 $\psi_1|_T, \psi_2|_T$ 等价是一个意思。

注意到极大环子群是 Abel 群, 所以他的有限维不可约表示都是一维的, 而紧 Lie 群保证了完全可约性, 那么我们只要确定了这些一维不可约表示, 也就确定了整个 Lie 群上面的表示。

Definition 72. 群 $W(G) = N_G(T)/T$ 被称为 G 的 Weyl 群, 其中 $N_G(T)$ 是 T 的正规化子, 就是说是所有和 T 可交换的元素构成的群。