

ТЕМА 7 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ФУНКЦИИ БЕССЕЛЯ, ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ

7.1. Понятие функции Бесселя

Степенные ряды находят широкое применение при решении дифференциальных уравнений. В качестве примера рассмотрим так называемое уравнение Бесселя, применение которого встречается в различных вопросах физики и техники.

Определение 7.1. Дифференциальное уравнение вида

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - p^2)y = 0, \quad (7.1)$$

p — заданная постоянная, называется уравнением Бесселя.

Данное уравнение удовлетворяет условиям теоремы 7.1, в соответствии с которой его решение будем искать в виде обобщенного степенного ряда.

Теорема 7.1. Пусть в уравнении

$$p_0(x)y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = 0$$

Функции $p_0(x), p_1(x), p_2(x)$ разлагаются в степенные ряды в окрестности точки x_0 , причем точка x_0 является нулем порядка s функции $p_0(x)$, является нулем порядка $s - 1$ функции $p_1(x)$, является нулем порядка $s - 2$ функции $p_2(x)$. Тогда решение дифференциального уравнения существует и представимо в виде обобщенного степенного ряда

$$y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^{k+\rho},$$

где $a_0 \neq 0, \rho \in R$. (7.2)

Уравнение для определения его показателя p имеет вид

$$\rho(\rho - 1) + \rho - p^2 = 0 \text{ или } \rho^2 - p^2 = 0.$$

Последнее уравнение называется определяющим уравнением, и его корни равны $\rho_1 = p, \rho_2 = -p$.

Будем искать решение уравнения в виде

$$y = x^\rho (a_0 + a_1 x^1 + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots).$$

Подставляя в левую часть уравнения Бесселя решение и, приравнявая коэффициенты при различных степенях переменной x нулю, получим систему следующего вида:

$$\begin{cases} [\rho^2 - p^2]a_0 = 0 \\ [(\rho + 1)^2 - p^2]a_1 = 0, \\ [(\rho + 2)^2 - p^2]a_2 + a_0 = 0, \\ [(\rho + 3)^2 - p^2]a_3 + a_1 = 0, \\ \dots \\ [(\rho + n)^2 - p^2]a_n + a_{n-2} = 0. \end{cases}$$

Подставляя $a_0 = 1$ и вычисляя последовательно коэффициенты, приходим к решению ($\rho_1 = p$)

$$y_1 = x^p \left(1 - \frac{x^2}{2(2p+2)} + \frac{x^4}{2 \cdot 4(2p+2)(2p+4)} - \frac{x^6}{2 \cdot 4 \cdot 6(2p+2)(2p+4)(2p+6)} + \dots \right).$$

Решение y_1 удобно представить в виде ряда с учетом того, что коэффициенты с нечетными индексами равны нулю, а с четными индексами можно записать с использованием функции Эйлера:

$$a_{2k} = \frac{(-1)^k a_0}{k! 2^{2k} (1+p)(2+p) \dots (k+p)}.$$

При $a_0 = \frac{1}{2^p p!} = \frac{1}{2^p \Gamma(p+1)}$ имеем

$$a_{2k} = \frac{(-1)^k}{2^{2k+p} \Gamma(k+1) \Gamma(k+p+1)}$$

и, следовательно, решение можно представить в виде

$$y_1 = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\Gamma(k+1) \Gamma(k+p+1)} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+p} = J_p(x). \quad (7.3)$$

Используя второй корень $\rho_2 = -p$, можем построить второе решение уравнения Бесселя. Оно может быть получено из решения y_1 простой заменой p на $-p$, так как уравнение Бесселя содержит только p^2 и не меняет знак при замене p на $-p$:

$$y_2 = x^{-p} \left(1 - \frac{x^2}{2(-2p+2)} + \frac{x^4}{2 \cdot 4(-2p+2)(-2p+4)} - \frac{x^6}{2 \cdot 4 \cdot 6(-2p+2)(-2p+4)(-2p+6)} + \dots \right).$$

Решение y_2 аналогично предыдущему можно записать с использованием функции Эйлера:

$$a_0 = \frac{1}{2^{-p}\Gamma(-p+1)},$$

$$y_2 = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\Gamma(k+1)\Gamma(k-p+1)} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^{2k-p} = J_{-p}(x).$$

(7.4)

Разность корней определяющего уравнения равна $2p$, а следовательно, два решения будут верны, если p не равно целому числу или половине целого нечетного числа. Решение y_1 с точностью до некоторого постоянного множителя дает функцию Бесселя p – порядка, которую обозначают через $J_p(x)$ и называют цилиндрической функцией первого рода. Таким образом, если p не есть целое число или половина целого нечетного числа, то общее решение уравнения Бесселя имеет вид:

$$y = C_1 \cdot J_p(x) + C_2 \cdot J_{-p}(x),$$

где

$$J_p(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\Gamma(k+1)\Gamma(k+p+1)} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+p},$$

$$J_{-p}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\Gamma(k+1)\Gamma(k-p+1)} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^{2k-p}.$$

Степенной ряд, входящий в решение

$$y_1 = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\Gamma(k+1)\Gamma(k+p+1)} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+p} = J_p(x),$$

сходится при любом значении переменной, в чем нетрудно убедиться, применив признак Даламбера.

Определение 7.2. Функции $J_p(x)$ и $J_{-p}(x)$ называются функциями Бесселя первого рода порядка p и $-p$ соответственно или цилиндрическими функциями первого рода.

Если рассмотрим $p = n$ – целое положительное число, то решение y_1 сохранит свою силу, а решение y_2 потеряют силу, так как, начиная с некоторого числа, один из множителей в знаменателе членов разложения будет равен нулю.

При целом $p = n$ имеет место равенство

$$J_{-n}(x) = (-1)^n \cdot J_n(x), \quad (7.5)$$

которое показывает линейную зависимость функций Бесселя.

Докажем равенство (7.5).

Δ Так как гамма-функция $\Gamma(x)$ определена при $x > 0$, то

$$J_{-n}(x) = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! (k-n)!} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^{2k-n}.$$

Положим $k - n = m$. Тогда

$$\begin{aligned} J_{-n}(x) &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+m}}{m! (n+m)!} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+n} = \\ &= (-1)^n \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m! (n+m)!} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+n} = (-1)^n J_n(x). \end{aligned}$$

Итак, при целом n функции $J_{-n}(x), J_n(x)$ не образуют фундаментальную систему решений уравнения Бесселя (7.1). ▲

При целом положительном $p = n$ второе решение уравнения Бесселя, линейно независимое с $J_n(x)$, имеет вид

$$N_n(x) = \lim_{p \rightarrow n} \frac{J_p(x) \cos(\pi p) - J_{-p}(x)}{\sin(\pi p)},$$

где p – нецелое.

(7.6)

Определение 7.3. Функция $N_n(x)$ называется цилиндрической функцией Бесселя второго рода или функцией Неймана.

Таким образом, при целом $p = n$ общее решение уравнения Бесселя имеет вид

$$y(x) = C_1 J_n(x) + C_2 N_n(x).$$

7.2. Функции Бесселя, индекс которых равен целому числу с половиной

Пример 7.1. Рассмотрим случай, когда параметр в уравнении Бесселя (7.1) $p = \frac{1}{2}$. Найдем функцию Бесселя $J_{\frac{1}{2}}(x)$.

Δ Применяя формулу (7.3), получим

$$\begin{aligned} J_{\frac{1}{2}}(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \left(k + \frac{1}{2}\right)!} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^{2k + \frac{1}{2}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\Gamma(k+1) \Gamma\left(k + \frac{1}{2} + 1\right)} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^{2k + \frac{1}{2}} = \\ &= \left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{2}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\Gamma(k+1) \Gamma\left(k + \frac{1}{2} + 1\right)} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^{2k}. \end{aligned}$$

Так как из свойств гамма-функций следует, что

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi},$$

$$\Gamma(k+1) = k \cdot \Gamma(k),$$

то получаем следующие соотношения

$$\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\pi},$$

$$\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\pi},$$

$$\Gamma\left(\frac{7}{2}\right) = \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\pi},$$

...

$$\Gamma\left(\frac{2k+3}{2}\right) = \frac{2k+1}{2} \cdot \dots \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\pi} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2k+1)}{2^{k+1}} \cdot \sqrt{\pi}.$$

Учитывая, что для натуральных k справедливо соотношение $\Gamma(k+1) = k!$, после некоторых преобразований получим следующее

$$\begin{aligned}
J_{\frac{1}{2}}(x) &= \left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{2}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot 2^{k+1}}{k! \cdot \sqrt{\pi} \cdot 1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2k+1)} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^{2k} = \\
&= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{2}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot 2^k}{k! \cdot 1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2k+1)} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^{2k} = \\
&= \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \cdot 1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2k+1) \cdot 2^k} \cdot x^{2k+1} = \\
&= \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} \cdot x^{2k+1}.
\end{aligned}$$

Правая часть последнего соотношения представляет собой разложение известной нам тригонометрической функции $\sin(x)$. Таким образом мы показали справедливость равенства

$$J_{\frac{1}{2}}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cdot \sin(x).$$

▲

(7.6)

Пример 7.2. Рассмотрим случай, когда параметр в уравнении Бесселя (7.1)

$p = -\frac{1}{2}$. Найдем функцию Бесселя $J_{-\frac{1}{2}}(x)$.

Δ Применяя формулу (7.4), имеем

$$\begin{aligned}
J_{-\frac{1}{2}}(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \left(k - \frac{1}{2}\right)!} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^{2k - \frac{1}{2}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\Gamma(k+1) \Gamma\left(k - \frac{1}{2} + 1\right)} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^{2k - \frac{1}{2}} = \\
&= \left(\frac{x}{2}\right)^{-\frac{1}{2}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\Gamma(k+1) \Gamma\left(k - \frac{1}{2} + 1\right)} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^{2k}.
\end{aligned}$$

Принимая во внимание, что

$$\Gamma\left(k - \frac{1}{2} + 1\right) = \Gamma\left(\frac{2k+1}{2}\right) = \frac{2k-1}{2} \cdot \dots \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\pi} = \sqrt{\pi} \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2k-1)}{2^k},$$

получим

$$\begin{aligned}
J_{-\frac{1}{2}}(x) &= \left(\frac{x}{2}\right)^{-\frac{1}{2}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot 2^k}{k! \cdot \sqrt{\pi} \cdot 1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2k-1)} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^{2k} = \\
&= \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \cdot 2^k \cdot 1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2k-1)} \cdot x^{2k} = \\
&= \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} \cdot x^{2k} = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos(x).
\end{aligned}$$

Таким образом мы показали, что функция Бесселя $J_{-\frac{1}{2}}(x)$ выражается через тригонометрическую функцию $\cos(x)$ и справедливо равенство

$$J_{-\frac{1}{2}}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cdot \cos(x).$$

▲

(7.7)

Получим некоторые рекуррентные соотношения для функций Бесселя, которые связывают функции Бесселя первого рода различных порядков.

Свойство 7.1. Справедливо равенство

$$\frac{d}{dx}(x^p \cdot J_p(x)) = x^p \cdot J_{p-1}(x)$$

(7.8)

△ Найдем производную по переменной x от произведения $x^p \cdot J_p(x)$

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}(x^p \cdot J_p(x)) &= \frac{d}{dx} \left(x^p \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k+p+1)} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+p} \right) = \\
&= \frac{d}{dx} \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot x^{2k+2p}}{k! \Gamma(k+p+1) \cdot 2^{2k+p}} \right) = \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot (2k+2p) x^{2k+2p-1}}{k! \Gamma(k+p+1) \cdot 2^{2k+p}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot (2k+2p) x^{2k+2p-1}}{k! (k+p) \Gamma(k+p) \cdot 2^{2k+p}} = \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot 2 \cdot x^{2k+2p-1}}{k! \Gamma(k+p) \cdot 2^{2k+p}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot x^{2k+2p-1}}{k! \Gamma(p-1+k+1) \cdot 2^{2k+p-1}} =
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot x^p \cdot x^{2k+p-1}}{k! \Gamma(p-1+k+1) \cdot 2^{2k+p-1}} = x^p \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot x^{2k+p-1}}{k! \Gamma(p-1+k+1) \cdot 2^{2k+p-1}} = \\
&= x^p \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(p-1+k+1)} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+p-1} = x^p \cdot J_{p-1}(x),
\end{aligned}$$

Таким образом, доказана формула (7.8)

$$\frac{d}{dx} (x^p \cdot J_p(x)) = x^p \cdot J_{p-1}(x).$$

▲

Свойство 7.2. Справедливо равенство

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{J_p(x)}{x^p} \right) = -\frac{1}{x^p} \cdot J_{p+1}(x) \quad (7.9)$$

△ Найдем производную по переменной x от частного $\frac{J_p(x)}{x^p}$

$$\begin{aligned}
&\frac{d}{dx} \left(\frac{J_p(x)}{x^p} \right) = \frac{d}{dx} \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k+p+1) x^p} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+p} \right) = \\
&= \frac{d}{dx} \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot x^{2k}}{k! \Gamma(k+p+1) \cdot 2^{2k+p}} \right) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot (2k) x^{2k-1}}{k! \Gamma(k+p+1) \cdot 2^{2k+p}} = \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot (2k+2p) x^{2k+2p-1}}{k! \Gamma(k+p+1) \cdot 2^{2k+p}} = \left\{ \begin{array}{l} \text{суммирование начнем с } k=1, \\ \text{так как при } k=0 \text{ первый член} \\ \text{суммы равен нулю} \end{array} \right\} \\
&= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot 2x^{2k-1}}{(k-1)! \Gamma(k+p+1) \cdot 2^{2k+p}} = \left\{ \begin{array}{l} \text{ПОЛОЖИМ} \\ k=m+1 \\ m=k-1 \end{array} \right\} \\
&= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m \cdot 2 \cdot x^{2m+1}}{m! \Gamma(p+m+2) \cdot 2^{2m+p+2}} = \left\{ \begin{array}{l} \text{умножим и разделим} \\ \text{на } x^p \end{array} \right\} \\
&= - \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{x^p} \cdot \frac{(-1)^m \cdot x^{2m+1+p}}{m! \Gamma((p+1)+m+1) \cdot 2^{2m+p+1}} = -\frac{1}{x^p} \cdot J_{p+1}(x).
\end{aligned}$$

Таким образом, доказана формула (7.8)

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{J_p(x)}{x^p} \right) = -\frac{1}{x^p} \cdot J_{p+1}(x)$$

▲

Свойство 7.3. Справедливо равенство

$$J_p(x) = \frac{x}{2p} \cdot (J_{p-1}(x) + J_{p+1}(x)) \quad (7.10)$$

Δ Распишем производные в левых частях доказанных равенств (7.9) и (7.10), получим систему равенств

$$\begin{cases} \frac{d}{dx} (x^p \cdot J_p(x)) = x^p \cdot J_{p-1}(x), \\ \frac{d}{dx} \left(\frac{J_p(x)}{x^p} \right) = -\frac{1}{x^p} \cdot J_{p+1}(x); \end{cases}$$

$$\begin{cases} p \cdot x^{p-1} \cdot J_p(x) + x^p \cdot J'_p(x) = x^p \cdot J_{p-1}(x), \\ -p \cdot x^{-p-1} \cdot J_p(x) + x^{-p} \cdot J'_p(x) = -\frac{1}{x^p} \cdot J_{p+1}(x). \end{cases}$$

Выразим из последней системы $J'_p(x)$ и приравняем полученные выражения

$$\begin{cases} J'_p(x) = J_{p-1}(x) - \frac{p}{x} \cdot J_p(x), \\ J'_p(x) = -J_{p+1}(x) + \frac{p}{x} \cdot J_p(x). \end{cases}$$

Данная система дает соотношение (7.10), которое представляет собой рекуррентное равенство, связывающее функции Бесселя первого рода различных порядков, а именно:

$$J_p(x) = \frac{x}{2p} \cdot (J_{p-1}(x) + J_{p+1}(x)). \blacktriangle$$

Заметим, что, используя рекуррентную формулу (7.10) и положив в ней $p = \frac{1}{2}$, можно получить выражения функций Бесселя $J_{\frac{3}{2}}(x), J_{\frac{5}{2}}(x), J_{\frac{7}{2}}(x), \dots$

Отметим также, что функции Бесселя с полуцелым индексом $J_{\frac{1}{2}+n}(x)$ всегда выражаются через элементарные функции.