

401: Elektronische Übergänge in Atomen

Leonie Dessau & Lena Beckmann

15.12.2025

1 Einleitung

1.1 Versuchsziel

Eine fundamentale Erkenntnis der modernen Physik ist die Quantisierung der möglichen Energieniveaus von Atomen und ihren Kernen und Hüllenelektronen [2, S. 112]. Mit dem *Franck-Hertz*-Versuch wird die Energiequantisierung von Atomenergiezuständen bei Quecksilber-Atomen nachgewiesen. Außerdem wird anhand der Beobachtung der Energieaufspaltung durch den normalen Zeeman-Effekts für die rote Cadmium (Cd)-Spektrallinie mit Wellenlänge $\lambda_0 = 643,847 \text{ nm}$ [4] bei einem externen, homogenen Magnetfeld der Wert des Bohr'schen Magnetons μ_B abhängig von der Magnetfeldstärke bestimmt [5, S. 3].

1.1.1 Franck-Hertz-Versuch

Der experimentelle Nachweis der diskreten Energieniveaus von Atomen wurde 1911-1914 von FRANCK und HERTZ mit dem *Franck-Hertz-Versuch* erbracht. Hierbei werden Elektronen durch eine angelegte Spannung beschleunigt und durchlaufen dann eine Röhre, welche mit einem Gas unter niedrigem Druck – in der durchgeführten Variante wird hierfür Quecksilber (Hg) genutzt – gefüllt ist, von einer Kathode zu einer Anode. Erreichen die Elektronen die andere Seite der Röhre, werden sie als Anodenstrom gemessen. Auf dem Weg stoßen die Elektronen solange nur inelastisch mit Quecksilberatomen bis ihre durch die Beschleunigungsspannung erreichte Energie der Anregungsenergie zwischen dem nächsthöheren Hg-Energiezustand entspricht. Diese Energie ist charakteristisch für das verwendete Gas, den Ausgangszustand der Gasatome sowie den angeregten Übergang, d.h. auch den finalen Atomzustand. Es ist zudem noch ein Gegenfeld angelegt, sodass sehr langsame Elektronen, die nach einem Stoß fast keine kinetische Energie mehr besitzen, nicht die Anode erreichen können. Wenn die Elektronen gerade genug Energie besitzen um ein Atom in den höheren Zustand anzuregen, haben sie danach nicht mehr genug kinetische Energie um trotz dem Gegenfeld die Anode zu erreichen

und der gemessene Strom sinkt für diese Beschleunigungsspannung (d.h. für diese kinetische Energie der Elektronen) stark ab. Es zeigt sich im Anodenstrom also ein Resonanzmuster für die Anregungsenergie der Gasatome (für den Hüllenelektronen-Übergang, dessen Energiedifferenz mit den genutzten angelegten Spannungen). Ist die Elektronenenergie geringer als die Anregungsenergie, können keine elastischen Stöße stattfinden und der Anodenstrom zeigt keinen Abfall. Wird durch die Beschleunigungsspannung ein Vielfaches der Anregungsenergie erreicht, können die Elektronen auf dem Weg zur Anode zweimal mit Gasatomen elastisch stoßen, sodass auch bei Vielfachen der Anregungsenergie in der Spannung ein Resonanzabfall im Anodenstrom auftritt. [3, S. 687–688]. Im Experiment wird mithilfe einer Frank-Hertz-Röhre (Aufbau siehe Abbildung [\[Aufbauskizze ref\]](#) und Abschnitt [\[Ref zu Durchführung Franck-Hertz\]](#)) über die Messung der Anodenstromgröße I_A (bzw. der bei Messung über einen Ohmschen Widerstand R direkt dazu proportionalen Spannung $U_I = I_A \cdot R$) in Abhängigkeit von der angelegten Beschleunigungsspannung U_B die Anregungsenergie der Hg-Atome, d.h. die Energiedifferenz zwischen zwei Hg-Atomenergiezuständen ΔE bestimmt.

1.1.2 Normaler Zeeman-Effekt

Die Quantisierung der Atomzustände werden durch Quantenzahlen beschrieben. Die wichtigsten Quantenzahlen eines Teilchens sind hierbei n als Hauptquantenzahl, l als Drehimpulsquantenzahl und s als Eigendrehimpuls- bzw. Spinquantenzahl. Die beiden Drehimpulse wirken gemeinsam als die Gesamtdrehimpulsquantenzahl j (mit $j = l + s$ als Drehimpulsalgebra-Kopplung, also theoretisch mögliche Werte für j bei gegebenen l und s : $|l - s| \leq j \leq l + s$). Außerdem hat jede Drehimpulsquantenzahl noch eine assoziierte Magnetquantenzahl m_l (bzw. m_s, m_j), für die gilt: $m_l \in \{-l, -l + 1, \dots, l - 1, l\}$ (analog für m_s und m_j). Die genannten Drehimpulse sind vektoriell zu betrachten, es gibt jeweils eine

x, y und z -Komponente. Die Energiespektren der Zustände eines Ein- oder (aufgrund der Mehrzahl der Elektronen komplizierter zu berechnen aber insgesamt über Gesamt-Varianten der genannten Quantenzahlen (als große L, S, J bezeichnet) beschreibbaren) Mehrelektronenatoms können über systematische Termschemata dargestellt werden [5, S. 1]. Unterscheiden sich die Quantenzahlen zweier Zustände eines Hüllenelektrons, unterscheiden sich auch die Energien und die resultierende Gesamtwellenfunktionen des Elektrons [3, S. 729–732]. Allerdings sind die Energiezustände eines Elektronenzustands mit $|n, l, s, j\rangle$ $2j + 1$ -fach entartet, da $j_z = \{-j, \dots, j\}$ annehmen kann. Erst bei Anlegen eines externen Magnetfelds B , welches an das mit dem Gesamtdrehimpuls verbundene magnetische Moment $\vec{m} = \frac{\mu_B}{\hbar} \vec{J}$ mit dem Bohr'schen Magneton $\mu_B = -\frac{\hbar e}{2m_e}$ (e : Elementarladung, m_e : Elektronenmasse) koppelt, erhält das Elektron den zusätzlichen Energiebeitrag zu seiner bisherigen Energie $E_B = -\mu_B B$ (mit B der Magnetfeldstärke in z -Richtung), da so mit $j_z = m_j \cdot \hbar$ der Wert der magnetischen Quantenzahl $m_j = \{-j, \dots, j\}$ die Energie des Zustands direkt beeinflusst. Die Entartung der Energien wird so aufgehoben und es spalten sich alle Energieteile auf in $2j + 1$ Linien mit dem Abstand

$$E = g_J \mu_B \Delta m_J B \quad (1.1)$$

Dieser Effekt wird Zeeman-Effekt genannt [1]. Hier ist g_J der Landé-Faktor, dessen Wert vom spezifischen betrachteten Atomzustand abhängt. Im Versuch wird das Emissionslinienspektrum von einer Cadmium-Gasentladungslampe in einem annähernd homogenen Magnetfeld $\vec{B} = B \vec{e}_z$ betrachtet. Durch die Nutzung eines Wellenlängenfilters wird nur die rote Cd-Linie ($\lambda_0 = 643,847$ nm) betrachtet. Diese Linie entspricht dem Cd-Übergang $^1D_2 \rightarrow ^1P_1$, wobei ein Valenzelektron der fünften Schale den Energieübergang $J = 2, S = 0 \rightarrow J = 1, S = 0$ durchführt. Es handelt sich hier um einen Übergang mit jeweils $S = 0$, der Gesamtdrehimpuls J ergibt sich also nur aus dem Wert von L . Es ergibt sich der Fall des normalen Zeeman-Effekt, im Fall von $S \neq 0$ würde man eine kompliziertere Aufspaltung (anormaler Zeeman-Effekt) sehen, die hier nicht zutrifft und daher nicht weiter erläutert wird. Als Landé-Faktor gilt hier $g_J = 1$ und kann im Folgenden aus der Energieformel weggelassen werden. Der

Übergang der roten Cd-Linie ist ein elektronischer Übergang mit $\Delta L = \pm 1$, wo zusätzlich die Auswahlregel

$$\Delta m_J = \Delta m_L = \{\pm 1, 0\} \quad (1.2)$$

für die quantenmechanisch möglichen Übergänge gilt. Die beiden J -Niveaus sind jeweils $2J + 1$ -fach entartet bzw. aufgespalten, wenn ein externes Magnetfeld angelegt wird. Für die erlaubten Übergangsenergien ergibt sich im Fall des angelegten Magnetfelds ein Triplet aus Spektrallinien mit den Wellenlängen $\lambda = h\nu = \pm \frac{hc}{E}$ [1]. Das Termschema der Übergänge ist in Abbildung 1.1 dargestellt. Die drei resultierenden Wellenlängen werden wie im Termschema dargestellt als $\sigma_{\pm}$ für $\Delta m_J = \pm 1$ und π für $\Delta m_J = 0$ bezeichnet. Der Abstand der Spektrallinien zueinander beträgt symmetrisch jeweils:

$$\Delta E = \mu_B B \quad (1.3)$$




Abbildung 1.1: Termschema des betrachteten $\lambda_0 = 643,847$ nm-Übergangs ($^1D_2 \rightarrow ^1P_1$) von Cadmium mit eingezeichneten über die Auswahlregeln erlaubte elektronische Dipolübergänge sowie beobachtete $\sigma_{\pm}$ und π Spektrallinienaufspaltung. Abbildung entnommen aus [1]

[hier noch was zu Polarisation?]

2 Energieaufspaltung durch den Zeeman-Effekt an Cd

2.1 Theoretische Überlegungen

Im Versuch wird mithilfe eines Fabry-Perot-Etalons als präziser Spektralapparat die Wellenlinienaufspaltung (und damit die Energieaufspaltung) der Cd-Linie mit der unverschobenen Wellenlänge $\lambda_0 = 643,847 \text{ nm}$ gemessen. Ein Fabry-Perot-Etalon besteht aus zwei planparallelen, ebenen Spiegeln (Reflexionsgrad $R < 1$), in dem einfallendes Licht mehrfach reflektiert wird, wobei bei jeder Reflexion ein Teil transmittiert wird. Die Teilstrahlen haben daher verschiedene Gangunterschiede und interferieren hinter dem Etalon miteinander. Der Strahlengang im Etalon ist in Abbildung 2.1 dargestellt. Es ergibt sich ein Interfe-




Abbildung 2.1: Strahlengang in einem Fabry-Perot-Etalon. Abbildung entnommen aus [5, S. 12]

ferenzmuster aus Ringen (aufgrund der ausgedehnten Lichtquelle der Cd-Lampe), welches durch eine Sammellinse auf eine CCD-Kamera fokussiert wird. Die Interferenzbedingung des Etalons für Transmissionsmaxima ergibt sich geometrisch und aus dem Brechungsgesetz von SNELLIUS mit der Wellenlänge einer Spektrallinie λ , Brechungsindex des Etalon-Materials n , dem Beugungswinkel bzw. Austrittswinkel der Teilstrahlen aus dem Etalon α für die Maximumsordnung m und der

Etalondicke d als [1]:

$$m\lambda = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2(\alpha)} \quad (2.1)$$

[Rest theorie]

2.2 Versuchsaufbau

Der Versuchsaufbau besteht aus einer Cd-Lampe, die zwischen zwei drehbaren Polschuhen mit jeweils einem kleinen Loch in der Mitte, die im Bereich zwischen ihnen ein annähernd homogenes Magnetfeld der Stärke B liefern, aufgehängt wird, einer Kondensorlinse, die das dahinter platzierte Fabry-Perot-Etalon ($R = 0,85, n = 1,457$) mit parallelem Licht ausleuchtet, sowie hinter dem Etalon eine Sammellinse mit $f = 150 \text{ mm}$, einen Interferenzfilter der Mittelwellenlänge $\lambda_{\text{Filter}} = (643,8 \pm 2,0) \text{ nm}$ (um nur die rote, unverschobene Cd-Linie sowie die nur geringfügig verschobenen $\sigma_{\pm}$ -Komponenten des Übergangs-Tripletts aus dem aus vielen Spektrallinien bestehenden Licht der Lampe zu selektieren) sowie an letzter Stelle ein Okular mit Strichskala oder alternativ an der gleichen Stelle eine CCD-Kamera zur Beobachtung des Interferenzmusters. Der Aufbau ist in Abbildung 2.2 dargestellt. Die Polschuhe sind mit einem Netzgerät verbunden, über welches der Strom und dadurch auch die Magnetfeldstärke variiert werden kann. Zwischen Netzgerät und Polschuhen ist noch ein Arduino Microcontroller mit eingebautem Analog-zu-Digital-Konvertierer eingebaut, welcher dem Aufnahmeprogramm *Zeeman-Effekt* die Werte des Stroms und auch des Magnetfelds liefert. Die Kamera ist auch mit diesem verbunden, sodass für einen gegebenen Wert des Stroms und damit des Magnetfelds die Intensität des auf den CCD-Chip fallenden Lichts für jeden den Kamerapixel aufgenommen wird.

2.2.1 Justage mit dem Okular

[description Justage, aus Anleitung. we totally did this]




Abbildung 2.2: Versuchsaufbau für die Messung der Zeeman-Energieaufspaltung. In der Skizze stehen die Polschuhe in der Konfiguration für Beobachtung transversal zum Magnetfeld. Abbildung entnommen aus [1].

2.3 Kalibrationsmessungen

Es ist sinnvoll, für den verwendeten Versuchsaufbau die Form und Stromabhängigkeit des Magnetfelds zu untersuchen. Der Aufbau der Polschuhe sollte theoretisch im Bereich zwischen ihnen ein homogenes Magnetfeld erzeugen, wie es für die theoretische Behandlung der Zeeman-Aufspaltung des beobachteten Cd-Energieübergangs benötigt wird [citation für homogen]. Dies kann mithilfe einer Messung der Magnetfeldstärke (bei festem Strom) abhängig vom Ort im Bereich zwischen den Polschuhen überprüft werden. Weiter weisen Ferromagnete wie die Polschuhe eine Hysterese auf, das Magnetfeld variiert also nicht linear mit dem angelegten Strom sondern muss als ein funktionaler Zusammenhang als Kalibrationskurve für alle weiteren Messungen bestimmt werden [citation Hysterese].

2.3.1 Ortskalibration des Magnetfelds mit Hallsonde

Es wurde eine Hallsonde bei fester Stromstärke (eingestellt als $I = (5,47 \pm 0,01)$ A) zwischen den Polschuhen platziert (an den Ort, wo sich sonst die Cd-Lampe befindet). Eine Hallsonde liefert eine Spannung proportional zum auf sie wirkenden Magnetfeld, wodurch durch die Messung der Hallspannung einer bekannten Sonde die Magnetfeldstärke bestimmt werden kann. Ihre Position wurde in kleinen Schritten um den Ort der maximalen Magnetfeldstärke variiert und mithilfe der Funktion *Magnetfeldkalibrierung* der Aufnahme-Software jeweils die Magnetfeldstärke aufgenommen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3.3 aufgeführt

und in Abbildung 2.3 als Auftragung der Magnetfeldstärke gegen den Ort (Positionsangaben abgelesen als Position auf der optischen Bank, auf welcher die Versuchskomponenten fixiert wurden [5, S. 6] dargestellt.




Abbildung 2.3: Messung der Ortsabhängigkeit des Magnetfelds bei $I = (5,47 \pm 0,01)$ A und variabler Position der Hallsonde. Die Unsicherheit der Position wurde aufgrund der verwendeten Skala der optischen Bank als $\Delta x = 0,5$ mm abgeschätzt, die Stromunsicherheit aus der Einstellungsauigkeit des Netzgeräts.

2.3.2 Kalibrationskurve in transversaler Konfiguration

Um aus den am Netzgerät eingestellten Werten des Stroms trotz der Hysterese der Polschuhe die Stärke des Magnetfelds berechnen zu können, wird eine Kalibrationsmessung durchgeführt. Dazu wird mithilfe der Software-Funktionalität *Magnetfeldkalibrierung* für variablen Strom mit der Hallsonde die Magnetfeldstärke an der späteren Position der Cd-Lampe aufgenommen.

3 Anhang

3.1 Franck-Hertz-Versuch

Messung	T / °C	U_G/V	$U_{B, \max}/V$
0	165.0	2.0	35.5
1	165.0	2.0	35.5
2	165.0	2.5	35.5
3	165.0	2.5	35.5
4	165.0	3.0	35.5
5	165.0	3.0	35.5
6	165.0	3.3	35.5
7	165.0	3.3	35.5
8	165.0	3.5	35.5
9	165.0	3.5	35.5
10	163.0	2.0	35.0
11	167.0	2.5	35.5
12	167.0	2.5	35.5
13	167.0	2.5	35.5
14	170.0	2.5	35.5
15	170.0	2.5	35.5
16	175.0	2.5	35.5
17	175.0	2.5	35.5
18	177.0	2.5	35.5
19	177.0	2.5	35.5
20	180.0	2.5	35.5
21	180.0	2.5	35.5
22	180.0	2.5	35.5
23	180.0	2.5	35.5

Tabelle 3.1: Parameter der Messungen beim Franck-Hertz Versuch

Messung	Maximum	μ / V	A / V	σ/V
0	0	$7,07 \pm 0,56$	$0,049 \pm 0,044$	$0,53 \pm 0,56$
0	1	$11,497 \pm 0,080$	$0,430 \pm 0,036$	$0,838 \pm 0,080$
0	2	$16,185 \pm 0,028$	$1,228 \pm 0,035$	$0,860 \pm 0,028$
0	3	$21,007 \pm 0,014$	$2,474 \pm 0,034$	$0,902 \pm 0,014$
0	4	$25,9086 \pm 0,0088$	$4,176 \pm 0,034$	$0,9564 \pm 0,0089$
0	5	$30,8709 \pm 0,0064$	$6,358 \pm 0,033$	$1,0148 \pm 0,0068$
0	6	$36,27 \pm 0,14$	$10,01 \pm 0,57$	$1,317 \pm 0,057$
1	0	$7,07 \pm 0,61$	$0,057 \pm 0,053$	$-0,57 \pm 0,61$
1	1	$11,505 \pm 0,094$	$0,448 \pm 0,043$	$0,833 \pm 0,093$
1	2	$16,175 \pm 0,033$	$1,271 \pm 0,043$	$0,859 \pm 0,034$
1	3	$20,989 \pm 0,017$	$2,572 \pm 0,043$	$0,893 \pm 0,017$

1	4	$25,909 \pm 0,010$	$4,304 \pm 0,040$	$0,962 \pm 0,011$
1	5	$30,8870 \pm 0,0077$	$6,602 \pm 0,040$	$1,0164 \pm 0,0082$
1	6	$36,48 \pm 0,21$	$11,4 \pm 1,1$	$1,391 \pm 0,081$
2	0	$11,66 \pm 0,12$	$0,147 \pm 0,026$	$-0,58 \pm 0,12$
2	1	$16,295 \pm 0,023$	$0,827 \pm 0,023$	$0,732 \pm 0,024$
2	2	$21,109 \pm 0,012$	$1,710 \pm 0,022$	$0,791 \pm 0,012$
2	3	$26,0156 \pm 0,0072$	$2,906 \pm 0,021$	$0,8494 \pm 0,0073$
2	4	$30,9895 \pm 0,0051$	$4,415 \pm 0,021$	$0,9227 \pm 0,0053$
2	5	$36,73 \pm 0,23$	$8,8 \pm 1,1$	$1,295 \pm 0,074$
3	0	$11,589 \pm 0,067$	$0,291 \pm 0,023$	$0,711 \pm 0,065$
3	1	$16,296 \pm 0,022$	$0,880 \pm 0,022$	$0,758 \pm 0,023$
3	2	$21,112 \pm 0,011$	$1,815 \pm 0,022$	$0,802 \pm 0,011$
3	3	$26,0252 \pm 0,0069$	$3,054 \pm 0,021$	$0,8634 \pm 0,0069$
3	4	$31,0020 \pm 0,0049$	$4,660 \pm 0,021$	$0,9253 \pm 0,0051$
3	5	$37,18 \pm 0,33$	$12,1 \pm 2,3$	$1,428 \pm 0,095$
4	0	$11,625 \pm 0,074$	$0,200 \pm 0,023$	$-0,571 \pm 0,075$
4	1	$16,378 \pm 0,025$	$0,645 \pm 0,020$	$0,675 \pm 0,025$
4	2	$21,236 \pm 0,012$	$1,358 \pm 0,020$	$0,730 \pm 0,012$
4	3	$26,1905 \pm 0,0077$	$2,289 \pm 0,019$	$0,8003 \pm 0,0077$
4	4	$31,2025 \pm 0,0053$	$3,489 \pm 0,018$	$0,8713 \pm 0,0056$
4	5	$37,86 \pm 0,86$	17 ± 12	$1,39 \pm 0,20$
5	0	$11,644 \pm 0,079$	$0,186 \pm 0,021$	$-0,585 \pm 0,078$
5	1	$16,394 \pm 0,024$	$0,626 \pm 0,020$	$0,655 \pm 0,025$
5	2	$21,241 \pm 0,013$	$1,292 \pm 0,019$	$0,724 \pm 0,013$
5	3	$26,1693 \pm 0,0077$	$2,190 \pm 0,019$	$0,7914 \pm 0,0077$
5	4	$31,1671 \pm 0,0054$	$3,335 \pm 0,018$	$0,8711 \pm 0,0056$
5	5	$37,23 \pm 0,56$	$9,8 \pm 4,1$	$1,26 \pm 0,15$
6	0	$11,69 \pm 0,12$	$0,123 \pm 0,026$	$-0,47 \pm 0,12$
6	1	$16,449 \pm 0,035$	$0,468 \pm 0,023$	$-0,608 \pm 0,035$
6	2	$21,311 \pm 0,017$	$1,004 \pm 0,022$	$0,684 \pm 0,017$
6	3	$26,253 \pm 0,011$	$1,717 \pm 0,021$	$0,747 \pm 0,011$
6	4	$31,2583 \pm 0,0074$	$2,637 \pm 0,020$	$0,8392 \pm 0,0076$
6	5	$40,9 \pm 5,9$	$(0,3 \pm 1,5) \cdot 10^3$	$1,81 \pm 0,88$
7	0	11,685 031 440 993 075	0,115 909 109 379 542 96	0,453 215 319 414 922 77
7	1	16,456 129 544 848 505	0,487 343 802 540 999 4	-0,600 101 581 637 258 1
7	2	21,325 700 963 028 97	1,032 977 769 534 522	0,677 727 907 688 283 5
7	3	26,263 344 118 897 233	1,765 989 201 399 765 1	0,756 430 276 526 231 8
7	4	31,281 634 980 468 937	2,702 747 492 207 673 7	0,837 578 660 100 697 7
7	5	51,388 794 009 526 11	$1,054 359 211 232 041 5 \cdot 10^7$	2,905 565 703 202 884 5
8	0	$11,69 \pm 0,15$	$0,090 \pm 0,030$	$0,40 \pm 0,16$
8	1	$16,487 \pm 0,044$	$0,376 \pm 0,024$	$-0,568 \pm 0,043$
8	2	$21,348 \pm 0,021$	$0,823 \pm 0,023$	$-0,647 \pm 0,021$
8	3	$26,299 \pm 0,013$	$1,409 \pm 0,022$	$0,731 \pm 0,013$
8	4	$31,3220 \pm 0,0091$	$2,167 \pm 0,020$	$0,8250 \pm 0,0090$
8	5	$36,7 \pm 1,1$	$5,2 \pm 6,2$	$0,92 \pm 0,29$
9	0	11,728 424 495 778 334	0,084 214 309 691 336 57	0,413 074 111 731 918 5
9	1	16,476 043 473 073 215	0,372 296 044 407 215 75	-0,559 359 986 826 272 5
9	2	21,353 438 659 967 67	0,809 190 821 340 161	-0,646 916 069 082 228 4
9	3	26,298 536 605 822 036	1,400 360 269 234 874 7	0,720 333 759 027 040 6
9	4	31,336 141 314 434 8	2,138 774 805 548 47	0,817 860 305 547 241 4
9	5	51,657 501 899 722 26	$1,492 448 669 727 740 4 \cdot 10^8$	2,702 140 436 046 265 3

10	0	$11,504 \pm 0,090$	$0,419 \pm 0,039$	$0,833 \pm 0,090$
10	1	$16,177 \pm 0,031$	$1,231 \pm 0,039$	$0,856 \pm 0,031$
10	2	$20,996 \pm 0,016$	$2,469 \pm 0,038$	$0,895 \pm 0,016$
10	3	$25,9058 \pm 0,0098$	$4,151 \pm 0,036$	$0,9627 \pm 0,0098$
10	4	$30,8787 \pm 0,0072$	$6,407 \pm 0,036$	$1,0113 \pm 0,0079$
10	5	$35,83 \pm 0,29$	$7,6 \pm 1,1$	$1,18 \pm 0,11$
11	0	$11,963 \pm 0,095$	$0,283 \pm 0,030$	$0,751 \pm 0,093$
11	1	$16,619 \pm 0,031$	$0,877 \pm 0,029$	$0,816 \pm 0,032$
11	2	$21,408 \pm 0,015$	$1,864 \pm 0,029$	$0,844 \pm 0,015$
11	3	$26,2570 \pm 0,0097$	$3,038 \pm 0,028$	$0,9109 \pm 0,0097$
11	4	$31,1939 \pm 0,0070$	$4,632 \pm 0,028$	$0,9638 \pm 0,0075$
11	5	$36,62 \pm 0,35$	$7,2 \pm 1,4$	$1,28 \pm 0,12$
12	0	$7,71 \pm 0,40$	$0,056 \pm 0,051$	$-0,39 \pm 0,40$
12	1	$11,992 \pm 0,093$	$0,343 \pm 0,035$	$0,774 \pm 0,092$
12	2	$16,654 \pm 0,033$	$1,005 \pm 0,034$	$0,854 \pm 0,033$
12	3	$21,460 \pm 0,016$	$2,148 \pm 0,033$	$0,875 \pm 0,016$
12	4	$26,310 \pm 0,010$	$3,446 \pm 0,032$	$0,929 \pm 0,010$
12	5	$31,2861 \pm 0,0074$	$5,267 \pm 0,032$	$0,9938 \pm 0,0080$
12	6	$36,35 \pm 0,29$	$6,7 \pm 1,0$	$1,18 \pm 0,11$
13	0	$12,00 \pm 0,10$	$0,345 \pm 0,039$	$0,76 \pm 0,10$
13	1	$16,661 \pm 0,035$	$1,038 \pm 0,038$	$0,823 \pm 0,035$
13	2	$21,546 \pm 0,017$	$2,173 \pm 0,036$	$0,905 \pm 0,017$
13	3	$26,533 \pm 0,010$	$3,875 \pm 0,035$	$0,985 \pm 0,010$
13	4	$31,4237 \pm 0,0073$	$5,729 \pm 0,035$	$1,0057 \pm 0,0079$
13	5	$35,82 \pm 0,16$	$5,10 \pm 0,39$	$0,940 \pm 0,072$
14	0	$11,639 \pm 0,067$	$0,241 \pm 0,021$	$0,674 \pm 0,069$
14	1	$16,323 \pm 0,023$	$0,745 \pm 0,020$	$0,757 \pm 0,023$
14	2	$21,133 \pm 0,012$	$1,523 \pm 0,019$	$0,800 \pm 0,012$
14	3	$26,0206 \pm 0,0072$	$2,554 \pm 0,019$	$0,8501 \pm 0,0071$
14	4	$30,9763 \pm 0,0051$	$3,854 \pm 0,018$	$0,9119 \pm 0,0052$
14	5	$36,87 \pm 0,27$	$8,6 \pm 1,3$	$1,323 \pm 0,082$
15	0	$11,718 \pm 0,081$	$0,208 \pm 0,022$	$-0,670 \pm 0,082$
15	1	$16,335 \pm 0,027$	$0,667 \pm 0,021$	$0,750 \pm 0,027$
15	2	$21,133 \pm 0,013$	$1,403 \pm 0,020$	$0,796 \pm 0,013$
15	3	$26,0041 \pm 0,0079$	$2,390 \pm 0,019$	$0,8442 \pm 0,0080$
15	4	$30,9654 \pm 0,0056$	$3,607 \pm 0,019$	$0,9118 \pm 0,0058$
15	5	$36,54 \pm 0,21$	$6,70 \pm 0,80$	$1,224 \pm 0,071$
16	0	$11,77 \pm 0,10$	$0,158 \pm 0,021$	$-0,66 \pm 0,10$
16	1	$16,384 \pm 0,032$	$0,532 \pm 0,019$	$0,757 \pm 0,032$
16	2	$21,161 \pm 0,016$	$1,118 \pm 0,019$	$0,795 \pm 0,015$
16	3	$26,0278 \pm 0,0094$	$1,909 \pm 0,019$	$0,8338 \pm 0,0094$
16	4	$30,9109 \pm 0,0064$	$2,878 \pm 0,018$	$0,8812 \pm 0,0067$
16	5	$36,45 \pm 0,22$	$5,19 \pm 0,65$	$1,192 \pm 0,077$
17	0	$11,83 \pm 0,11$	$0,139 \pm 0,021$	$-0,64 \pm 0,11$
17	1	$16,424 \pm 0,033$	$0,482 \pm 0,019$	$0,745 \pm 0,034$
17	2	$21,161 \pm 0,017$	$1,019 \pm 0,018$	$0,791 \pm 0,016$
17	3	$25,9996 \pm 0,0098$	$1,749 \pm 0,018$	$0,8274 \pm 0,0098$
17	4	$30,9028 \pm 0,0067$	$2,646 \pm 0,017$	$0,8796 \pm 0,0069$
17	5	$36,31 \pm 0,19$	$4,50 \pm 0,48$	$1,138 \pm 0,070$
18	0	$11,87 \pm 0,13$	$0,105 \pm 0,020$	$-0,59 \pm 0,13$
18	1	$16,494 \pm 0,037$	$0,395 \pm 0,017$	$0,738 \pm 0,038$

18	2	$21,201 \pm 0,017$	$0,860 \pm 0,017$	$0,779 \pm 0,018$
18	3	$26,012 \pm 0,011$	$1,479 \pm 0,016$	$0,823 \pm 0,010$
18	4	$30,8763 \pm 0,0070$	$2,268 \pm 0,016$	$0,8642 \pm 0,0072$
18	5	$36,07 \pm 0,15$	$3,35 \pm 0,26$	$1,064 \pm 0,060$
19	0	$11,95 \pm 0,16$	$0,081 \pm 0,021$	$-0,56 \pm 0,17$
19	1	$16,494 \pm 0,044$	$0,344 \pm 0,018$	$0,726 \pm 0,045$
19	2	$21,217 \pm 0,020$	$0,762 \pm 0,018$	$0,776 \pm 0,021$
19	3	$26,031 \pm 0,012$	$1,324 \pm 0,017$	$0,812 \pm 0,012$
19	4	$30,8870 \pm 0,0081$	$2,038 \pm 0,017$	$0,8556 \pm 0,0082$
19	5	$35,93 \pm 0,14$	$2,93 \pm 0,21$	$0,998 \pm 0,060$
20	0	$12,93 \pm 0,22$	$0,126 \pm 0,025$	$0,96 \pm 0,22$
20	1	$17,358 \pm 0,061$	$0,456 \pm 0,024$	$1,002 \pm 0,063$
20	2	$21,995 \pm 0,026$	$1,038 \pm 0,025$	$0,933 \pm 0,026$
20	3	$26,743 \pm 0,017$	$1,670 \pm 0,023$	$1,041 \pm 0,017$
20	4	$31,512 \pm 0,012$	$2,619 \pm 0,024$	$0,999 \pm 0,013$
20	5	$35,95 \pm 0,30$	$2,46 \pm 0,37$	$1,02 \pm 0,13$
21	0	$12,76 \pm 0,19$	$0,112 \pm 0,023$	$0,81 \pm 0,19$
21	1	$17,279 \pm 0,058$	$0,413 \pm 0,021$	$0,994 \pm 0,058$
21	2	$21,915 \pm 0,025$	$0,931 \pm 0,021$	$0,968 \pm 0,026$
21	3	$26,697 \pm 0,014$	$1,659 \pm 0,020$	$0,998 \pm 0,015$
21	4	$31,366 \pm 0,010$	$2,327 \pm 0,022$	$0,947 \pm 0,011$
21	5	$36,01 \pm 0,28$	$2,42 \pm 0,33$	$1,06 \pm 0,12$
22	0	$12,55 \pm 0,23$	$0,087 \pm 0,023$	$0,74 \pm 0,23$
22	1	$17,059 \pm 0,059$	$0,370 \pm 0,021$	$0,886 \pm 0,059$
22	2	$21,723 \pm 0,028$	$0,796 \pm 0,021$	$0,927 \pm 0,028$
22	3	$26,526 \pm 0,015$	$1,501 \pm 0,021$	$0,927 \pm 0,015$
22	4	$31,391 \pm 0,011$	$2,369 \pm 0,021$	$0,974 \pm 0,012$
22	5	$36,31 \pm 0,40$	$2,91 \pm 0,61$	$1,19 \pm 0,15$
23	0	$12,42 \pm 0,25$	$0,061 \pm 0,022$	$-0,59 \pm 0,24$
23	1	$16,937 \pm 0,061$	$0,289 \pm 0,018$	$0,821 \pm 0,060$
23	2	$21,594 \pm 0,026$	$0,674 \pm 0,018$	$0,845 \pm 0,026$
23	3	$26,394 \pm 0,015$	$1,231 \pm 0,017$	$0,905 \pm 0,015$
23	4	$31,2031 \pm 0,0099$	$1,939 \pm 0,018$	$0,916 \pm 0,010$
23	5	$36,23 \pm 0,31$	$2,63 \pm 0,44$	$1,13 \pm 0,12$

3.2 Zeeman-Effekt

3.2.1 Kalibrationsmessungen

$Ortx/m$	B/T
$(18,50 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(144,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$(18,60 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(151,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$(18,70 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(163,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$(18,80 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(178,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$(18,90 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(198,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$19,0 \cdot 10^{-2}$	$(198,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$19,1 \cdot 10^{-2}$	$(288,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$19,2 \cdot 10^{-2}$	$(322,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$19,3 \cdot 10^{-2}$	$(368,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$19,4 \cdot 10^{-2}$	$(420,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$19,5 \cdot 10^{-2}$	$(455,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$19,6 \cdot 10^{-2}$	$(466,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$19,7 \cdot 10^{-2}$	$(466,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$19,8 \cdot 10^{-2}$	$(458,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$19,9 \cdot 10^{-2}$	$(453,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$20,0 \cdot 10^{-2}$	$(458,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$20,1 \cdot 10^{-2}$	$(470,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$20,2 \cdot 10^{-2}$	$(479,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$20,3 \cdot 10^{-2}$	$(477,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$20,4 \cdot 10^{-2}$	$(454,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$20,5 \cdot 10^{-2}$	$(414,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$20,6 \cdot 10^{-2}$	$(371,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$20,7 \cdot 10^{-2}$	$(324 \pm 1) \cdot 10^{-3}$
$20,8 \cdot 10^{-2}$	$(284 \pm 1) \cdot 10^{-3}$
$20,9 \cdot 10^{-2}$	$(259 \pm 1) \cdot 10^{-3}$
$21,0 \cdot 10^{-2}$	$(225 \pm 1) \cdot 10^{-3}$
$21,1 \cdot 10^{-2}$	$(202 \pm 1) \cdot 10^{-3}$
$21,2 \cdot 10^{-2}$	$(184 \pm 1) \cdot 10^{-3}$
$21,3 \cdot 10^{-2}$	$(170 \pm 1) \cdot 10^{-3}$
$21,4 \cdot 10^{-2}$	$(155 \pm 1) \cdot 10^{-3}$
$21,5 \cdot 10^{-2}$	$(143 \pm 1) \cdot 10^{-3}$

Tabelle 3.3: Messwerte der Ortskalibration der Magnetfeldstärke bei $I = (5,47 \pm 0,01)$ A.

Sl. No.	Name of the Candidate	Registration Number	Grade	Score	Remarks
1	ABHIRAM K	1001	10	100	
2	ABHIRAM K	1002	10	100	
3	ABHIRAM K	1003	10	100	
4	ABHIRAM K	1004	10	100	
5	ABHIRAM K	1005	10	100	
6	ABHIRAM K	1006	10	100	
7	ABHIRAM K	1007	10	100	
8	ABHIRAM K	1008	10	100	
9	ABHIRAM K	1009	10	100	
10	ABHIRAM K	1010	10	100	
11	ABHIRAM K	1011	10	100	
12	ABHIRAM K	1012	10	100	
13	ABHIRAM K	1013	10	100	
14	ABHIRAM K	1014	10	100	
15	ABHIRAM K	1015	10	100	
16	ABHIRAM K	1016	10	100	
17	ABHIRAM K	1017	10	100	
18	ABHIRAM K	1018	10	100	
19	ABHIRAM K	1019	10	100	
20	ABHIRAM K	1020	10	100	
21	ABHIRAM K	1021	10	100	
22	ABHIRAM K	1022	10	100	
23	ABHIRAM K	1023	10	100	
24	ABHIRAM K	1024	10	100	
25	ABHIRAM K	1025	10	100	
26	ABHIRAM K	1026	10	100	
27	ABHIRAM K	1027	10	100	
28	ABHIRAM K	1028	10	100	
29	ABHIRAM K	1029	10	100	
30	ABHIRAM K	1030	10	100	
31	ABHIRAM K	1031	10	100	
32	ABHIRAM K	1032	10	100	
33	ABHIRAM K	1033	10	100	
34	ABHIRAM K	1034	10	100	
35	ABHIRAM K	1035	10	100	
36	ABHIRAM K	1036	10	100	
37	ABHIRAM K	1037	10	100	
38	ABHIRAM K	1038	10	100	
39	ABHIRAM K	1039	10	100	
40	ABHIRAM K	1040	10	100	
41	ABHIRAM K	1041	10	100	
42	ABHIRAM K	1042	10	100	
43	ABHIRAM K	1043	10	100	
44	ABHIRAM K	1044	10	100	
45	ABHIRAM K	1045	10	100	
46	ABHIRAM K	1046	10	100	
47	ABHIRAM K	1047	10	100	
48	ABHIRAM K	1048	10	100	
49	ABHIRAM K	1049	10	100	
50	ABHIRAM K	1050	10	100	
51	ABHIRAM K	1051	10	100	
52	ABHIRAM K	1052	10	100	
53	ABHIRAM K	1053	10	100	
54	ABHIRAM K	1054	10	100	
55	ABHIRAM K	1055	10	100	
56	ABHIRAM K	1056	10	100	
57	ABHIRAM K	1057	10	100	
58	ABHIRAM K	1058	10	100	
59	ABHIRAM K	1059	10	100	
60	ABHIRAM K	1060	10	100	
61	ABHIRAM K	1061	10	100	
62	ABHIRAM K	1062	10	100	
63	ABHIRAM K	1063	10	100	
64	ABHIRAM K	1064	10	100	
65	ABHIRAM K	1065	10	100	
66	ABHIRAM K	1066	10	100	
67	ABHIRAM K	1067	10	100	
68	ABHIRAM K	1068	10	100	
69	ABHIRAM K	1069	10	100	
70	ABHIRAM K	1070	10	100	
71	ABHIRAM K	1071	10	100	
72	ABHIRAM K	1072	10	100	
73	ABHIRAM K	1073	10	100	
74	ABHIRAM K	1074	10	100	
75	ABHIRAM K	1075	10	100	
76	ABHIRAM K	1076	10	100	
77	ABHIRAM K	1077	10	100	
78	ABHIRAM K	1078	10	100	
79	ABHIRAM K	1079	10	100	
80	ABHIRAM K	1080	10	100	
81	ABHIRAM K	1081	10	100	
82	ABHIRAM K	1082	10	100	
83	ABHIRAM K	1083	10	100	
84	ABHIRAM K	1084	10	100	
85	ABHIRAM K	1085	10	100	
86	ABHIRAM K	1086	10	100	
87	ABHIRAM K	1087	10	100	
88	ABHIRAM K	1088	10	100	
89	ABHIRAM K	1089	10	100	
90	ABHIRAM K	1090	10	100	
91	ABHIRAM K	1091	10	100	
92	ABHIRAM K	1092	10	100	
93	ABHIRAM K	1093	10	100	
94	ABHIRAM K	1094	10	100	
95	ABHIRAM K	1095	10	100	
96	ABHIRAM K	1096	10	100	
97	ABHIRAM K	1097	10	100	
98	ABHIRAM K	1098	10	100	
99	ABHIRAM K	1099	10	100	
100	ABHIRAM K	1100	10	100	

Literatur

- [1] *Beobachtung des normalen Zeeman-Effekts in transversaler und in longitudinaler Konfiguration: Spektroskopie mit einem Fabry-Perot-Etalon.* LD Didactic. 22. Dez. 2025. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/s/KKaf1E2bCCc2fT8>.
- [2] Wolfgang Demtroder. *Experimentalphysik 3: Atome, Moleküle und Festkörper.* 4. Springer, 2010.
- [3] Christian Gerthsen und Dieter Meschede. *Gerthsen Physik.* Springer, 2013. DOI: 10.1007/978-3-662-45977-5.
- [4] *Strong Lines of Cadmium (Cd): Basic Atomic Spectroscopic fundamental.* NIST National Institute of Standards und Technology. URL: https://www.physics.nist.gov/PhysRefData/Handbook/Tables/cadmiumtable2_a.htm (besucht am 22.12.2025).
- [5] *Versuchsbeschreibung P401: Elektronische Übergänge in Atomen.* Physikalisches Insitut, Universität Bonn. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/s/azE6754UkY23ABa> (besucht am 19.12.2025).