




TRIAMCINOLONE ACETONIDE 주사제(품명: 트리암시놀론 주 등)

 L639 상세불명의 원형탈모증

 N0091 가. 25cm² 미만 11,030 원

 N0092 나. 25cm² 이상 18,130 원

급여기준

- 허가사항 범위 내에서 투여 시 요양급여 함을 원칙으로 함.
- 허가사항 범위(효능·효과, 용법·용량)를 초과하여 아래와 같은 기준으로 투여한 경우에도 요양급여를 인정함.

- 아 래 -

- 가. 원형탈모증 및 켈로이드반흔 상병 등에 병변 내 주입 시 환자상태에 따라 1일 40mg 이내로 투여한 경우
- 나. 추간관절차단(Facet joint block/injection)시는 1 level당 20mg으로 최대 3 level(60mg)까지, 양측은 각각 최대 2 level(80mg)까지 인정

N0092 병변내주입요법(25cm² 이상) 행위정의 적응증

습진성병변, 결절성질환, 손발톱의 이상, 사마귀, 원형탈모증, 켈로이드(특히 통증이나 가려움증 등 증상이 있거나, 운동장애가 있는 경우) 등 바이러스 질환, 종양 등 직접 병변에 약물 투여가 필요한 경우

실시방법

- 약물의 주입이 필요한 부위를 도안하거나 표시한다.
- 필요한 약물을 주사기에 희석한다. (필요한 농도를 계산 또는 배합)
- 근육 주사와 달리 약물에 따라 혈관을 피하거나 연조직을 피하는 방법이 필요한 경우도 있음. 병변내 주사시에 피부위축, 색소침착, 이차감염, 피부괴사 등을 고려하여야 한다.