

자궁근종:MEDICAL TREATMENT

이니시아, INISIA[URIPRISTAL ACETATE]

1. 주상병
<ul style="list-style-type: none">D25 자궁내 평활근종D250 자궁의 점막하 평활근종D251 자궁의 벽내 평활근종D252 자궁의 장막하 평활근종D259 상세불명의 자궁의 평활근종
2. 보조상병
<ul style="list-style-type: none">출혈관련<ul style="list-style-type: none">N921 불규칙적 주기를 가진 과다 및 빈발월경N938 기타 명시된 이상 자궁 및 질 출혈통증관련<ul style="list-style-type: none">N940 중간통R103 기타 하복부에 국한된 동통R520 급성통증N945 속발성 월경통불임<ul style="list-style-type: none">N978 기타 요인에서 기원한 여성불임
청구메모»
가임기 여성(18세 - 폐경전)으로 자궁근종의 크기 감소와 증상개선을 목적으로 수술전 약물 투여함

투여방법

- 2014년 6월25일 식약청 의약품 수입품목 허가사항 변경
- 1일 1회 1정[5mg]을 3개월까지 연속 경구 투여
- 투약은 월경시작 1주 이내에 시작
- 3개월연속 투여는 한번더 반복 될 수 있음
- 첫 3개월 연속 투여 종료 후 첫번째 월경을 온전히 지내고 두번째 월경이 시작되면 일주일 이내에 재투여
- 2cycle 이상은 안정성 확보 안됨

청구시 주의사항 **자궁근종 상병1 + 보조상병중 출혈관련1+ 보조상병중 통증관련1+ 청구메모** 기입을 해야만 삭감이 없습니다. 꼭 유념..

- Progesterone receptor modulator
- Oral agents
- Comparable efficacy : No serious AE
- Increasingly used
- Major concern is endometrial effects with long term use : 1YR Tx is safe, More non-physiologic change, No sign of clinical concern, Non-physiologic change disappear at 6M

자궁근종'이니시아'투여 '삭감'사례는?

심평원, 4/4분기 요양급여비용 심사사례 공개

자궁내장치술 실시 환자에 이니시아정 투여해도 '삭감' 자궁근종으로 인한 증상이 불명확하고, 빈혈소견이 없음에도 '이니시아정'을 투여했다면 급여가 '삭감'된다. 자궁내장치술을 실시한 환자에게 이니시아정을 투여해도 삭감된다.

건강보험심사평가원은 공개심의위원회 심의를 거쳐 4/4분기 요양급여비용 심사사례를 26일 홈페이지를 통해 공개했다.

심사사례를 보면, 53세 여성은 '상세불명의 자궁의 평활근종'으로 진단 받고, 이니시아정을 투여받았다.

그러나 심평원이 확인한 결과, 진료내역에는 '생리통 +++, 생리량 +++'만 기록돼 있으며, 자궁근종으로 인한 증상이 불명확했다. 월경과다로 인한 빈혈소견 등 근종 치료 사유가 확인되지 않았다. 복부CT에서도 R/O 자궁선근종으로 확인되므로 이니시아정은 인정하지 않았다.

이니시아정은 식품의약품안전처 허가사항 중 '가임기 성인 여성에서 중등도-중증 증상을 가진 자궁근종 환자의 수술전 치료'에 효능·효과 있다. 이런 효능으로 진료경과기록 상 '참기 힘든 생리통'과 '생리량 과다'등의 증상과 함께 중등증의 빈혈소견이 확인될 때 이니시아정을 투여한다면, 수술전 빈혈치료 목적으로 투여한 경우로 급여가 인정된다.

47세 여성은 '상세불명의 자궁의 평활근종'상병으로 자궁내장치술인 '미레나'를 삽입 했으며, 4주 후에 이니시아정을 투여받았다. 그러나 이 환자에 대한 이니시아정은 급여로 인정되지 않았다.

미레나는 월경과다증·월경곤란증·에스트로젠 대체요법시 스로게스틴의 국소 적용시 치료목적으로 자궁 내 삽입하는 약제이다. 이 환자는 미레나를 통해 생리량이 줄었음에도 불구하고 동일 목적의 약제 이니시아정을 병용 투여한 경우이므로 이니시아정은 인정하지 않았다.

GNRH AGONIST

미레나