

# 도플러 10% 가산

- 1. 만 8 세 미만의 소아에 대하여는 소정점수의 20% 를 가산한다(산정코드 첫 번째 자리에 3 으로 기재).
- 2. 도플러 검사를 실시한 경우 소정점수의 10% 를 가산한다( 산정코드 두 번째 자리에 1 로 기재 ). 다만 , 「나 -940」 , 「나 -943」 , 「나 -948」 , 「나 -952」 , 「나 -956」 , 「나 -961」 은 소정점수에 포함되어 있으므로 그러하지 아니한다 .  
태아정밀심초음파는 도플러 가산에서 제외됨
- 3. 조영제를 사용하여 검사한 경우 소정점수의 30% 를 가산하고( 산정코드 두 번째 자리에 2 로 기재 ) , 검사 시 사용된 조영제는 별도 산정한다 .

Q. 임신확인 초음파 검사 시 도플러 가산이 가능한가요?

제 1삼분기 임신확인 초음파(EB512)에서 자궁 내 정상 임신낭 또는 난황만 확인이 되는 경우에는 도플 러 가산 산정할 수 없습니다. 도플러 가산은 비정상 임신(예: 자궁 외 임신, 유산, 출혈 등)인 경우 또는 의심되는 경우 진단을 위해 도플러 검사를 한 경우에 적용 가능합니다.

Q. 도플러 가산은 언제 가능한가요?

태아심장박동 확인은 초음파 행위정의에 포함되어 있으므로 단순 태아심박동 확인을 위한 도플러 검사는 도플러 가산에 해당되지 않습니다. 아래와 같이 태아 또는 태반의 이상을 진단하기 위한 목적으로 혈관 및 장기에서 도플러 검사를 한 경우에 (color, power, M-mode, P-W mode 상관 없이) 도플러 가산 적용이 가능합니다.

- ① 선천성 태아 기형 진단을 위한 도플러 검사
- ② 비정상 태반 또는 탯줄 진단을 위한 도플러 검사
- ③ 자궁내 태아성장지연, 양수과소증, 전자간증 등에서 탯줄동맥, 탯줄정맥, 중대뇌동맥, 정맥관, 자궁동맥 등의 혈관에서 혈류 및 파형을 분석하기 위한 도플러 검사
- ④ 기타 태아, 태반, 탯줄, 자궁 등의 혈관 또는 혈류 이상을 진단하기 위한 도플러 검사