

# 폐경 후 호르몬요법

☞ N951 폐경 및 여성의 갱년기상태		<div>폐경기증후군에 투여하는 약제</div> <div>갱년기장애(폐경기증후군) 증상의 발현 시 동 증상 완화를 위하여 호르몬제나 칼슘제제 등의 약제를 투여하는 경우에 요양급여를 인정함.</div> <div>* 시행일: 2013.9.1.</div> <div>* 종전고시: 고시 제2001-28호(2001.6.8.)</div>
(일반원칙) 폐경 후 호르몬요법 인정기준 폐경기증후군 및 골다공증에 사용하는 호르몬요법은 허가범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정함.		
- 아 래 -		
가. 적응증		
		1) 폐경기증후군의 증상완화와 골밀도검사에서 같은 성, 젊은 연령의 정상치보다 1표준편차 이상 감소된 경우에 골다공증의 예방 및 치료목적으로 투여 시 요양급여를 인정함.
		2) 심혈관계 질환의 예방 및 치료에는 인정하지 아니함.
		3) 재평가 기간매 12개월마다 재평가를 실시하여야 함(환자의 전반적인 상태 및 필요성)
		4) 적정투여기간60세까지 투여하며, 60세를 초과하여 호르몬 요법을 지속하는 경우에는 동 치료의 효과를 평가하여 지속투여 여부를 결정하여야 함.

폐경기장애틀 동반한 골다공증치료에 호르몬제와 골다공증치료제 병용투여시 인정기준

골다공증치료제에는 호르몬요법(Estrogen, Estrogen derivates 등)과 비호르몬요법(Bisphosphonate, Calcitonin, Vit D, Ipriflavon 등)이 있으며, 칼슘제제와의 병용투여를 제외하고는 병용투여에 대한 효과가 입증되지 아니하였으므로 호르몬대체요법(HRT)과 비호르몬요법제를 병용투여하거나 비호르몬요법간 병용투여는 인정하지 아니한다.

## 폐경기 약제의 효능/효과(식약처 허가사항)

제품명/성분명	식약처 허가사항
리브론 정 2.5mg	자연적인 또는 수술에 의한 폐경 이후의 증상(홍조, 야간 발한), 골절되기 쉬운 폐경 이후 골다공증.
안젤릭 정	1. 폐경 후 일년이 지난 여성의 에스트로겐 결핍증에 대한 호르몬 대체 요법. 2. 골다공증 예방으로 허가 받은 다른 약제에 불내성이거나 금기이고 골절 가능의 위험성이 증가된 폐경 후 여성의 골다공증 예방.
크리멘 28 정	폐경 후 ( 마지막 생리 후 최소 1 년이 경과된 시점 ) 여성의 에스트로겐 결핍의 증상경감을 위한 호르몬 대체요법 (HRT)
프레미나 정 0.3mg 프레미나 정 0.625mg	성선기능저하증û난소적출û난소기능부전으로 인한 저에스트로겐증, 위축성 질염û외음위축증, 갱년기장애, 기능성 자궁출혈, 골다공증, 폐경 후의 유방암(경감용), 수술불능의 진행성 전립선암(경감용).
디비나 정	폐경 후 ( 마지막 생리 후 최소 1 년이 경과된 시점 ) 여성의 에스트로겐 결핍의 증상경감을 위한 호르몬 대체요법 (HRT)
리비알 정	폐경 후 1년이 경과한 여성의 에스트로겐 결핍 증상, 골절위험성이 높은 폐경 이후 여성의 골다공증 예방.
에스디올 하프 정	폐경후 1년 이상된 여성의 에스트로겐 결핍증상에 대한 호르몬 대체요법, 폐경후 여성의 골다공증 예방.
크리안 정	자궁절제가 되지 않은 폐경 후(마지막 생리 후 최소 1년이 경과된 시점) 여성의 에스트로겐 결핍의 증상경감을 위한 호르몬대체요법.
클리오벨 정	폐경 후 1년 이상 된 여성의 에스트로겐 결핍증상에 대한 호르몬 대체요법(다른 골다공증 예방약이 금기이거나 효과가 없는 경우). 골절을 일으키기 쉬운 폐경 후 여성의 골다공증 예방.
페모스톤 정 1/10	손상되지 않은 자궁을 가진 여성의 자연적 혹은 의인성 폐경 후(마지막 생리 후 최소 1년이 경과된 시점) 에스트로겐 결핍의 증상경감을 위한 호르몬대체요법, 골절의 위험이 있는, 자궁을 가진 폐경 후 여성의 골다공증 예방.
페모스톤 정 2/10	손상되지 않은 자궁을 가진 여성의 자연적 혹은 의인성 폐경 후(마지막 생리 후 최소 1년이 경과된 시점) 에스트로겐 결핍의 증상경감을 위한 호르몬대체요법, 골절의 위험이 있는, 자궁을 가진 폐경 후 여성의 골다공증 예방.
페모스톤 콘티 정	손상되지 않은 자궁을 가진 여성의 자연적 혹은 의인성 폐경 후(마지막 생리 후 최소 1년이 경과된 시점) 에스트로겐 결핍의 증상경감을 위한 호르몬대체요법, 골절의 위험이 있는, 자궁을 가진 폐경 후 여성의 골다공증 예방.
프레다 정 1mg	에스트로겐 결핍 증상(갱년기장애). 폐경 후 골다공증.
프로기노바 1mg 정	갱년기 증상경감을 위한 호르몬대체요법
프로기노바 2mg 정	갱년기 증상 치료 위한 호르몬 대체 요법, 골절을 일으키기 쉬운 여성의 골다공증 예방.