

질병으로본 산과초음파 급여화 및 분만급여화

GDM O249

1. 7회 정규초음파

- EB511010 : with Doppler (1st Trimester 일반)
- EB513010 : with Doppler (1st Trimester 정밀)
- EB516010 : with Doppler (2,3th Trimester 고위험 임신)
- EB517010 : with Doppler (2,3th Trimester 정밀)

2. 7회 이상의 초음파 가능

- JX999 : 혈당조절이 잘 안되어서 태아의 안녕평가를 위해서 검사함. 양수양과다등으로 인해서 태아감소로 인해서 태아안녕평가 위해서 검사
- EB515011 : with Doppler/제한적 (2,3th Trimester 일반/제한적)
- EB515010 : with Doppler (2,3th Trimester 일반)

3. delivery시 초음파

- 제왕절개하면 : 부상병에 GDM으로 severity 증가
- 질식분만시 : 당뇨병 [O249]으로 high risk로 인해서 숫가 증가됨.

OLD MATERNAL AGE >35 Z355 Z358

1. 7회 정규초음파

- EB511010 : with Doppler (1st Trimester 일반)
- EB513010 : with Doppler (1st Trimester 정밀)
- EB515010 : with Doppler (2,3th Trimester 일반)
- EB517010 : with Doppler (2,3th Trimester 정밀)

2. delivery시 초음파

- 제왕절개하면 : 부상병에 Primi >35, multi >35과 5년 터울인 경우 severity 증가
- 질식분만시 : Old maternal age로 high risk로 인해서 숫가 증가됨.

UTERINE MYOMA O3419 OR UTERINE ANOMALY O3409 AT PREGNANCY

1. 7회 정규초음파

- EB511010 : with Doppler (1st Trimester 일반)
- EB513010 : with Doppler (1st Trimester 정밀)
- EB516010 : with Doppler (2,3th Trimester 고위험 임신)
- EB517010 : with Doppler (2,3th Trimester 정밀)

2. 7회 이상의 초음파 가능

- JX999 : 조산위험으로 Uterine Cx length 측정시 7회 이상의 초음파 가능. 조산위험으로 태아안녕평가 위해 자궁경부길이 측정함.
- EB515011 : with Doppler/제한적 (2,3th Trimester 일반/제한적)
- EB515010 : with Doppler (2,3th Trimester 일반)

3. delivery시 초음파

- 제왕절개하면 : (-)
- 질식분만시 : 5cm이상의 근종이 있을시 high risk로 인해서 숫가 증가됨.

IIOC O343

1. 7회 정규초음파

- EB511010 : with Doppler (1st Trimester 일반)
- EB513010 : with Doppler (1st Trimester 정밀)
- EB516010 : with Doppler (2,3th Trimester 고위험 임신)
- EB517010 : with Doppler (2,3th Trimester 정밀)

2. 7회 이상의 초음파 가능

- JX999 : 조산위험으로 Uterine Cx length 측정시 7회 이상의 초음파 가능. 조산위험으로 태아안녕평가 위해 자궁경부길이 측정함.
- EB515011 : with Doppler/제한적 (2,3th Trimester 일반/제한적)
- EB515010 : with Doppler (2,3th Trimester 일반)

3. delivery시 초음파

- 제왕절개하면 : (-)
- 질식분만시 : (-)

OLIGOHYDROAMNIOSIS O410 OR HYDROAMNIOSIS O40

1. 7회 정규초음파

- EB511010 : with Doppler (1st Trimester 일반)
- EB513010 : with Doppler (1st Trimester 정밀)
- EB516010 : with Doppler (2,3th Trimester 고위험 임신)
- EB518010 : with Doppler (2,3th Trimester 기형계측정밀 정밀)

2. 7회 이상의 초음파 가능

- JX999 : 태아이상등으로 7회 이상의 초음파 가능. 태아이상(다태임신으로 인한합병증)으로 태아안녕평가위해 초음파함.
- EB515011 : with Doppler/제한적 X 1.5(2,3th Trimester 일반/제한적)
- EB515010 : with Doppler X 1.5 (2,3th Trimester 일반)

3. delivery시 초음파

- 제왕절개하면 : (-)
- 질식분만시 : 양소과소증과 양수과다증으로 high risk로 인해서 숫가 증가됨.

자궁내 태아 성장 지연 IUGR O365

1. 7회 정규초음파

- EB511010 : with Doppler (1st Trimester 일반)
- EB513010 : with Doppler (1st Trimester 정밀)
- EB516010 : with Doppler (2,3th Trimester 고위험 임신)
- EB517010 : with Doppler (2,3th Trimester 정밀)

2. 7회 이상의 초음파 가능

- JX999 : 태동의 감소나 태아이상등을 이유로 7회 이상의 초음파 가능. 1.태동감소로 태아안녕평가위해, 2. 상세불명의 자궁내태아성장지연으로 태아이상등의심으로 태아안녕평가위해 검사함.
- EB515011 : with Doppler/제한적 (2,3th Trimester 일반/제한적)
- EB515010 : with Doppler (2,3th Trimester 일반)

3. delivery시 초음파

- 제왕절개하면 : (-)
- 질식분만시 : 2.5kg 미만의 신생아인 경우는 high risk로 인해서 숫가 증가됨.

전치태반 O440 태반조기박리 0459

1. 7회 정규초음파

- EB511010 : with Doppler (1st Trimester 일반)
- EB513010 : with Doppler (1st Trimester 정밀)
- EB516010 : with Doppler (2,3th Trimester 고위험 임신)
- EB517010 : with Doppler (2,3th Trimester 정밀)

2. 7회 이상의 초음파 가능

- JX999 : 출혈이 있을때는 7회 이상의 초음파 가능. 출혈로 인해 태아안녕평가위해.
- EB515011 : with Doppler/제한적 (2,3th Trimester 일반/제한적)
- EB515010 : with Doppler (2,3th Trimester 일반)

3. delivery시 초음파

- 제왕절개하면 : 출혈이나 전치태반, 태반조기박리를 부진단으로 해서 severity증가
- 질식분만시 : 전치태반 or 태반조기박리로 high risk로 인해서 숫가 증가됨.

PIH 012

1. 7회 정규초음파

- EB511010 : with Doppler (1st Trimester 일반)
- EB513010 : with Doppler (1st Trimester 정밀)
- EB516010 : with Doppler (2,3th Trimester 고위험 임신)
- EB517010 : with Doppler (2,3th Trimester 정밀)

2. 7회 이상의 초음파 가능

- JX999 : PIH 7회 이상의 초음파 가능. PIH로 태아안녕평가위해 자궁경부길이 측정함.
- EB515011 : with Doppler/제한적 (2,3th Trimester 일반/제한적)
- EB515010 : with Doppler (2,3th Trimester 일반)

3. delivery시 초음파

- 제왕절개하면 : PIH로 부진단으로 severity증가
- 질식분만시 : PIH 있을시 high risk로 인해서 숫가 증가됨.

PRETERM 060 047

1. 7회 정규초음파

- EB511010 : with Doppler (1st Trimester 일반)
- EB513010 : with Doppler (1st Trimester 정밀)
- EB515010 : with Doppler (2,3th Trimester 일반)
- EB517010 : with Doppler (2,3th Trimester 정밀)

2. 7회 이상의 초음파 가능

- JX999 : PIH 7회 이상의 초음파 가능. PIH로 태아안녕평가위해 자궁경부길이 측정함.
- EB515011 : with Doppler/제한적 (2,3th Trimester 일반/제한적)
- EB515010 : with Doppler (2,3th Trimester 일반)

3. delivery시 초음파

- 제왕절개하면 : 조산으로 입원중 제왕절개시 부진단으로 severity증가
- 질식분만시 : 34주 미만의 조산시 high risk로 인해서 숫가 증가됨.

쌍태아 TWIN 033

1. 7회 정규초음파

- EB511010 : with Doppler X 1.5 (1st Trimester 일반)
- EB513010 : with Doppler X 1.5 (1st Trimester 정밀)
- EB515010 : with Doppler X 1.5 (2,3th Trimester 일반)
- EB517010 : with Doppler X 1.5 (2,3th Trimester 기형정밀제측 if 다태임신으로 인한 합병증: 결합쌍태아, 무심장쌍태아, 태아간 수혈증후군, 태아간 20% 이상의 체중 차이가 있는 불균형 쌍태아, 일측태아사망, 단일양막성쌍태아등)

2. 7회 이상의 초음파 가능

- JX999 : 조산통이나 태아이상등으로 7회 이상의 초음파 가능. 조산통으로 태아안녕평가위해 자궁경부길이 측정함. 태아이상(다태임신으로 인한합병증)으로 태아안녕평가위해 초음파함.
- EB515011 : with Doppler/제한적 X 1.5(2,3th Trimester 일반/제한적)
- EB515010 : with Doppler X 1.5 (2,3th Trimester 일반)

3. delivery시 초음파

- 제왕절개하면 : (-)
- 질식분만시 : 쌍태간 수혈증후군이 있으면 high risk로 인해서 숫가 증가됨.