

ETOMIDATE 주사제 (품명:에토미데이트리프로주)

- 효능/효과 : 전신 마취 유도제.
- 용법/용량
 1. 성인: 에토미데이트로서 1회 체중 kg당 0.15-0.3mg을 정맥투여 한다.
 2. 2세 이상 어린이부터 15세 이하의 청소년 및 고령자: 에토미데이트로서 1회 체중 kg당 0.15-0.2mg을 정맥투여 한다.
 3. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.
 4. 반드시 정맥 투여하고 일반적으로 서서히 (1회 투여 시간은 30초) 투여하고 필요에 따라 분할 투여한다

Etomidate 주사제 (품명:에토미데이트리프로주)

허가사항 범위 내에서 아래와 같은 환자에게 전신마취유도 목적으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.

- 아 래 -

- 가. 심혈관계 질환
- 나. 반응성 기도질환(천식, 만성기관지염 등)
- 다. 두개강내압 상승이 있는 경우.

에토미데이트 사용시에는 **100/100** 으로 하십시오.

에토미데이트리프로주는 **따로 교육 필요 없습니다.**

경련방지책

- 에토미 10cc 인데 천천히 포폴처럼 주면 되고 간단한 건 몸무게적으면 7cc정도 서서히 주시면 됩니다 단 경련이 심합니다 포폴보다
- 에토미데이트 처음에 1cc 천천히 주고 1분 기다렸다가 나머지 7cc를 천천히 주사하면됩니다. 빨리주면 경련이 심한데 천천히 주면 훨씬 경련이 적어요
- 에토미데이트 쓸때 바리움주사나 트라마돌 주사 IV로 먼저 주고 2-3분 지나서 에토미데이트 쓰면 경련이 거의 안 옵니다
- 에토미데이트 나쁘지 않습니다.경련 자주 있어요. 대부분 지켜보면 지나갑니다. 하지만 혹시해서 발륨을 준비해 놓는게 좋습니다. 그랜드말시저에 대비해서..
- 발륨은 항정입니다 항정이지만 주목을 크게 안받는 항정이죠.
- 춘계학술대회 연자 왈 포폴 비해 호흡억제 심억제 거의 없으나 근경련이 30% 있다네요
- 전 개인적으로 3.8 - 4.0 cc 사용합니다. 경련이 아주 미미합니다
- 저는 준비되면 에토미데이트 3cc 먼저주고 1분정도 기다리는 동안 글러브 끼고 슬슬 시간끌고 나서 나머지 주면 좋던데요. 거의 경련도 없구요. 그래도 부족할땐 펜토 3cc 씩 주고 있습니다.
- 그러려니 마음 먹고 줍니다. 전 6 - 7 cc 정도 줍니다. 체중이 많을수록 많이 주라는데 제 경험상 오히려 적은 양으로 될 때도 많습니다
- 에토미데이트 쓸때 트라마돌을 미리 정맥주사후 조금 지나서 에토미데이트를 천천히 주면 경련도 거의 없고 통증 조절도 잘됩니다.