

㉮ N80 자궁내막증 Endometriosis
㉮ N80.0 자궁의 자궁내막증 Endometriosis of uterus
㉮ N80.1 난소의 자궁내막증 Endometriosis of ovary
㉮ N80.3 골반복막의 자궁내막증 Endometriosis of pelvic peritoneum
㉮ N80.9 상세불명의 자궁내막증 Endometriosis, unspecified

GnRH 주사제 급여기준입니다. 고시 제2013-127호

1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시
요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액
을 환자가 부담토록 함.

- 아 래 -

가. 급여대상품목 : 허가받은 GnRH (Gonadotropin-Releasing Hormone) Analogue 계열 제제(성
분명:Buserelin, Goserelin, Leuprorelin, Na-
farelin, Triptorelin 등)

나. 급여범위 : 각 약제 허가사항 범위 내에서 다음과
같이 인정함.

- 1) 자궁내막증 : 복강경 검사등으로 확진된 경우
- 2) 중추성사춘기조발증

가) 투여대상

- (1) 이차성징성숙도(Tanner stage) 2이상
이면서 골연령이 해당 역연령보다 증가
되고,
- (2) GnRH(생식샘자극호르몬분비호르몬) 자
극검사에서 황체형성호르몬(LH)이 기저
치의 2-3배 증가되면서 최고 농도는 5
IU/L 이상인 경우.

나) 투여기간

- (1) 투여시작: 역연령 여아 9세(8세 365일),
남아는 10세(9세 365일) 미만
- (2) 투여종료: 역연령 여아 11세(11세 364
일), 남아는 12세(12세 364일)까지

Dienogest 경구제 (품명:비잔정)

고시 제2013-127호

허가사항 범위 내에서 복강경 검사 등으로 자궁내막증이
확진된 경우에 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기
준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.

로렐린 주사

효능/효과

- 1. 자궁내막증.
- 2. 과다월경, 하복통, 요통 및 빈혈 등을 수반한 자궁근종에서 근종핵의 축소 및 증상의 개선.
- 3. 전립선암.
- 4. 폐경전 유방암.
- 5. 중추성 사춘기조발증.

용법/용량

- 1. 자궁내막증 : 보통 성인에는 4주 1회 류프로렐린아세트산염으로서 3.75 mg을 피하주사한다. 단, 체중이 50 kg 미만의 환자에게는 1.88 mg을 투여한다. 또한 초회 투여는 월경주기 1~5일째에 한다.
- 2. 자궁근종 : 보통 성인에는 4주 1회 류프로렐린아세트산염으로서 1.88 mg을 피하주사한다. 단, 체중과다 환자, 자궁종대가 고도인 환자에는 3.75 mg을 투여한다. 또한 초회투여는 월경주기 1~5일째에 한다.
- 3. 전립선암, 폐경전 유방암 : 보통 성인에는 4주 1회 류프로렐린아세트산염으로서 3.75 mg을 피하주사한다.
- 4. 중추성 사춘기조발증 : 보통 4주 1회 류프로렐린아세트산염으로서 체중 kg당 30 μg을 피하주사한다. 또한 증상에 따라 체중 kg당 90 μg까지 증량할 수 있다.