

고지혈증

※ E785 상세불명의 고지질혈증

검사코드	검사명
C3710	당검사(반정량)
C3711	당검사(정량)
B2710	GTP
C3791	전해질(소듐) Na
C3792	전해질(포타슘) K
C3793	전해질(염소) Cl
C3410	인슐린
C3825	헤모글로빈 A1C
C2302	미량알부민검사(정량)
C3430	C-peptide

고지혈증치료제

허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에 투여한 경우에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.

- 아 래 -

가. 순수 고저밀도지단백콜레스테롤(LDL-C)혈증

1) 투여대상

- i. 위험요인^㉑ 이 0-1개인 경우: 혈중 LDL-C \geq 160 mg/dL일 때
- ii. 위험요인이 2개 이상인 경우: 혈중 LDL-C \geq 130 mg/dL일 때
- iii. 관상동맥질환 또는 이에 준하는 위험(말초동맥질환, 복부대동맥류, 증상이 동반된 경동맥질환, 당뇨병)인 경우: 혈중 LDL-C \geq 100 mg/dL일 때
- iv. 급성 관동맥 증후군인 경우: 혈중 LDL-C \geq 70 mg/dL일 때

2) 해당 약제: HMG-CoA 환원효소억제제, 담즙산제거제, Fibrate계열 약제 중 1종

나. 순수 고트리글리세라이드(TG)혈증

1) 투여대상

- i. 혈중 TG \geq 500 mg/dL일 때
- ii. 위험요인*또는 당뇨병이 있는 경우: 혈중 TG \geq 200 mg/dL일 때

2) 해당 약제: Fibrate 계열, Niacin 계열 중 1종

다. 고LDL-C 및 고TG혈증 복합형

- 1) 투여대상 : “가. 순수 고LDL-C혈증”과 “나. 순수 고TG혈증”에 해당하는 경우
- 2) 해당 약제 : LDL-C 및 TG에 작용하는 약제별로 각각 1종씩 인정

라. 약제투여는 치료적 생활습관 변화(therapeutic lifestyle changes)를 병행하여 실시토록 권장함

^㉑ ① 흡연, ② 고혈압(BP \geq 140/90 mmHg 또는 항고혈압제 복용), ③ 낮은 고밀도지단백콜레스테롤(HDL-C)($<$ 40 mg/dL), ④ 관상동맥질환 조기 발병의 가족력(부모, 형제자매 중 남자 $<$ 55세, 여자 $<$ 65세에서 관상동맥질환이 발병한 경우), ⑤ 연령(남자 \geq 45세, 여자 \geq 55세), ※ HDL-C \geq 60 mg/dL은 보호인자로 간주하여 총 위험요인 수에서 하나를 감한다.