

1. EQUAÇÕES DE PRIMEIRA ORDEM

1.1. Temos:

$$\begin{aligned}
 y &= e^{\int_1^x \frac{2}{t} dt} \left[1 + \int_1^x \frac{t+1}{t} e^{-\int_1^t \frac{2}{\tau} d\tau} dt \right] \\
 &= e^{2 \ln x} \left[1 + \int_1^x \frac{t+1}{t} e^{-2 \ln t} dt \right] \\
 &= x^2 \left[1 + \int_1^x \frac{t+1}{t^3} dt \right] = x^2 \left[1 + \int_1^x \left(\frac{1}{t^2} + \frac{1}{t^3} \right) dt \right] \\
 &= x^2 \left[1 + \left|_1^x \left(-\frac{1}{t} - \frac{1}{2t^2} \right) \right| \right] = x^2 \left(1 - \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + \frac{3}{2} \right) \\
 &= \frac{5x^2 - 2x - 1}{2}.
 \end{aligned}$$

2.3. Temos:

$$\begin{aligned}
 e^y dy &= \cos(x) dx & \int_{2\pi}^y e^t dt &= \int_0^x \cos(\tau) d\tau \\
 e^y - e^{2\pi} &= \sin(x) & y &= \ln(\sin(x) + e^{2\pi}).
 \end{aligned}$$

3.2. Substituindo $z = \frac{y}{x}$ obtemos $z'x + z = z + \frac{\cos(z)}{\sin(z)}$, ou seja, $z'x = \frac{\cos(z)}{\sin(z)}$, e $z(\frac{1}{2}) = \frac{\pi}{6}$.

$$\begin{aligned}
 \tan(z) dz &= \frac{1}{x} dx & \int_{\frac{\pi}{6}}^z \tan(t) dt &= \int_{\frac{1}{2}}^x \frac{1}{\tau} d\tau \\
 -\ln(\cos(z)) + \ln(\cos(\frac{\pi}{6})) &= \ln(x) - \ln(\frac{1}{2}) & \frac{\cos(\frac{\pi}{6})}{\cos(z)} &= \frac{x}{\frac{1}{2}} \\
 \cos(z) &= \frac{\sqrt{3}}{4x} & y &= x \arccos \frac{\sqrt{3}}{4x}.
 \end{aligned}$$

4.2. Dividindo por y^2 obtemos $\frac{y'}{y^2} = -\frac{1}{xy} + x \ln x$. Substituindo $z = y^{-1}$ obtemos $-z' = -\frac{z}{x} + x \ln x$, logo $z' = \frac{z}{x} - x \ln x$. Enfim, $z(1) = 2$.

$$\begin{aligned}
 z &= e^{\int_1^x \frac{1}{t} dt} \left[2 - \int_1^x t \ln(t) e^{-\int_1^t \frac{1}{\tau} d\tau} dt \right] \\
 &= e^{\ln x} \left[2 - \int_1^x t \ln(t) e^{-\ln t} dt \right] = x \left[2 - \int_1^x \ln(t) dt \right] \\
 &= x[2 - x(\ln x - 1) - 1] = -x^2 \ln x + x^2 + x.
 \end{aligned}$$

Logo, $y = \frac{1}{x^2 + x - x^2 \ln x}$.

5.2. $\frac{\partial P}{\partial y} = 2y$ e $\frac{\partial Q}{\partial x} = 2y$, portanto é exata. Temos $F(x, y) = \int_1^x (2t^2 + 1) dt + \int_1^y 2x\tau d\tau = \left|_1^x \left(\frac{2}{3}t^3 + t \right) + \left|_1^y (x\tau^2) = \frac{2}{3}x^3 + x - \frac{5}{3} + xy^2 - x = \frac{2}{3}x^3 - \frac{5}{3} + xy^2 \right.$ Portanto:

$$y = \sqrt{\frac{5 - 2x^3}{3x}}.$$

5.3. $\frac{\partial P}{\partial y} = 0$ e $\frac{\partial Q}{\partial x} = 2x$. Temos:

$$-\frac{1}{P}\left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}\right) = 1$$

portanto temos um fator integrante $g(y) = e^{\int dy} = e^y$:

$$y' = -\frac{2xe^y}{e^y(x^2 + 2y + y^2)}.$$

Agora $\frac{\partial \tilde{P}}{\partial y} = 2xe^y$ e $\frac{\partial \tilde{Q}}{\partial x} = 2xe^y$, portanto $F(x, y) = \int_1^x 2e^2 t dt + \int_2^y e^\tau (x^2 + 2\tau + \tau^2) d\tau$. Como $\int \tau e^\tau d\tau = e^\tau(\tau - 1)$ e $\int \tau^2 e^\tau d\tau = e^\tau(\tau^2 - 2\tau + 2)$, temos que $F(x, y) = e^2 x^2 - e^2 + x^2 e^y + 2e^y(y - 1) + e^y(y^2 - 2y + 2) - e^2 x^2 - 2e^2 - 2e^2 = e^y(x^2 + y^2) - 5e^2$, portanto obtemos a relação implícita

$$e^y(x^2 + y^2) - 5e^2 = 0.$$

Neste caso não se pode achar uma fórmula explícita de y em função de x .

2. EQUAÇÕES DE SEGUNDA ORDEM

1. O polinômio característico é $\lambda^2 - 4\lambda + 3$, ou seja, $(\lambda - 3)(\lambda - 1)$. Portanto, a genérica solução da equação homogênea é $y = Ae^{3x} + Be^x$. Agora temos que encontrar uma solução particular da equação completa.

Determinação dos coeficientes. Como 3 é raiz do polinômio característico, buscamos por uma solução da forma $\varphi(x) = (\alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x)e^{3x}$. Temos que:

$$\varphi(x) = (\alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x)e^{3x}$$

$$\varphi'(x) = (3\alpha x^3 + 3(\alpha + \beta)x^2 + (2\beta + 3\gamma)x + \gamma)e^{3x}$$

$$\varphi''(x) = (9\alpha x^3 + 9(2\alpha + \beta)x^2 + 3(2\alpha + 4\beta + 3\gamma)x + 2(\beta + 3\gamma))e^{3x}.$$

Igualando $\varphi''(x) - 4\varphi'(x) + 3\varphi(x) = (x^2 - 1)e^{3x}$ obtemos o sistema linear:

$$\begin{cases} 6\alpha = 1 \\ 6\alpha + 4\beta = 0 \\ 2\beta + 2\gamma = -1. \end{cases}$$

A solução é $\alpha = \frac{1}{6}$ e $\beta = \gamma = -\frac{1}{4}$, logo a solução genérica da equação completa é:

$$(1) \quad y = \left(\frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}x + A\right)e^{3x} + Be^x.$$

Variação das constantes. Temos que:

$$w(x) = \begin{vmatrix} e^{3x} & e^x \\ 3e^{3x} & e^x \end{vmatrix} = -2e^{4x}.$$

Portanto:

$$A(x) = -\int \frac{(x^2 - 1)e^{3x} \cdot e^x}{-2e^{4x}} dx = \frac{1}{2} \int (x^2 - 1) dx = \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{2}x$$

$$B(x) = \int \frac{(x^2 - 1)e^{3x} \cdot e^{3x}}{-2e^{4x}} dx = -\frac{1}{2} \int (x^2 - 1)e^{2x} dx = \left(-\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{4}x + \frac{1}{8}\right)e^{2x}.$$

Obtemos a solução particular $\varphi(x) = A(x)e^{3x} + B(x)e^x = \left(\frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}x + \frac{1}{8}\right)e^{3x}$. Por isso a solução genérica da equação completa é:

$$(2) \quad y = \left(\frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}x + \frac{1}{8} + A\right)e^{3x} + Be^x.$$

Observamos que (2) equivale a (1), trocando a constante $\frac{1}{8} + A$ de (2) pela constante A de (1).

Resolução do problema de Cauchy. Temos que:

$$\begin{aligned} y &= \left(\frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}x + A\right)e^{3x} + Be^x \\ y' &= \left(\frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{4}x^2 - \frac{5}{4}x - \frac{1}{4} + 3A\right)e^{3x} + Be^x. \end{aligned}$$

Por isso a condição inicial se torna $A + B = 0$ e $-\frac{1}{4} + 3A + B = 1$, cuja solução é $A = \frac{5}{8}$ e $B = -\frac{5}{8}$. Afinal, a solução do problema é:

$$y = \left(\frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}x + \frac{5}{8}\right)e^{3x} - \frac{5}{8}e^x.$$