Сплайн-интерполирование с заданными на концах моментами

Условие

Построить кубический сплайн для функции y = f(x) заданной таблицей значений

x	1	2	5
f(x)	0	1	9
f''(x)	3	-	5

Вычислить приближенное значение функции в точке x = 3.

Алгоритм решения

Для решения данной задачи нам понадобятся следующие формулы (N – количество узлов):

1. расстояние между i-ым и (i-1)-ым узлами

$$h_i = x_i - x_{i-1}, \qquad i = \overline{1, N} \tag{1}$$

2. формула кубического сплайна

$$S_3(x) = M_{i-1} \frac{(x_i - x)^3}{6h_i} + M_i \frac{(x - x_{i-1})^3}{6h_i} + \left(f_i - M_i \frac{h_i^2}{6}\right) \frac{x - x_{i-1}}{h_i} + \left(f_{i-1} - M_{i-1} \frac{h_i^2}{6}\right) \frac{(x_i - x)}{h_i}, \quad x \in [x_{i-1}, x_i], \ i = \overline{1, N}$$
 (2)

3. формулы для коэффициентов кубического сплайна

$$\frac{h_i}{6}M_{i-1} + \frac{h_i + h_{i+1}}{3}M_i + \frac{h_{i+1}}{6}M_{i+1} = \frac{f_{i+1} - f_i}{h_{i+1}} - \frac{f_i - f_{i-1}}{h_i}, \quad i = \overline{1, N-1} \quad (3)$$

4. граничные условия для коэффициентов

$$M_0 = f''(a), \quad M_N = f''(b).$$
 (4)

Сначала по формуле (1) найдем расстояния между узлами:

$$h_1 = x_1 - x_0 = 1$$

$$h_2 = x_2 - x_1 = 3.$$

Теперь составим по формулам (3) и (4) СЛАУ для коэффициентов кубического сплайна:

$$\begin{cases} M_0 = f''(a), \\ \frac{h_1}{6}M_0 + \frac{h_1 + h_2}{3}M_1 + \frac{h_2}{6}M_2 = \frac{f_2 - f_1}{h_2} - \frac{f_1 - f_0}{h_1}, \\ M_2 = f''(b). \end{cases}$$

Подставим в эту систему значения (h_i нам известны, f_i и f''(a), f''(b) берем из заданной таблицы):

$$\begin{cases} M_0 = 3, \\ \frac{1}{6}M_0 + \frac{1+3}{3}M_1 + \frac{3}{6}M_2 = \frac{9-1}{3} - \frac{1-0}{1}, \\ M_2 = 5. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} M_0 = 3, \\ \frac{1}{6}M_0 + \frac{4}{3}M_1 + \frac{1}{2}M_2 = \frac{5}{3}, \\ M_2 = 5. \end{cases}$$

Найдем решение методом Гаусса

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 3 \\ 1 & 8 & 3 & | & 10 \\ 0 & 0 & 1 & | & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 3 \\ 0 & 8 & 0 & | & -8 \\ 0 & 0 & 1 & | & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 3 \\ 0 & 1 & 0 & | & -1 \\ 0 & 0 & 1 & | & 5 \end{pmatrix}$$

То есть

$$M_0 = 3$$
, $M_1 = -1$, $M_2 = 5$.

У нас есть все необходимые значения для того, чтобы построить кубический сплайн, кроме x_i, x_{i-1} . По условию необходимо вычислить значение в точке x=3, она находится между узлами $x_1=2$ и $x_2=5$. Тогда кубический сплайн по формуле (2) мы будем строить на узлах x_1, x_2 .

В нашем случае формула (2) примет вид

$$S_3(x) = M_1 \frac{(x_2 - x)^3}{6h_2} + M_2 \frac{(x - x_1)^3}{6h_2} + \left(f_2 - M_2 \frac{h_2^2}{6}\right) \frac{x - x_1}{h_2} + \left(f_1 - M_1 \frac{h_2^2}{6}\right) \frac{(x_2 - x)}{h_2}, \quad x \in [x_1, x_2].$$

Подставляем все известные нам значения:

$$S_3(x) = -\frac{(5-x)^3}{18} + 5 \cdot \frac{(x-2)^3}{18} + \left(9 - 5 \cdot \frac{9}{6}\right) \frac{x-2}{3} + \left(1 + \frac{9}{6}\right) \frac{(5-x)}{3}, \quad x \in [2, 5].$$

Сделаем некоторые преобразования для упрощения формулы

$$S_3(x) = \frac{5(x-2)^3 - (5-x)^3}{18} + \frac{x-2}{2} + \frac{5(5-x)}{6}, \quad x \in [2, 5].$$

Найдем значение в точке x = 3:

$$S_3(3) = \frac{5-8}{18} + \frac{1}{2} + \frac{5 \cdot 2}{6} = 2.$$