



где мы посчитали по формулам (3)

$$x_1 = -\frac{a_1}{a_0}, \quad x_2 = -\frac{a_2}{a_1}, \quad x_3 = -\frac{a_3}{a_2}.$$

Считаем коэффициенты и корни из соотношений (2)

$$\begin{cases} a_0^{(1)} = a_0^2 = 1, \\ a_1^{(1)} = 2a_0a_2 - a_1^2 = -30, \\ a_2^{(1)} = -2a_1a_3 + a_2^2 = 129, \\ a_3^{(1)} = -a_3^2 = -100 \end{cases}$$

По формулам (3)

$$x_1^{(1)} = \sqrt{-\frac{a_1^{(1)}}{a_0^{(1)}}} \approx 5.4772, \quad x_2^{(1)} = \sqrt{-\frac{a_2^{(1)}}{a_1^{(1)}}} \approx 2.0736, \quad x_3^{(1)} = \sqrt{-\frac{a_3^{(1)}}{a_2^{(1)}}} \approx 0.8805.$$

	0	1
<b>a_0</b>	1.0000	1.0000
<b>a_1</b>	-6.0000	-30.0000
<b>a_2</b>	3.0000	129.0000
<b>a_3</b>	10.0000	-100.0000
<b>x_1</b>	6.0000	5.4772
<b>x_2</b>	0.5000	2.0736
<b>x_3</b>	-3.3333	0.8805

Вычислим погрешность. Лучше всего считать разницу для каждого корня, чтобы быть уверенными в том, что каждый корень достиг нужной точности:

$$|x_1^{(1)} - x_1^{(0)}| = 0.228 > 10^{-1}, \quad |x_2^{(1)} - x_2^{(0)}| = 1.574 > 10^{-1}, \quad |x_3^{(1)} - x_3^{(0)}| = 4.214 > 10^{-1}.$$

Далее проделываем все то же самое, аналогично случаю отыскания одного корня. Тогда в конечном итоге получается таблица вида:

	0	1	2	3
<b>a_0</b>	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
<b>a_1</b>	-6.0000	-30.0000	-642.0000	-390,882.0000
<b>a_2</b>	3.0000	129.0000	10,641.0000	100,390,881.0000
<b>a_3</b>	10.0000	-100.0000	-10,000.0000	-100,000,000.0000
<b>x_1</b>	6.0000	5.4772	5.0337	5.0004
<b>x_2</b>	0.5000	2.0736	2.0177	2.0008
<b>x_3</b>	-3.3333	0.8805	0.9846	0.9995

Таким образом, округлив, получим значения

$$x_1 \approx 5, \quad x_2 \approx 2, \quad x_3 \approx 1.$$

Но это абсолютные значения истинных корней. Далее непосредственной подстановкой необходимо выбрать, какие из значений  $x = \{-5, -2, -1, 1, 2, 5\}$  действительно являются корнями исходного уравнения.

В данном случае подходят значения

$$x = \{1, 2, 5\}.$$