

Уравнения в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель.

- Уравнение вида

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0,$$

где функции $P(x, y)$ и $Q(x, y)$ непрерывны в односвязной области (на компакте) D и $P^2 + Q^2 \neq 0$ будем называть **уравнением в полных дифференциалах (УПД)**, если на D выполняются следующие условия:

1. существует непрерывно дифференцируемая на D функция $u(x, y)$ такая, что

$$du(x, y) = P(x, y)dx + Q(x, y)dy, \quad (x, y) \in D;$$

2. функции $P(x, y)$ и $Q(x, y)$ удовлетворяют условию Эйлера:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

Также из курса математического анализа эти свойства можно называть "условиями независимости КРИ-2 от пути интегрирования".

Таким образом, мы решаем дифференциальное уравнение $du(x, y) = 0$, и его решение (общий интеграл, полное решение) имеет вид

$$u(x, y) = C.$$

Разберемся с тем, как найти это самое решение.

Первый способ. Для нахождения первообразной функции $u(x, y)$ воспользуемся известной из курса матанализа формулой

$$u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_{x_0}^x P(x, y_0)dx + \int_{y_0}^y Q(x, y)dy \quad (1)$$

или

$$u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_{x_0}^x P(x, y)dx + \int_{y_0}^y Q(x_0, y)dy. \quad (2)$$

Разница лишь в том, что при разбиении КРИ-2 на собственные интегралы точку x_0 или y_0 мы подставляем **только в один** из собственных интегралов.

Пример 1. Проверить, является ли уравнение уравнением в полных дифференциалах, найти общий интеграл и указать область D :

$$(x + y)dx + (x - y)dy = 0.$$

Решение. Пойдем по пунктам из условия.

1. Укажем множество допустимых значений D . Поскольку $P(x, y) = x + y$ непрерывна на \mathbb{R} , $Q(x, y) = x - y$ непрерывна на \mathbb{R} , то

$$D = \mathbb{R}^2 \text{ или } D = \{(x, y) \mid x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}.$$

2. Выясним, является ли наше уравнение УПД. Для этого проверим, выполняется ли условие Эйлера:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 1, \frac{\partial Q}{\partial x} = 1 \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

Таким образом, уравнение является УПД, и мы можем проинтегрировать его.

3. Найдем общее решение уравнения. Для этого воспользуемся формулами (1) или (2). В качестве x_0 и y_0 можем взять любые значения из D , т. е. любые значения из \mathbb{R}^2 . Пусть $x_0 = y_0 = 0$. Тогда по формуле (1)

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} (x+y)dx + (x-y)dy = \int_0^x xdx + \int_0^y (x-y)dy = \\ &= \int_0^x xdx + x \int_0^y dy - \int_0^y ydy = \frac{x^2}{2} \Big|_0^x + xy \Big|_0^y - \frac{y^2}{2} \Big|_0^y = \frac{x^2}{2} + xy - \frac{y^2}{2} = C. \end{aligned}$$

Последнее равенство домножим на 2 (от этого справа всё равно останется константа) и получим общее решение

$$x^2 + 2xy - y^2 = C.$$

Для того, чтобы убедиться, верно ли мы нашли общее решение уравнения, продифференцируем получившееся уравнения.

$$du(x, y) = u'_x dx + u'_y dy = (2x + 2y)dx + (2x - 2y)dy = 0.$$

Заметим, что в качестве x_0 и y_0 лучше брать как насколько это возможно минимальные числа. Но вообще можно брать любые числа из D . Например, если бы мы взяли

$$u(x, y) = \int_{(\ln 2, 0)}^{(x, y)} (x+y)dx + (x-y)dy = \frac{x^2}{2} \Big|_{\ln 2}^x + xy \Big|_0^y - \frac{y^2}{2} \Big|_0^y = \frac{x^2}{2} - \frac{\ln^2 2}{2} + xy - \frac{y^2}{2} = C.$$

В получившемся уравнении все постоянные можем перенести вправо, а затем домножить на 2. Тогда все равно получаем решение

$$x^2 + 2xy - y^2 = C.$$

Ответ: $x^2 + 2xy - y^2 = C$.

Второй способ. Для отыскания функции можно использовать соотношения

$$\frac{\partial u(x, y)}{\partial x} = u'_x = P(x, y), \quad \frac{\partial u(x, y)}{\partial y} = u'_y = Q(x, y).$$

Тогда если $\frac{\partial u(x, y)}{\partial x} = P(x, y)$, то

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y)dx + \varphi(y) = C. \quad (3)$$

Отсюда

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial y} &= \int_{x_0}^x \frac{\partial P}{\partial y} dx + \varphi'(y) = \frac{\partial u}{\partial y} = \int_{x_0}^x \frac{\partial Q}{\partial x} dx + \varphi'(y) = \\ &= Q(x, y) \Big|_{x_0}^x + \varphi'(y) = Q(x, y) - Q(x_0, y) + \varphi'(y) = Q(x, y).\end{aligned}$$

Получаем

$$\varphi'(y) = Q(x_0, y).$$

Из получившегося уравнения найдем

$$\varphi(y) = \int_{y_0}^y Q(x_0, y) dy + C.$$

Подставим его в (3) и получим

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y) dx + \int_{y_0}^y Q(x_0, y) dy = C.$$

Таким образом и выглядит алгоритм для второго способа. Он может сначала показаться сложным, однако при решении всё становится интуитивно понятно.

Замечание. Поскольку УПД имеет вид

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0,$$

то мы можем разделить все уравнение на dx и получить

$$P(x, y) + Q(x, y) \frac{dy}{dx} = P(x, y) + y' \cdot Q(x, y) = 0.$$

Аналогично УПД может иметь вид

$$x' \cdot P(x, y) + Q(x, y) = 0.$$

Независимо от вида записи, методы нахождения решения остаются неизменными.

Пример 2. Проверить, является ли уравнение уравнением в полных дифференциалах, найти общий интеграл и указать область D :

$$2x^3 + xy^2 + (x^2y + 2y^3) \cdot y' = 0.$$

Решение. Приведем уравнение к более привычному для нас виду, домножив его на dx :

$$x(2x^2 + y^2)dx + y(x^2 + 2y^2)dy = 0.$$

Снова разобьем решение уравнения на 3 этапа.

1. Найдем множество допустимых значений D . Так как $P(x, y) = x(2x^2 + y^2)$ непрерывна на \mathbb{R} и $Q(x, y) = y(x^2 + 2y^2)$ непрерывна на \mathbb{R} , то $D = \mathbb{R}^2$.
2. Проверим, является ли уравнение УПД.

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2xy, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 2xy \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

3. Найдем общее решение вторым способом и пусть $x_0 = y_0 = 0$. Возьмем

$$\frac{\partial u(x, y)}{\partial x} = P(x, y) = 2x^3 + xy^2.$$

Отсюда

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y) dx + \varphi(y) = \int_0^x (2x^3 + xy^2) dx + \varphi(y) = \frac{x^4}{2} + \frac{x^2 y^2}{2} + \varphi(y) = C. \quad (4)$$

Тогда

$$\frac{\partial u(x, y)}{\partial y} = Q(x, y) \Rightarrow \left(\frac{x^4}{2} + \frac{x^2 y^2}{2} + \varphi(y) \right)'_y = x^2 y + \varphi'(y) = x^2 y + 2y^3.$$

Следовательно, $\varphi'(y) = 2y^3$, а $\varphi(y) = \frac{y^4}{2}$. Подставим полученное $\varphi(y)$ в (4). Тогда

$$u(x, y) = \frac{x^4}{2} + \frac{x^2 y^2}{2} + \frac{y^4}{2} = C.$$

Наконец домножим последнее уравнение на 2 и получим общий интеграл исходного уравнения

$$x^4 + x^2 y^2 + y^4 = C.$$

Ответ: $x^4 + x^2 y^2 + y^4 = C$.

Уравнение вида

$$P(x)dx + Q(y)dy = 0$$

с непрерывными на D и не обращающимися в 0 одновременно функциями P и Q мы также будем считать уравнением в полных дифференциалах (иногда его еще называют **уравнением с разделенными переменными**). И его общее решение будет иметь вид

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x) dx + \int_{y_0}^y Q(y) dy = C. \quad (5)$$

Пример 3. Проверить, является ли уравнение уравнением в полных дифференциалах, найти общее решение и указать область D :

$$\frac{x dx}{1 + x^2} + \frac{dy}{y} = 0.$$

Решение.

1. Найдем множество допустимых значений. $P(x, y) = \frac{x}{1 + x^2}$ непрерывна на \mathbb{R} , $Q(x, y) = \frac{1}{y}$ непрерывна на $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ и для уточнения возьмем множество $(0; +\infty)$. Тогда

$$D = \{(x, y) \mid x \in \mathbb{R}, y > 0\}.$$

2. Так как это УПД с разделенными переменными, то очевидно, что

$$P'_y = Q'_x = 0.$$

3. Для нахождения общего решения воспользуемся формулой (5). Пусть $x_0 = 0, y_0 = 1$.

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_0^x \frac{x dx}{1+x^2} + \int_1^y \frac{dy}{y} = \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \Big|_0^x + \ln|y| \Big|_1^y = \\ &= \frac{1}{2} \ln(1+x^2) - \frac{1}{2} \ln 1 + \ln y - \ln 1 = \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + \ln y = C. \end{aligned}$$

Домножим на 2 и преобразуем

$$\ln(1+x^2) + 2 \ln y = \ln(y^2(1+x^2)) = C.$$

Ответ: $\ln(y^2(1+x^2)) = C$.

Иногда в задачах может стоять вопрос о поиске решения задачи Коши для УПД. Например, если

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0, \quad y|_{x=v} = \xi \vee x|_{y=\xi} = v,$$

то решение задачи Коши определяется формулой

$$u(x, y) = \int_{(v, \xi)}^{(x, y)} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0.$$

То есть, в отличие от общего решения, начальные точки нам уже даны и $u(x, y) = 0$ (а не $u(x, y) = C$).

Пример 4. Решить задачу Коши:

$$\frac{2x}{y^3}dx + \frac{y^2 - 3x^2}{y^4}dy = 0, \quad y|_{x=1} = 1.$$

Решение. Проверим, является ли уравнение УПД

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{6x}{y^4}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = -\frac{6x}{y^4} \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

Условие Эйлера выполняется, значит можем применить формулу (2)

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(1,1)}^{(x,y)} \frac{2x}{y^3}dx + \frac{y^2 - 3x^2}{y^4}dy = \frac{2}{y^3} \int_1^x x dx + \int_1^y \frac{dy}{y^2} - 3 \int_1^y \frac{dy}{y^4} = \\ &= \frac{x^2}{y^3} \Big|_1^x - \frac{1}{y} \Big|_1^y + \frac{1}{y^3} \Big|_1^y = \frac{x^2}{y^3} - \frac{1}{y^3} - \frac{1}{y} + 1 + \frac{1}{y^3} - 1 = \frac{x^2}{y^3} - \frac{1}{y} = 0. \end{aligned}$$

Отсюда

$$x^2 = y^2 \Rightarrow x = y.$$

Проверить, правильным ли является найденное решение, можно подстановкой начальных условий (получим $1 = 1$).

Ответ: $x = y$.

Интегрирующий множитель.

Рассмотрим уравнение

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0,$$

где функции $P(x, y)$ и $Q(x, y)$ непрерывны в односвязной области D и $P^2 + Q^2 \neq 0$. И пусть оно не является УПД.

• Непрерывную на $G \subset D$ функцию $\mu(x, y)$ будем называть **интегрирующим множителем**, если уравнение

$$\mu(x, y)P(x, y)dx + \mu(x, y)Q(x, y)dy = 0 \quad (6)$$

является уравнением в полных дифференциалах.

Выведем формулу для нахождения интегрирующего множителя. Возьмем функцию $\omega = \omega(x, y)$ такую, что $\mu(\omega)$ — интегрирующий множитель.

Если уравнение (6) является УПД, то

$$(\mu(\omega)P(x, y))'_y = (\mu(\omega)Q(x, y))'_x.$$

По формуле производной сложной функции нескольких переменных получим

$$\mu'_\omega \omega'_y P(x, y) + \mu(\omega)P'_y = \mu'_\omega \omega'_x Q(x, y) + \mu(\omega)Q'_x.$$

Отсюда

$$\frac{P'_y - Q'_x}{Q\omega'_x - P\omega'_y} = \frac{\mu'(\omega)}{\mu(\omega)} = \psi(\omega).$$

Мы получили линейное ДУ-1 (подробнее мы рассмотрим их через 1 урок)

$$\mu'(\omega) - \mu(\omega) \cdot \psi(\omega) = 0.$$

Найдем его решение

$$\mu'(\omega) - \mu(\omega) \cdot \psi(\omega) = 0 \quad \Big| \cdot e^{-\int_{\omega_0}^{\omega} \psi(\tau) d\tau}.$$

$$\mu'(\omega) \cdot e^{-\int_{\omega_0}^{\omega} \psi(\tau) d\tau} - \mu(\omega) \cdot \psi(\omega) \cdot e^{-\int_{\omega_0}^{\omega} \psi(\tau) d\tau} = 0.$$

$$\left(\mu(\omega) e^{-\int_{\omega_0}^{\omega} \psi(\tau) d\tau} \right)'_{\omega} = 0.$$

$$\mu(\omega) e^{-\int_{\omega_0}^{\omega} \psi(\tau) d\tau} = C.$$

$$\mu(\omega) = C e^{\int_{\omega_0}^{\omega} \psi(\tau) d\tau}.$$

Причем так как при подстановке C сократится, то можно записать

$$\mu(\omega) = e^{\int_{\omega_0}^{\omega} \psi(\tau) d\tau}.$$

Отсюда следует, что если $\mu(\omega)$ — интегрирующий множитель, то и $C\mu(\omega)$ также является интегрирующим множителем.

Из всех вычислений для решения задачи нам пригодятся лишь формулы (6),

$$\frac{P'_y - Q'_x}{Q\omega'_x - P\omega'_y} = \psi(\omega) \quad (7)$$

и

$$\mu(\omega) = e^{\int_{\omega_0}^{\omega} \psi(\tau) d\tau}. \quad (8)$$

Обычно функция $\omega(x, y)$ будет задана в условии, и ее не нужно подбирать.

Пример 5. Найти общее решение уравнения, найдя интегрирующий множитель указанного вида:

$$2xy \ln y dx + (x^2 + y^2 \sqrt{y^2 + 1}) dy = 0, \quad \mu = \mu(x) \quad \text{или} \quad \mu = \mu(y).$$

Решение. Проверим, является ли исходное уравнение УПД.

$$P'_y = 2x \ln y + 2x, \quad Q'_x = 2x, \quad \text{то есть} \quad P'_y \neq Q'_x.$$

Таким образом, не выполняется условие Эйлера, следовательно, мы не сможем решить данное уравнение как УПД. Найдем интегрирующий множитель для того, чтобы привести его к УПД.

В условии нам предложено взять в качестве функции ω переменные x или y . Возьмем $\omega = x$. Тогда по формуле (7) мы должны получить функцию $\psi(x)$ (функцию **одной переменной**). Причем $\omega'_x = x'_x = 1$, $\omega'_y = x'_y = 0$.

$$\frac{P'_y - Q'_x}{Q\omega'_x - P\omega'_y} = \frac{P'_y - Q'_x}{Q} = \frac{2x \ln y + 2x - 2x}{x^2 + y^2 \sqrt{y^2 + 1}} = \psi(x, y) \neq \psi(x).$$

Мы получили несоответствие. Значит подстановка $\omega = x$ не подходит нам. Попробуем взять $\omega = y$, и получить мы должны функцию $\psi(y)$. Тогда

$$\frac{P'_y - Q'_x}{Q\omega'_x - P\omega'_y} = \frac{P'_y - Q'_x}{-P} = \frac{2x \ln y + 2x - 2x}{-2xy \ln y} = -\frac{2x \ln y}{2xy \ln y} = -\frac{1}{y} = \psi(y).$$

Теперь мы можем применить формулу (8) для нахождения интегрирующего множителя

$$\mu(\omega) = e^{\int_{\omega_0}^{\omega} \psi(\tau) d\tau} = e^{-\int_{y_0}^y \frac{d\tau}{\tau}} = e^{-(\ln y - \ln y_0)} = e^{-\ln \frac{y}{y_0}} = -\frac{y_0}{y}.$$

Так как $\mu(y) = -\frac{y_0}{y}$ — интегрирующий множитель, то функция $\mu(y) = \frac{1}{y}$ также будет являться интегрирующим множителем.

Воспользуемся формулой (6), то есть домножим исходное уравнение на $\mu(y)$

$$2x \ln y dx + \left(\frac{x^2}{y} + y \sqrt{y^2 + 1} \right) dy = 0.$$

Данное уравнение является УПД. Убедимся в этом:

$$P'_y = 2x/y, \quad Q'_x = 2x/y, \quad \text{то есть} \quad P'_y = Q'_x.$$

А УПД мы уже научились решать. Возьмем $x_0 = 0$ и $y_0 = 1$. Тогда

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(0,1)}^{(x,y)} 2x \ln y dx + \left(\frac{x^2}{y} + y\sqrt{y^2+1} \right) dy = 2 \ln y \int_0^x x dx + \int_1^y y\sqrt{y^2+1} dy = \\ &= 2 \ln y \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^x + \frac{1}{2} \int_1^y (y^2+1)^{\frac{1}{2}} d(y^2+1) = x^2 \ln y + \frac{1}{3} (y^2+1)^{\frac{3}{2}} \Big|_1^y = x^2 \ln y + \frac{1}{3} (y^2+1)^{\frac{3}{2}} - \frac{2^{\frac{3}{2}}}{3} = C. \end{aligned}$$

Перенесем последнее слагаемое к константе, а затем домножим всё уравнение на 3 и получим общее решение

$$3x^2 \ln y + (y^2 + 1)^{\frac{3}{2}} = C.$$

Ответ: $3x^2 \ln y + (y^2 + 1)^{\frac{3}{2}} = C$.