

<p>PCA (empirical) (max using lagrange)</p> $\sigma_v^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\pi(x_i - g))^T (\pi(x_i - g))$ $= \frac{1}{(n-1)} \sum_{i=1}^n (\mathbf{x}_i - \mathbf{g})^T \mathbf{v} \mathbf{v}^T (\mathbf{x}_i - \mathbf{g}) = \mathbf{v}^T \Sigma \mathbf{v}$ <p>$\max_{\mathbf{v}} (\mathbf{v}^T \Sigma \mathbf{v})$ subject to $(\mathbf{v}^T \mathbf{v} = 1)$ and $(\mathbf{v}^T \mathbf{v}_1 = 0)$</p> $\mathcal{L} = \mathbf{v}^T \Sigma \mathbf{v} + \lambda (1 - \mathbf{v}^T \mathbf{v}_1) \quad \partial_{\mathbf{v}} \mathcal{L} = 0 \quad \Sigma \mathbf{v} = \lambda \mathbf{v}$ $\pi = wv^T \quad \mathbf{v}^T \mathbf{v} = 1 \quad \text{Eigenvalues = variance proj.}$ <p>$\tilde{z}_{x1} = u_{x1}^T (x_k - g_x)$</p> <p>PCA (mathematical) (max using lagrange)</p> $var(y) = E[(y - E[y])^2]$ $E[y] = E[v^T x] = v^T E[x] = v^T g$ $var(y) = v^T E[(x - g)(x - g)^T] v$ $\max_{\mathbf{v}} (\mathbf{v}^T S \mathbf{v}) \text{ subject to } (\mathbf{v}^T v = 1)$ $\hat{S} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - g)(x_i - g)^T \approx \Sigma$ $\text{tr}(\Sigma) = \sum_{i=1}^n \lambda_i = \sigma_v^2$ <p>Variance expliquée = $\sum_{i=1}^k \lambda_i = \frac{\sum_{i=1}^k \lambda_i}{\sigma_v^2}$</p> <p>On assigne alors l'observation à la classe k si la distance entre les observations et le centre de la classe k est minimale. Cette séparation est linéaire (hyperplane) car Σ est identique pour toutes les classes.</p> <p>Intuition : même dans l'espace projecté, les observations de chaque classe forment des "mânes" passant par leur barycentre. Pour classifier une nouvelle observation, on ne regarde pas simplement sa distance au centre mais sa distance de Mahalanobis, qui prend en compte la dispersion des observations.</p>	<p>DA</p> $\sigma_{xy}^2 = \sum_{i \in C(k)} \ x_i - g(k)\ ^2 \quad \Sigma_{xx} = E[(x - g_x)(x - g_x)^T] \quad \Sigma_{yy} = E[(y - g_y)(y - g_y)^T]$ $\Sigma_{xy} = \sum_{i \in C(k)} (x_i - g(k))(x_i - g(k))^T \quad \Sigma_{yy} = \sum_{i \in C(k)} (y_i - g_y)(y_i - g_y)^T$ $\Sigma^{-1} Bv = \lambda v \quad \Sigma^{-1} Bv = \lambda v$ $\sigma_{xy}^2 = \frac{1}{n(k)} \sum_{i \in C(k)} (x_i - g(k))(x_i - g(k))^T \quad \Sigma_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - g_x)(x_i - g_x)^T \quad \Sigma_{yy} = \sum_{i=1}^n (y_i - g_y)(y_i - g_y)^T$ $\Sigma^{-1} Bv = \lambda v \quad \Sigma^{-1} Bv = \lambda v$ $\sigma_{xy}^2 = \frac{1}{n(k)} \sum_{i \in C(k)} (x_i - g(k))(x_i - g(k))^T \quad \Sigma_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - g_x)(x_i - g_x)^T \quad \Sigma_{yy} = \sum_{i=1}^n (y_i - g_y)(y_i - g_y)^T$ $\Sigma^{-1} Bv = \lambda v \quad \Sigma^{-1} Bv = \lambda v$ $\sigma_{xy}^2 = \frac{1}{n(k)} \sum_{i \in C(k)} (x_i - g(k))(x_i - g(k))^T \quad \Sigma_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - g_x)(x_i - g_x)^T \quad \Sigma_{yy} = \sum_{i=1}^n (y_i - g_y)(y_i - g_y)^T$ $\Sigma^{-1} Bv = \lambda v \quad \Sigma^{-1} Bv = \lambda v$ $\sigma_{xy}^2 = \frac{1}{n(k)} \sum_{i \in C(k)} (x_i - g(k))(x_i - g(k))^T \quad \Sigma_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - g_x)(x_i - g_x)^T \quad \Sigma_{yy} = \sum_{i=1}^n (y_i - g_y)(y_i - g_y)^T$ $\Sigma^{-1} Bv = \lambda v \quad \Sigma^{-1} Bv = \lambda v$ $\sigma_{xy}^2 = \frac{1}{n(k)} \sum_{i \in C(k)} (x_i - g(k))(x_i - g(k))^T \quad \Sigma_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - g_x)(x_i - g_x)^T \quad \Sigma_{yy} = \sum_{i=1}^n (y_i - g_y)(y_i - g_y)^T$ $\Sigma^{-1} Bv = \lambda v \quad \Sigma^{-1} Bv = \lambda v$ $\sigma_{xy}^2 = \frac{1}{n(k)} \sum_{i \in C(k)} (x_i - g(k))(x_i - g(k))^T \quad \Sigma_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - g_x)(x_i - g_x)^T \quad \Sigma_{yy} = \sum_{i=1}^n (y_i - g_y)(y_i - g_y)^T$ $\Sigma^{-1} Bv = \lambda v \quad \Sigma^{-1} Bv = \lambda v$ $\sigma_{xy}^2 = \frac{1}{n(k)} \sum_{i \in C(k)} (x_i - g(k))(x_i - g(k))^T \quad \Sigma_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - g_x)(x_i - g_x)^T \quad \Sigma_{yy} = \sum_{i=1}^n (y_i - g_y)(y_i - g_y)^T$ $\Sigma^{-1} Bv = \lambda v \quad \Sigma^{-1} Bv = \lambda v$ $\sigma_{xy}^2 = \frac{1}{n(k)} \sum_{i \in C(k)} (x_i - g(k))(x_i - g(k))^T \quad \Sigma_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - g_x)(x_i - g_x)^T \quad \Sigma_{yy} = \sum_{i=1}^n (y_i - g_y)(y_i - g_y)^T$ $\Sigma^{-1} Bv = \lambda v \quad \Sigma^{-1} Bv = \lambda v$ $\sigma_{xy}^2 = \frac{1}{n(k)} \sum_{i \in C(k)} (x_i - g(k))(x_i - g(k))^T \quad \Sigma_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - g_x)(x_i - g_x)^T \quad \Sigma_{yy} = \sum_{i=1}^n (y_i - g_y)(y_i - g_y)^T$ $\Sigma^{-1} Bv = \lambda v \quad \Sigma^{-1} Bv = \lambda v$ $\sigma_{xy}^2 = \frac{1}{n(k)} \sum_{i \in C(k)} (x_i - g(k))(x_i - g(k))^T \quad \Sigma_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - g_x)(x_i - g_x)^T \quad \Sigma_{yy} = \sum_{i=1}^n (y_i - g_y)(y_i - g_y)^T$ $\Sigma^{-1} Bv = \lambda v \quad \Sigma^{-1} Bv = \lambda v$ $\sigma_{xy}^2 = \frac{1}{n(k)} \sum_{i \in C(k)} (x_i - g(k))(x_i - g(k))^T \quad \Sigma_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - g_x)(x_i - g_x)^T \quad \Sigma_{yy} = \sum_{i=1}^n (y_i - g_y)(y_i - g_y)^T$ $\Sigma^{-1} Bv = \lambda v \quad \Sigma^{-1} Bv = \lambda v$ $\sigma_{xy}^2 = \frac{1}{n(k)} \sum_{i \in C(k)} (x_i - g(k))(x_i - g(k))^T \quad \Sigma_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - g_x)(x_i - g_x)^T \quad \Sigma_{yy} = \sum_{i=1}^n (y_i - g_y)(y_i - g_y)^T$ $\Sigma^{-1} Bv = \lambda v \quad \Sigma^{-1} Bv = \lambda v$ $\sigma_{xy}^2 = \frac{1}{n(k)} \sum_{i \in C(k)} (x_i - g(k))(x_i - g(k))^T \quad \Sigma_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - g_x)(x_i - g_x)^T \quad \Sigma_{yy} = \sum_{i=1}^n (y_i - g_y)(y_i - g_y)^T$ $\Sigma^{-1} Bv = \lambda v \quad \Sigma^{-1} Bv = \lambda v$ $\sigma_{xy}^2 = \frac{1}{n(k)} \sum_{i \in C(k)} (x_i - g(k))(x_i - g(k))^T \quad \Sigma_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - g_x)(x_i - g_x)^T \quad \Sigma_{yy} = \sum_{i=1}^n (y_i - g_y)(y_i - g_y)^T$ $\Sigma^{-1} Bv = \lambda v \quad \Sigma^{-1} Bv = \lambda v$ $\sigma_{xy}^2 = \frac{1}{n(k)} \sum_{i \in C(k)} (x_i - g(k))(x_i - g(k))^T \quad \Sigma_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - g_x)(x_i - g_x)^T \quad \Sigma_{yy} = \sum_{i=1}^n (y_i - g_y)(y_i - g_y)^T$ $\Sigma^{-1} Bv = \lambda v \quad \Sigma^{-1} Bv = \lambda v$ $\sigma_{xy}^2 = \frac{1}{n(k)} \sum_{i \in C(k)} (x_i - g(k))(x_i - g(k))^T \quad \Sigma_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - g_x)(x_i - g_x)^T \quad \Sigma_{yy} = \sum_{i=1}^n (y_i - g_y)(y_i - g_y)^T$ $\Sigma^{-1} Bv = \lambda v \quad \Sigma^{-1} Bv = \lambda v$ $\sigma_{xy}^2 = \frac{1}{n(k)} \sum_{i \in C(k)} (x_i - g(k))(x_i - g(k))^T \quad \Sigma_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - g_x)(x_i - g_x)^T \quad \Sigma_{yy} = \sum_{i=1}^n (y_i - g_y)(y_i - g_y)^T$ $\Sigma^{-1} Bv = \lambda v \quad \Sigma^{-1} Bv = \lambda v$ $\sigma_{xy}^2 = \frac{1}{n(k)} \sum_{i \in C(k)} (x_i - g(k))(x_i - g(k))^T \quad \Sigma_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - g_x)(x_i - g_x)^T \quad \Sigma_{yy} = \sum_{i=1}^n (y_i - g_y)(y_i - g_y)^T$ $\Sigma^{-1} Bv = \lambda v \quad \Sigma^{-1} Bv = \lambda v$ $\sigma_{xy}^2 = \frac{1}{n(k)} \sum_{i \in C(k)} (x_i - g(k))(x_i - g(k))^T \quad \Sigma_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - g_x)(x_i - g_x)^T \quad \Sigma_{yy} = \sum_{i=1}^n (y_i - g_y)(y_i - g_y)^T$ $\Sigma^{-1} Bv = \lambda v \quad \Sigma^{-1} Bv = \lambda v$ $\sigma_{xy}^2 = \frac{1}{n(k)} \sum_{i \in C(k)} (x_i - g(k))(x_i - g(k))^T \quad \Sigma_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - g_x)(x_i - g_x)^T \quad \Sigma_{yy} = \sum_{i=1}^n (y_i - g_y)(y_i - g_y)^T$ $\Sigma^{-1} Bv = \lambda v \quad \Sigma^{-1} Bv = \lambda v$ $\sigma_{xy}^2 = \frac{1}{n(k)} \sum_{i \in C(k)} (x_i - g(k))(x_i - g(k))^T \quad \Sigma_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - g_x)(x_i - g_x)^T \quad \Sigma_{yy} = \sum_{i=1}^n (y_i - g_y)(y_i - g_y)^T$ $\Sigma^{-1} Bv = \lambda v \quad \Sigma^{-1} B$
---	--