# Informovaný souhlas pacienta s poskytnutím zdravotních služeb

podle § 28 až 42 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách EDUKACE PACIENTA

# KOLONOSKOPIE (s případnou polypektomií)

Pracoviště: Zdravotnické zařízení:

GS – Gastro, s.r.o. IČO: 05187311 Nová poliklinika Zbraslav Elišky Přemyslovny 1235 156 00 Praha 5 – Zbraslav

tel: 257 211 688

# Jméno a příjmení pacienta:

Datum narození:

#### Informace o výkonu:

Kolonoskopie je vyšetření tlustého střeva k vyloučení patologického nálezu za použití kolonoskopu, což je tenký ohebný dlouhý přístroj umožňující zobrazení vyšetřované oblasti. Při podezření na patologický nález je možné prostřednictvím tohoto přístroje odebrat malé kousky tkáně střeva na mikroskopické vyšetření. Odběr vzorků je nebolestivý. Pokud se při vyšetření nalezne polyp, bude (pokud to okolnosti dovolí) provedena polypektomie, což je odstranění polypu polypektomickou kličkou. Polypektomie je také nebolestivá.

V současné době neexistuje alternativní výkon, kdy by bylo možno vyšetřit konečník a tlusté střevo, odebrat vzorky podezřelých tkání a případně léčebně zasáhnout v rámci jednoho zdravotního výkonu.

### Příprava před vyšetřením:

Příprava před tímto vyšetřením je náročnější, protože tlusté střevo musí být před zákrokem bez obsahu. Je nutný dostatečný přívod tekutin.

**Nejméně 5 dní před výkonem musíte držet bezezbytkovou dietu**, což znamená: vynechat z potravy ovoce a zeleninu, která obsahuje slupky, zrníčka nebo pecky (např. jahody, hrozny, rajčata, papriky, melouny, kiwi), celozrnné pečivo, kmín a mák.

#### Dva dny před vyšetřením kašovitá strava.

Den před vyšetřením je nutné dodržet pouze tekutou stravu a vypít dostatek tekutin. Můžete pít vše kromě mléka, zrnkové kávy a alkoholu. Pijte tedy vodu, čiré přecezené vývary, čaje, šťávy, sirupy, rozpustnou kávu, džusy bez dužiny a minerálky.

# Postup očištění střeva pomocí projímadla PICOPREP v dopoledním čase výkonu:

Den před vyšetřením: v 16:00hod nasypete obsah 1 sáčku do 150ml studené vody. Míchejte 2 - 3 minuty, než se prášek zcela rozpustí. Vznikne bílý, téměř zakalený roztok s citrónovou vůní. Jakmile je roztok připraven, ihned jej vypijte.Po dopití vyprazdňovacího roztoku je nutné v průběhu dvou hodin vypít ještě 1 ½ - 2 litry čisté tekutiny.

Den před vyšetřením: ve 21:00hod celý tento postup zopakujete.

# Postup očištění střeva pomocí projímadla PICOPREP v odpoledním čase výkonu:

Den před vyšetřením jeden sáček ve 22:00hod a druhý sáček v den vyšetření v 06:00hod. Celý postup ředění projímadla a pití tekutin stejný!

Tekutiny můžete pít bez omezení i v den vyšetření. Ráno před vyšetřením můžete zapít ranní léky a nekuřte.

# S sebou je vhodné si vzít pití, svačinu a doprovod

### Popis vyšetření:

Těsně před začátkem výkonu vám zpravidla bude podána premedikace (pro uklidnění a relaxaci) do žilního systému. V poloze na levém boku vám bude zaveden endoskopický přístroj do konečníku, dále do tlustého střeva, popř. i na začátek tenkého střeva. Pocítíte napětí a tlaky ve střevě při jeho nafukování, což je nezbytné pro dobrou viditelnost při vyšetření. Tyto obtíže jsou běžné a brzy pominou. Vyšetření trvá zhruba 10-30 min.

### Po vyšetření:

Neopouštějte čekárnu po dobu 1 hodiny po vyšetření (tedy po dobu působení premedikace) a dále se řiďte radami vyšetřujícího lékaře. Pokud vám byla podána premedikace na uklidnění, vyvarujte se na 24 hodin řízení dopravních prostředků a jiných činností, které vyžadují pozornost.

### Rizika vyšetření:

Kolonoskopie může vést k některým komplikacím, např. k alergické reakci na podaný lék, perforaci střeva či krvácení. Tyto komplikace jsou zcela výjimečné, ale mohou vyžadovat akutní léčbu nebo dokonce operaci. Odběr vzorku tkáně a operační odstranění polypů vede pouze k malému krvácení, pokud ovšem netrpíte zvláštním sklonem ke krvácení. Abychom snížili riziko většího krvácení nebo alergické reakce, případně jiné komplikace na minimum zodpovězte prosím následující otázky

Vyskytuje se u vás či člena vaší rodiny zvýšený sklon ke krvácení již při malých poraněních?

 ANO - NE

 Trpíte nějakou alergií? Pokud ano, napište jakou.

 Máte kardiostimulátor, nějaké potíže se srdcem nebo astma?
 Užíváte léky, které snižují srážlivost krve?
 Máte nějaké jiné závažné onemocnění? Pokud ano, napište jaké.

V případě komplikací po kolonoskopii či polypektomii (např. prudká bolest v břiše, krvácení z konečníku, černá stolice) kontaktujte nejbližší chirurgické oddělení

# Prohlášení pacienta / zákonného zástupce:

Tímto prohlašuji, že:

- jsem byl/a ze strany výše uvedeného zdravotnického zařízení srozumitelným způsobem informován/a o výše uvedeném zdravotním výkonu – kolonoskopii (s případnou polypektomií)
- jsem byl/a informován/a o účelu, povaze a předpokládaném přínosu této zdravotní péče indikujícím lékařem
- jsem byl/a informován/a o případných alternativách indikujícím lékařem
- jsem byl/a informován/a o možných důsledcích a rizicích navrhované zdravotní péče
- mně bylo umožněno klást doplňující otázky
- jsem nic nezamlčel/a o svém zdravotním stavu / zdravotním stavu osoby mnou zastoupené
- jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl/a a výslovně souhlasím s provedením zdravotního výkonu
- kolonoskopie, odběrem vzorků a s případným léčebným zákrokem
  - v případě výskytu neočekávaných komplikací, souhlasím s tím, aby byly provedeny veškeré potřebné postupy k záchraně mého života nebo zdraví / záchraně života nebo zdraví osoby mnou zastoupené

Poučení jsem porozuměl/a, nemám již žádné otázky a s poskytnutím navržené zdravotní péče uděluji svůj souhlas.

V Praze dne:	
podpis pacienta (zástupce)	razítko zdravotnického zařízení podpis lékaře, který vyšetření provedl