

1.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{n} \left(\sqrt{\frac{1}{n}} + \sqrt{\frac{2}{n}} + \dots + \sqrt{\frac{n}{n}} \right) \right]$$

2.

$$f(x) = \int_{\pi}^x \sin(\sqrt{s^2 + 4}) \, ds$$

$$u = \sqrt{s^2 + 4}$$

$$u^2 = s^2 + 4$$

$$2u \, du = 2s \, ds$$

$$u \, du = s \, ds$$

$$ds = \frac{u}{s} \, du$$

$$f(x) = \frac{1}{s} \int_{\sqrt{\pi^2 + 4}}^{\sqrt{x^2 + 4}} \frac{\sin(u)}{u} \, du$$

3. (a)

$$\frac{dy}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}$$

$$e^{2x+3y} = x^2 - \ln(xy^3)$$

$$\frac{d}{dx} (e^{2x+3y}) = \frac{d}{dx} (x^2 - \ln(xy^3))$$

$$e^{2x+3y} \left(2 + 3 \frac{dy}{dx} \right) = 2x - \frac{1}{xy^3} \left(y^3 + 3xy^2 \frac{dy}{dx} \right)$$

$$2e^{2x+3y} + 3(e^{2x+3y}) \frac{dy}{dx} = 2x - \frac{1}{x} + \frac{3}{y} \frac{dy}{dx}$$

$$3(e^{2x+3y}) \frac{dy}{dx} - \frac{3}{y} \frac{dy}{dx} = 2x - \frac{1}{x} - 2e^{2x+3y}$$

$$\frac{dy}{dx} \left(3(e^{2x+3y}) - \frac{3}{y} \right) = 2x - \frac{1}{x} - 2e^{2x+3y}$$

4.

$$f(x) = x^2$$

$$g(x) = -x^2 + 8$$

$$x^2 = -x^2 + 8 \implies x = \pm 2 \implies -2 < x < 2$$

$$y = x^2 \implies x = \sqrt{y} = f(y)$$

$$y = -x^2 + 8 \implies x = \sqrt{8 - y} = g(y)$$

$$V = \pi \int_{-2}^2 [f(y)^2 - g(y)^2] dy$$

$$V = \pi \int_{-2}^2 (y - 8 + y) dy$$

$$V = \pi \int_{-2}^2 (2y - 8) dy$$

$$V = y^2 \Big|_{-2}^2 - 8y \Big|_{-2}^2$$

$$V = 2^2 - (-2)^2 - 8(2 - (-2))$$

$$V = -32\pi$$

$$V = \pi \int_{-2}^2 (8 - y - y) dy$$

$$V = \pi \int_{-2}^2 (8 - 2y) dy$$

$$V = 32\pi$$

5.

$$\int_{-1}^1 \arctan(x)$$

$$\int u dv = uv - \int v du$$

$$u = \arctan(x)$$

$$du = \frac{1}{x^2 + 1} dx$$

$$dv = dx$$

$$v = x$$

$$x \arctan(x) - \int_{-1}^1 x \frac{1}{x^2 + 1} dx$$

$$u = x^2 + 1$$

$$du = 2x dx$$

$$\frac{du}{2} = x dx$$

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{u} du = \ln|u| = \ln|1 + x^2|$$

$$\int_{-1}^1 x \frac{1}{x^2 + 1} dx = \frac{\ln|1 + x^2|}{2}$$

$$\left(x \arctan(x) - \frac{\ln|1 + x^2|}{2} \right) \Big|_{-1}^1$$

$$\arctan(-1) - \frac{\ln(2)}{2} - \arctan(1) + \frac{\ln(2)}{2}$$

$$\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4}$$

$$\int_{-1}^1 \arctan(x) = 0$$

6.

$$x(x^2 - 1) = 0 \implies (x_1, x_2, x_3) = (-1, 0, 1)$$

$$A = \int_{-1}^0 (x^3 - x) dx + \int_0^1 (x^3 - x) dx$$

$$\int (x^3 - x) dx = \frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2}$$

$$\left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_{-1}^0$$

$$= \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}$$

$$\left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^1$$

$$0 - \left(-\frac{1}{4} \right) = \frac{1}{4}$$

$$A = -\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 0$$

$$V = \pi \int_{-1}^0 (x^3 - x)^2 dx + \pi \int_0^1 (x^3 - x)^2 dx$$

$$\int (x^3 - x)^2 dx$$

$$\int x^2(x^2 - 1)^2 dx$$

$$\int x^2(x^4 - 2x^2 + 1) dx$$

$$\int (x^6 - 2x^4 + x^2) dx$$

$$\frac{x^7}{7} - \frac{2x^5}{5} + \frac{x^3}{3} \Big|_{-1}^0$$

$$-\frac{1}{7} + \frac{2}{5} - \frac{1}{3}$$

$$\frac{x^7}{7} - \frac{2x^5}{5} + \frac{x^3}{3} \Big|_0^1$$

$$\frac{1}{7} - \frac{2}{5} + \frac{1}{3}$$

$$V = -\frac{\pi}{7} + \frac{2\pi}{5} + \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{7} - \frac{2\pi}{5} + \frac{\pi}{3}$$

$$V = 0$$

7.

$$\frac{dC}{dt} = 5 + 10te^{-t^2}$$

$$dC = 5 + 10te^{-t^2} dt$$

$$C = \int 5 + 10te^{-t^2} dt$$

$$C = 5t + 10 \int te^{-t^2} dt$$

$$u = -t^2$$

$$du = -2t dt \implies -\frac{1}{2} du = t dt$$

$$\int te^{-t^2} dt = -\frac{1}{2} \int e^u du$$

$$= -\frac{1}{2} e^u = -\frac{1}{2} e^{-t^2}$$

$$C = 5t + 10 \left(-\frac{1}{2} e^{-t^2} \right)$$

$$C = 5t - 5e^{-t^2}$$