



إرشادات الصناعة فيما يتعلق بكوفيد-19 مؤسسات التعليم العالي

30 سبتمبر 2020

covid19.ca.gov



نظرة عامة

تهدف الإرشادات والاعتبارات التالية إلى مساعدة مؤسسات التعليم العالي (IHE) ومجتمعاتها على التخطيط والاستعداد لاستئناف التعليم الشخصي.

هذه الإرشادات مؤقتة. تستند هذه الإرشادات والاعتبارات إلى أفضل بيانات الصحة العامة المتاحة في هذا الوقت، وأفضل الممارسات الدولية المستخدمة حاليًا، والحقائق العملية لإدارة العمليات؛ سيتم تحديث الإرشادات مع ظهور بيانات وممارسات جديدة. بالإضافة إلى ذلك، لا تعكس الإرشادات والاعتبارات النطاق الكامل للمشكلات التي ستحتاج مؤسسات التعليم العالي إلى معالجتها.

سيعتمد تنفيذ هذه الإرشادات كجزء من إعادة الفتح المرحلي على الظروف المحلية بما في ذلك الاتجاهات الوبائية (مثل حالة كوفيد-19 الجديدة ومعدلات دخول المستشفى المستقرة أو المتناقصة على نحو متسق على مدار 14 يومًا على الأقل)، وتوافر مؤسسات التعليم العالي وقدرة الصحة العامة على الاستجابة للتحقيقات في الحالات والتفشي. يجب اتخاذ جميع القرارات المتعلقة باتباع هذه الإرشادات بالتعاون مع مسؤولي الصحة العامة المحليين والسلطات الأخرى.

يجب أن يكون تنفيذ هذه الإرشادات مصمم خصيصًا لكل مكان، بما في ذلك الاعتبار الكافي للبرامج العاملة في كل مؤسسة واحتياجات الطلاب والعاملين. يجب على المسؤولين إشراك أصحاب المصلحة المعنيين - بما في ذلك الطلاب وأسر هم والموظفين وشركاء العمل في مجتمع المدرسة - لصياغة وتنفيذ الخطط.

لا تهدف الإرشادات إلى إبطال أو إلغاء أي حقوق للعاملين، سواءً كانت قانونية أو تنظيمية أو تم التفاوض عليها جماعيًا، وهي ليست شاملة، لأنها لا تتضمن أوامر الصحة العامة المحلية، كما أنها ليست بديلاً عن أي متطلبات تنظيمية حالية متعلقة بالسلامة والصحة مثل تلك الخاصة بإدارة السلامة والصحة المهنية في ولاية كاليفورنيا (Cal/OSHA). يجب أن ظل مؤسسات التعليم العالي على اطلاع دائم بالتغييرات التي تطرأ على إرشادات الصحة العامة وأوامر الولاية/الأوامر المحلية، مع تطور حالة كوفيد-1.19 على وجه الخصوص:

- توفر إدارة السلامة والصحة المهنية في ولاية كاليفورنيا إرشادات أكثر شمولاً لحماية العمال في الإرشادات العامة المؤقتة بشأن حماية العمال التي أصدرتها إدارة السلامة والصحة المهنية في ولاية كاليفورنيا من صفحة الويب الخاصة بكوفيد-19.
 - لدى إدارة الصحة العامة في ولاية كاليفورنيا وإدارة السلامة والصحة المهنية في ولاية كاليفورنيا إرشادات إضافية ذات صلة لمؤسسات التعليم العالى بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مرافق اللياقة البدنية وتجارة التجزئة ورعاية الأطفال.

أخيرًا، أثناء تنفيذ هذه الإرشادات، يجب على المؤسسات تقييم وتخفيف أي مشكلات تتعلق بالإنصاف والوصول قد تنشأ في استئناف التعليم الشخصي.

الاستخدام المطلوب لأغطية الوجه

في 18 يونيو، أصدرت إدارة الصحة العامة في ولاية كاليفورنيا (CDPH) إرشادات حول استخدام أغطية الوجه، والتي تتطلب على نطاق واسع استخدام أغطية الوجه لكل من أفراد الجمهور والعاملين في جميع الأماكن العامة وأماكن العمل حيث يوجد خطر كبير من التعرض.

يجب على الأشخاص في كاليفورنيا ارتداء أغطية الوجه عندما يكونوا في المواقف عالية المخاطر المدرجة أدناه:

- داخل أو في طابور للدخول إلى أي مكان عام داخلي؛ 2
- الحصول على خدمات من قطاع الرعاية الصحية في أماكن تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، مستشفى أو صيدلية أو عيادة طبية أو مختبر أو طبيب أو مكتب لعلاج الأسنان أو عيادة بيطرية أو بنك دم؛ 3
- الانتظار أو الركوب في وسائل النقل العام أو النقل المجتمعي أو أثناء التواجد في سيارة أجرة أو خدمة سيارات خاصة أو الركوب المشترك للمركبة؛
 - المشاركة في العمل، سواء في مكان العمل أو العمل خارج الموقع، عند:
 - التعامل بصفة شخصية مع أي عضو من الجمهور
 - العمل في أي مساحة يزور ها أفراد الجمهور، بصرف النظر عما إذا كان هناك أي شخص من الجمهور موجودًا في ذلك الوقت؛
 - العمل في أي مكان يتم فيه إعداد الطعام أو تعبئته للبيع أو التوزيع على الآخرين؛
 - العمل في المناطق المشتركة أو المشي فيها، مثل الممرات والسلالم والمصاعد ومرافق وقوف السيارات؛
 - في أي غرفة أو منطقة مغلقة حيث يتواجد أشخاص آخرون (باستثناء أفراد أسرة الشخص أو إقامتهم) عند عدم القدرة
 على تنفيذ التباعد الاجتماعي؛
 - قيادة أو تشغيل أي وسيلة نقل عامة أو مركبة نقل مجتمعي أو سيارة أجرة أو خدمة مركبة خاصة أو الركوب المشترك للمركبات عند تواجد الركاب. في حالة عدم وجود ركاب، يوصى بشدة بارتداء أغطية الوجه.
 - الأماكن المفتوحة في الأماكن العامة عندما يكون من غير الممكن الحفاظ على التباعد الاجتماعي بستة أقدام عن الأشخاص الآخرين.

تحدد وثيقة إرشادات إدارة الصحة العامة في ولاية كاليفورنيا (CDPH) أيضًا الأفراد المستثنين من ارتداء غطاء الوجه، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأشخاص الذين يعانون من حالة طبية أو حالة صحية عقلية أو إعاقة تمنع ارتداء غطاء الوجه والأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع أو التواصل مع أشخاص ضعاف السمع، حيث تكون القدرة على رؤية الفم ضرورية للتواصل.

يمكن العثور على التفاصيل الكاملة، بما في ذلك جميع المتطلبات والاستثناءات الخاصة بهذه القواعد، في الإرشادات نحث بشدة على ارتداء أغطية الوجه في الوفاء بالتزامهم بتزويد العمال ارتداء أغطية الوجه في الوفاء بالتزامهم بتزويد العمال بمكان عمل آمن وصحي. يجب على أصحاب العمل توفير أغطية للوجه للعمال أو تعويض العمال عن التكلفة المعقولة للحصول عليها.

يجب على أصحاب العمل وضع سياسة إقامة لأي عامل يستوفي أحد الاستثناءات من ارتداء غطاء الوجه. إذا كان العامل الذي سيُطلب منه بخلاف ذلك ارتداء غطاء للوجه بسبب الاتصال المتكرر بالآخرين لا يستطيع ارتداء غطاء بسبب حالة طبية، فيجب تزويد العامل ببديل غير مقيد، مثل واقي للوجه مزود بغطاء متصلة بالحافة السفلية إن أمكن وإذا سمحت الحالة الطبية بذلك.

يجب أن تكون الشركات المفتوحة للجمهور على دراية باستثناءات ارتداء أغطية الوجه في <u>إرشادات تغطية وجه الخاصة بإدارة الصحة</u> العامة في ولاية كاليفورنيا (CDPH) ولا يجوز أن تستبعد أي فرد من الجمهور لا يرتدي غطاء وجه إذا كان هذا الشخص يمتثل للإرشادات .سوف تحتاج الشركات إلى وضع سياسات للتعامل مع هذه الاستثناءات بين الزبائن والعملاء والزوار والعمال.

يجب أن تطلب مؤسسات التعليم العالي وتعزز استخدام أغطية الوجه بين الطلاب بما يتماشى مع متطلبات العمال وأفراد الجمهور، بما في ذلك الاستثناءات من متطلبات الأشخاص الذين يعانون من حالة طبية أو حالة صحية عقلية أو إعاقة تمنع ارتداء غطاء الوجه، وللأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع أو الذين يتواصلون مع الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع. خلال الفصول الدراسية الشخصية، يمكن للمدرسين في قاعة المحاضرات الذين يحافظون على مسافة ستة أقدام أو أكثر ارتداء واقي للوجه مزود بغطاء. يعمل مكتب خدمات الطوارئ (CalOES) التابع لحاكم ولاية كاليفورنيا وإدارة الصحة العامة في ولاية كاليفورنيا على دعم شراء أغطية الوجه وتوزيعها. يمكن العثور على معلومات إضافية هنا . تم تحديد المجالات التالية على أنها قضايا شاملة يجب معالجتها في تخطيط إعادة تسكين الحرم الجامعي.

1. خطة الوقاية من كوفيد-19 وضع خطة مكتوبة للوقاية من كوفيد-19 خ

- وضع خطة مكتوبة للوقاية من كوفيد-19 خاصة بكل مبنى، وإجراء تقييم شامل للمخاطر لجميع مجالات العمل وجميع مهام العمل ونشاطات الطلاب المشتركة، مع تخصيص شخص في كل مبنى لتطبيق الخطة. ينبغي اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بخطط IHE المخصصة بالتعاون مع مسؤولي الصحة العامة المحليين والسلطات الأخرى.
- دمج إرشادات إدارة الصحة العامة في ولاية كاليفورنيا لاستخدام أغطية الوجه، في خطة خاصة بمكان العمل
 تتضمن سياسة للتعامل مع الاستثناءات.
- تحديد معلومات الاتصال الخاصة بإدارة الصحة المحلية حيث يوجد المرفق لتوصيل معلومات حول تفشي كوفيد-19 بين الطلاب والعمال.
 - تدريب العمال والطلاب على الخطة والتواصل معهم. إتاحة الخطة للعمال وممثليهم وتمكينهم من الوصول إليها.
 - تقييم المرفق بانتظام للتأكد من الامتثال للخطة والوثائق وتحديد أوجه القصور الصحيحة.
- التحقيق في أي حالة إصابة بكوفيد-19، وتحديد ما إذا قد أسهمت أي عوامل ذات صلة بالمؤسسة أو المبنى أو أنشطة المؤسسة في خطر العدوى. تحديث الخطة حسب الحاجة، لمنع المزيد من الإصابات.
- تنفيذ العمليات والبروتوكو لات عند التفشي في مكان العمل، وفقًا لإرشادات إدارة الصحة العامة في ولاية كاليفورنيا.
 - تحديد المخالطين المباشرين (في حدود ستة أقدام لمدة 15 دقيقة أو أكثر) مع أي عامل أو طالب مُصاب، واتخاذ خطوات لعزل العامل (العاملين) المؤكدة إصابتهم بكوفيد-19 وحجر المخالطين المباشرين.
- الامتثال للإرشادات أدناه. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى أمراض في مكان العمل قد تتسبب في إغلاق العمليات مؤقتًا أو تقييدها.
 - التأكد من أن البائعين والمقاولين المستقلين وغير هم ممن يؤدون خدمات في المؤسسة على دراية بهذه الإرشادات، وأنهم يتم تزويدهم باللوازم ومعدات الوقاية الشخصية أو يحصلون عليها، وأنهم يلتزمون بهذه الإرشادات.



2. التدابير العامة

- إنشاء واستمرار التواصل مع السلطات المحلية وسلطات الولاية لتحديد مستويات المرض الحالية وتدابير المكافحة في مجتمعك. على سبيل المثال:
- مراجعة موقع الويب الخاص بإدارة الصحة المحلية أو مسؤول الصحة المحلي أو الموظفين المعينين الذين هم
 في أفضل وضع للمراقبة وتقديم المشورة بشأن الظروف المحلية وتوجيهات الصحة العامة المحلية. يمكن
 العثور على دليل هنا.
 - مراجعة البيانات والتوجيهات المحدثة بانتظام من الوكالات التابعة للولاية، بما في ذلك إدارة الصحة العامة
 بكاليفورنيا و Cal/OSHA.
 - الحد، إلى أقصى حد يسمح به القانون، من دخول أعضاء المجتمع الخارجيين إلى الموقع واستخدام موارد الحرم
 الجامعي، نظرًا لأن عدد الأشخاص الإضافيين في الموقع و/أو الاختلاط مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس
 والموظفين يزيد من خطر انتقال الفيروس.
 - وضع خطة لإمكانية الإغلاق المتكرر للفصول أو المجموعات أو المرافق بأكملها في حالة إصابة الأشخاص المرتبطين بالمنشأة أو في المجتمع بكوفيد-19. راجع القسم 10 أدناه.



3. تحسين ممارسات النظافة الصحية

- تحسين وتعزيز غسل اليدين وتجنب ملامسة العين والأنف والفم وتغطية الأنف والفم عند السعال والعطس بين الطلاب والموظفين.
- نوصي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بغسل أيديهم بشكل متكرر لمدة 20 ثانية بالصابون،
 وفركها جيدًا بعد الاستخدام. استخدام الصابون "المضاد للميكروبات" ليس ضروريًا أو موصى به.
- تشجيع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين على تغطية الأنف والفم عند السعال والعطس بمنديل أو
 استخدام الجزء الداخلي من الكوع. يجب إلقاء المناديل المستعملة في سلة المهملات و غسل اليدين على الفور
 بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.
- يجب على الطلاب والموظفين استخدام مطهر اليدين عندما لا يكون غسيل اليدين عمليًا. يجب فرك المطهر في اليدين حتى يجف تمامًا.
 - لا تستخدم أي مطهر يدين قد يحتوي على الميثانول وفقًا <u>لاستشارة إدارة الغذاء والدواء</u> .حيث يعد الميثانول خطرًا على كل من الأطفال والبالغين.
 - التأكد من وجود اللوازم الكافية لدعم النظافة الصحية، بما في ذلك محطات التعقيم، والصابون، ومعقم اليدين الذي يحتوي على ما لا يقل عن 60 في المئة من الكحول الإيثيلي، والمناشف الورقية، والمناديل، والمناديل المبللة المطهرة، وصناديق القمامة التي لا تُلمس باليد/ بها دواسة للقدم.
 - يتطلب أو يوصىي بشدة أن يتم تطعيم جميع الطلاب والموظفين كل خريف ضد الأنفلونزا ما لم يحظر ذلك على الحالات الطبية الشخصية، للمساعدة في:
 - حماية مجتمع الحرم الجامعي
 - تقلیل الطلبات على مرافق الرعایة الصحیة
 - تقليل الأمراض التي لا يمكن تمييزها بسهولة عن كوفيد-19 ومن ثم فإنها ستؤدي إلى اتخاذ تدابير شاملة من مؤسسات التعليم العالى وسلطات الصحة العامة.

- نشر اللافتات في الأماكن المرئية للغاية (على سبيل المثال، مداخل المباني والمراحيض ومناطق تناول الطعام) التي تعزز تدابير الحماية اليومية ووصف كيفية وقف انتشار الجراثيم (مثل غسل اليدين بشكل صحيح، والتباعد الاجتماعي، وارتداء غطاء وجه من القماش بشكل صحيح).
- تضمين رسائل (على سبيل المثال، مقاطع فيديو) حول السلوكيات التي تمنع انتشار كوفيد-19 عند التواصل مع
 أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب (على سبيل المثال، على مواقع مؤسسات التعليم العالي الإلكترونية وفي
 رسائل البريد الإلكتروني وحسابات مؤسسات التعليم العالى على وسائل التواصل الاجتماعي) وقعًا لقانون كليري.



4. تكثيف التنظيف والتطهير والتهوية



🗖 التنظيف والتطهير

- كما هو موضح أدناه، تنظيف وتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر (على سبيل المثال، مقابض الأبواب،
 ومفاتيح الإضاءة، ومقابض الأحواض، ونوافير الشرب، وقضبان الإمساك، ودرابزين اليد، وأكشاك الحمامات،
 وطاو لات قاعة الطعام، وأدوات التحكم في المصعد) داخل مرافق مؤسسات التعليم العالي طوال اليوم.
- يجب أن يكون استخدام الأشياء المشتركة (مثل معدات المعمل، ومعدات الكمبيوتر، ومكاتب العمل) محدودًا عند الإمكان، أو تطهير ها بين الاستخدام. في حالة استخدام مركبات النقل (مثل الحافلات) من قبل مؤسسات التعليم العالي، يجب على السائقين ممارسة جميع إجراءات السلامة والبروتوكولات كما هو موضح بالنسبة للموظفين الأخرين (مثل نظافة اليدين وأغطية الوجه من القماش). لتنظيف وتطهير الحافلات أو الشاحنات أو المركبات الأخرى الخاصة بمؤسسات التعليم العالي، راجع إرشادات مشغلي النقل بالحافلات يجب تزويد السائقين بمناديل مطهرة وقفازات تستعمل لمرة واحدة لدعم تطهير الأسطح التي كثيرًا ما يتم لمسها خلال اليوم.
- وضع جدو لا زمنيًا لزيادة التنظيف والتطهير الروتيني الذي يتجنب قلة أو الإفراط في استخدام منتجات التنظيف.
- التأكد من التهوية الصحيحة أثناء التنظيف والتطهير. إدخال الهواء الطلق النقي قدر الإمكان، على سبيل المثال، عن طريق فتح النوافذ قدر الإمكان.
- تخطيط التنظيف فقط عند عدم وجود ركاب؛ إخراج الهواء بالكامل قبل عودة الأشخاص. إذا كان السطح أو الجسم متسخًا بشكل واضح، البدء بالماء والصابون أو بمنتج تنظيف متعدد الأغراض وأكثر أمانًا من الربو معتمد من وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) برنامج الاختيار الأكثر أمانًا.
 - اختيار منتجات مطهرة معتمدة للاستخدام ضد الفيروس الذي يسبب كوفيد-19 من قائمة "N" المعتمدة من وكالة حماية البيئة.
 - لتقليل مخاطر الإصابة بالربو و التأثيرات الصحية الأخرى المتعلقة بالتطهير، يجب أن تهدف البرامج إلى اختيار منتجات مطهرة في قائمة "N" وكالة حماية البيئة مع مكونات أكثر أمانًا من الربو (بيروكسيد الهيدروجين أو حمض الستريك أو حمض اللاكتيك).
- تجنب المنتجات التي تحتوي على حمض البيروكسي أسيتيك (بيروكسي) أو هيبوكلوريت الصوديوم (المبيض)
 أو مركبات الأمونيوم الرباعي، والتي يمكن أن تسبب الربو.
 - اتباع تعليمات ملصق المنتج المطهر لمعرفة معدلات التخفيف المناسبة وأوقات اللمس. تقديم تدريب العمال على المخاطر المرتبطة بالمنتج، وتوجيهات الشركة المصنعة، ومتطلبات التهوية، ومتطلبات إدارة السلامة والصحة المهنية في ولاية كاليفورنيا للاستخدام الأمن.
 - استخدم المطهرات وفقًا للتعليمات الصادرة عن إدارة تنظيم المبيدات الحشرية في ولاية كاليفورنيا.

- يجب أن يكون طاقم الحراسة والعاملين الأخرين الذين يقومون بتنظيف وتطهير موقع الحرم الجامعي مجهزين بمعدات الوقاية المناسبة، بما في ذلك القفازات الواقية، وحماية العينين، وحماية الجهاز التنفسي وغيرها من معدات الوقاية المناسبة كما هو مطلوب في تعليمات المنتج.
 - وضع جدول للتنظيف والتطهير لتجنب قلة أو الإفراط في استخدام منتجات التنظيف.
- تشجيع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين على الحفاظ على العناصر الشخصية الخاصة بهم (مثل الهواتف الخلوية والأجهزة الإلكترونية الأخرى) ومساحات العمل والمعيشة الشخصية نظيفة. تشجيع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين على استخدام مناديل مطهرة لمسح المكاتب المشتركة ومعدات المعامل والأشياء والأسطح المشتركة الأخرى قبل الاستخدام.

التهوية

- إدخال أكبر قدر ممكن من الهواء الطلق النقى:
- فتح النوافذ حيثما أمكن، على النحو الأمثل مع وجود فتحتين أو أكثر على الجوانب المقابلة للغرفة لتحفيز
 التهوية الطبيعية الجيدة. بالإضافة إلى النوافذ المفتوحة أو عند فتح النوافذ، فإنها تشكل خطرًا على السلامة أو
 الصحة (مثل السماح بدخول عادم الشاحنة أو الغبار) لشاغلي المرفق، أو استخدام مكيفات هواء الغرفة أو
 المنافيخ في وضع "الهواء النقى"، ومنظفات الهواء عالية الكفاءة (HEPA) للغرفة.
 - بالنسبة للمباني ذات التهوية الميكانيكية، زيادة التهوية الخارجية عن طريق تعطيل التهوية التي يتحكم فيها
 حسب الطلب وفتح مخمدات الهواء الخارجية بنسبة 100% أو أكبر قدر ممكن تسمح به الظروف الداخلية والخارجية.
 - يجب تشغيل أنظمة التهوية الميكانيكية في المباني باستمر ار عندما يتواجد الأشخاص في المبنى.
 - تحسين عملية ترشيح التهوية الميكانيكية إلى MERV-13 أو أعلى مستوى ممكن.
 - إذا أمكن، إضافة منظفات هواء غرفة محمولة مع مرشحات جسيمات الهواء عالية الكفاءة مع الأخذ في
 الاعتبار المساحة الداخلية المغطاة التي تغطيها منظفات الهواء المحمولة.
- للحصول على معلومات إضافية، استشر توصيات الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء
 لإعادة فتح المدرسة.

تطهير أنظمة المياه

- <u>اتخاذ خطوات</u> ضمان سلامة استخدام جميع أنظمة ومزايا المياه (على سبيل المثال، نافورات الشرب ونافورات التزيين) بعد إيقاف تشغيل المرفق لفترة طويلة لتقليل خطر داء الفيالقة والأمراض الأخرى المرتبطة بالماء.
- يُحظر استخدام نافورات الشرب. يتم تشجيع أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب على إحضار المياه الخاصة بهم واستخدام محطات إعادة تعبئة المياه حيثما كان ذلك متاحًا لزجاجات المياه الشخصية. يجب تنظيف محطات إعادة تعبئة المياه وتطهير ها بانتظام. نشر الافتات في محطات إعادة التعبئة التي تشجع المستخدمين على غسل أو تطهير يديهم بعد إعادة التعبئة.

تحذير: التباعد الجسدي وحده غير كاف لمنع انتقال كوفيد-19 في الأماكن المغلقة. يجب أيضًا تطبيق أغطية الوجه والتهوية المحسنة والتدابير الأخرى التي تمت مناقشتها في هذه الإرشادات بالإضافة إلى التباعد الجسدي لتقليل مخاطر الانتقال.

- ترك مسافة بين المقاعد/المكاتب لا تقل عن ستة أقدام. وضع فصول أصغر في غرف أكبر.
 - يُسمح بالمحاضرات وجهًا لوجه اعتمادًا على المستوى الذي تقع فيه المقاطعة.
 - الأرجواني واسع الانتشار المستوى 1: المحاضرات ممنوعة.
- الأحمر جوهري المستوى 2: يُسمح بالمحاضرات ولكن يجب أن يقتصر العدد على 25% من السعة أو 100 شخص، أيهما أقل، مع تعديلات.
- البرتقالي متوسط المستوى 3: يُسمح بالمحاضرات ولكن يجب أن يقتصر العدد على 50% من السعة أو 200 شخص، أيهما أقل، مع تعديلات.
 - الأصفر بسيط المستوى 4: يُسمح بالمحاضرات ولكن يجب أن يقتصر العدد على 50% من السعة مع تعديلات.
- التفكير في استخدام مساحة غير مخصصة للفصول الدراسية للتعليم، بما في ذلك الاستخدام المنتظم للمساحة الخارجية، إذا سمحت الأحوال الجوية بذلك.
- عندما يكون ذلك عمليًا، توفير التعلم المتزامن عن بعد بالإضافة إلى الفصول الشخصية للمساعدة في تقليل عدد الحضور الشخصي.
 - توفير مسافة كافية بين الأفراد المشاركين في فرص التعلم التجريبي (مثل المختبرات وأنشطة بناء المهارات المهنية).
- زيادة المسافة بين الطلاب في مركبات IHE (على سبيل المثال، ترك صفوف فارغة) إلى أقصى حد ممكن والتأكد من ارتداء أغطية الوجه. إدخال الهواء الطلق النقي عن طريق فتح النوافذ حيثما أمكن وعبر نظام تهوية المركبة.
 - التفكير في إعادة تصميم الأنشطة لمجموعات أصغر وإعادة ترتيب المساحات للحفاظ على الفصل.

٢ → ٢ الحواجز والأدلة المادية

- تركيب حواجز مادية غير منفذة، مثل واقيات العطس والفواصل، لا سيما في المناطق التي يصعب على الأفراد فيها البقاء على مسافة ستة أقدام على الأقل (على سبيل المثال، سجلات النقد).
- توفير أدلة وإشارات مادية، مثل الشريط اللاصق على الأرضيات أو الأرصفة واللافتات على الجدران، لضمان بقاء الأفراد على مسافة ستة أقدام على الأقل في الخطوط وفي أوقات أخرى.
 - التفكير في تعيين طرق للدخول والخروج، باستخدام أكبر عدد ممكن من المداخل. وضع بروتوكولات أخرى للحد من التلامس المباشر مع الآخرين قدر الإمكان.
 - الحفاظ على أو توسيع نطاق الإجراءات لتشغيل المهام التي تقلل التلامس.

المساحات المشتركة

- الحد، إلى أقصى حد يسمح به القانون، من أي زوار غير أساسيين أو متطوعين من الوصول إلى الحرم الجامعي. لا يُسمح في الوقت الحالي بالأنشطة الشخصية أو الاجتماعات التي تتضمن مجموعات أو منظمات خارجية خاصة مع الأفراد الذين ليسوا من المنطقة الجغرافية المحلية (على سبيل المثال، المجتمع أو البلدة أو المدينة أو المقاطعة).
- الأماكن المشتركة غير الضرورية، مثل غرف الألعاب والردهات؛ وبالنسبة للمساحات المشتركة الأساسية، والاستخدام المتدرج، وتقييد عدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول في وقت واحد لضمان بقاء كل شخص على بُعد ستة أقدام على الأقل، والتنظيف والتطهير بين الاستخدام. تطوير أنظمة لإنفاذ ذلك.
- إعداد مساحات الدراسة المتاحة للدراسة الفردية بحيث يجلس الطلاب على مسافة ستة أقدام على الأقل وتركيب
 الحواجز المادية حيثما أمكن. يجب أن تقتصر نسبة الإشغال على 25% من سعة الغرفة أو 100 شخص، أيهما أقل.
 - إضافة حواجز مادية، مثل الشاشات البلاستيكية المرنة بين أحواض الحمّام، خاصة عندما لا تكون على مسافة ستة أقدام على الأقل. عندما تكون الأحواض أقرب من ستة أقدام، تعطيل الأحواض بالتناوب لخلق مسافة أكبر.
 - تشجيع الطلاب على استخدام نفس مرافق الحمام ومرافق الاستحمام باستمرار لاحتواء أي انتقال محتمل داخل المجموعة.

·II--II. صالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة ومرافق اللياقة البدنية

- مراجعة التوجيهات المتعلقة بمرافق اللياقة البدنية وحمامات السباحة الموجودة على الموقع الإلكتروني مخطط لاقتصاد أكثر أمانًا".
- وكما هو مشار إليه في الإرشادات المتعلقة بالألعاب الرياضية الكلية، يجب أن تحد المرافق الرياضية من الإشغال للموظفين الأساسيين، مثل اللاعبين والمدربين وما إلى ذلك.

الله خدمة الأطعمة وقاعات تناول الطعام

- توفير خيارات البيع المباشر للوجبات. إذا كانت قاعة تناول الطعام تستخدم عادةً، إن أمكن، تقديم وجبات في أطباق بشكل فردي (مقابل بوفيه أو أي محطات خدمة ذاتية).
- استخدام عناصر خدمة الأطعمة التي يمكن التخلص منها (مثل الأواني والأطباق). إذا كانت العناصر التي يمكن التخلص منها التخلص منها عند مجدية أو مرغوبة، التأكد من التعامل مع جميع عناصر خدمة الطعام التي لا يمكن التخلص منها بقفازات و غسلها بصابون الأطباق والماء الساخن أو في غسالة الأطباق. يجب على الأفراد غسل أيديهم قبل ارتداء قفازاتهم وبعد خلعها، وبعد التعامل المباشر مع عناصر خدمة الطعام المستعملة.
 - إذا تم تقديم طعام في أي حدث، الحرص على توفير صناديق أو أكياس معبأة مسبقًا لكل ضيف بدلاً من بوفيه أو وجبة عائلية. تجنب مشاركة الطعام والأواني والنظر في سلامة الأفراد الذين يعانون من الحساسية الغذائية.
- يجب على قاعات الطعام اتباع الإرشادات ذات الصلة وفقًا لموافقات إعادة الفتح الخاصة بمسؤول الصحة المحلي في المرفق، على النحو التالى:
 - الأرجواني واسع الانتشار المستوى 1: يسمح بالعمليات في المساحات المفتوحة (التسليم/ الاستلام) مع تعديلات.
 - الأحمر جوهري المستوى 2: يُسمح بالعمليات المتعلقة بتناول الطعام في الأماكن المغلقة ولكن يجب أن يقتصر العدد على 25% من السعة أو 100 شخص، أيهما أقل، مع تعديلات.

- البرتقالي _ متوسط _ المستوى 3: يُسمح بالعمليات المتعلقة بتناول الطعام في الأماكن المغلقة ولكن يجب أن يقتصر العدد على 50% من السعة أو 200 شخص، أيهما أقل، مع تعديلات.
 - الأصفر بسيط المستوى 4: يُسمح بالعمليات المتعلقة بتناول الطعام في الأماكن المغلقة بنسبة
 50% من السعة مع تعديلات.
- اتباع التوجيهات الإضافية الموجودة على الموقع الإلكتروني مخطط لاقتصاد أكثر أمانًا للخدمات الإضافية في الحرم الجامعي مثل متاجر بيع الكتب، المكتبات، المحسانات، قاعات تناول الطعام، إلخ.



6. الحد من المشاركة

- الحث على عدم مشاركة العناصر التي يصعب <u>تنظيفها أو تطهير ها</u>، كما هو موضح أعلاه.
- ضمان اللوازم الكافية لتقليل مشاركة المواد عالية اللمس إلى أقصى حد ممكن (على سبيل المثال، تخصيص لوازم فنية خاصة لكل طالب، ومعدات معملية، وأجهزة كمبيوتر) أو الحد من استخدام اللوازم والمعدات من قبل مجموعة واحدة من الطلاب في كل مرة والتنظيف والتطهير بين الاستخدام، كما هو موضح أعلاه.
 - تجنب مشاركة الأجهزة الإلكترونية والكتب والأقلام ومساعدات التعلم الأخرى.



7. الإسكان تحت سلطة مؤسسات التعليم العالي

- مراجعة الإرشادات داخل الحرم الجامعي في مكان آخر في هذه الوثيقة والإرشادات الحالية لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها فيما يتعلق بكوفيد-19 للإسكان المشترك أو المجمع فيما يتعلق بما يلي:
- يجب على مؤسسات التعليم العالي تقييم وتخفيف أي مشكلات تتعلق بالإنصاف والوصول عند إعطاء الأولوية للإسكان المحدود للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
- تذكيرات متكررة للوقاية من كوفيد-19، بما في ذلك نظافة اليدين المناسبة (شفهيًا، الملصقات، الفيديو هات) مع مطهر اليدين المتوفر على نطاق واسع في المناطق والغرف المشتركة.
 - تنظيف وتطهير المناطق المشتركة والأسطح عالية اللمس طوال اليوم، بما يتفق مع القسم 3.
 - طلب ارتداء أغطية الوجه والتباعد الجسدي في المناطق المشتركة.
 - التدريب على تدابير الصحة العامة و علامات و أعراض كوفيد-19 لجميع المهنيين المقيمين ومديري قاعات الدراسات العليا والمستشارين المقيمين (RA) و غير هم في أدوار مماثلة.
 - لا توجد أحداث اجتماعية أو أنشطة وفقًا لطلبات المسؤولين المحليين والمسؤولين في الولاية الحاليين.
 - إعادة تكوين المقاعد في المناطق المشتركة للسماح بالتباعد الاجتماعي المناسب.
 - من الصعب الحفاظ على التباعد الاجتماعي في الإسكان داخل الحرم الجامعي، وقد يصعب تحقيق الإرشادات المعدلة. ومع ذلك، يجب بذل كل جهد ممكن لتقليل خطر التعرض في ترتيبات الإسكان داخل الحرم الجامعي من خلال تقليل الإشغال، بما في ذلك:
 - تحديد الإشغال المسموح به ووضع خطط للمراقبة والإنفاذ.
- إعطاء الأولوية لإشغال الغرف الفردية حيثما أمكن، باستثناء السكن العائلي. قد يكون هذا ممكنًا إذا كانت
 الكلية/ الجامعة لديها عدد محدود من الطلاب في الحرم الجامعي للتعليم الشخصي.

لكل غرفة، التأكد من وجود ستة أقدام على الأقل بين الأسرة، ومطالبة الطلاب بالنوم في اتجاهات معاكسة (الرأس مقابل القدم). تقلیل عدد المقیمین لکل حمام. عند استخدام الحمامات المشترکة، ینبغی جدولة أوقات الاستخدام إلى أقصى حد ممكن، وزيادة عدد مرات التنظيف. تقييد الوصول إلى المبنى من جانب غير المقيمين، بما في ذلك الضيوف الخارجيين والموظفين غير المقيمين وغيرهم. قد لا تنطبق هذه القيود على بعض الأشخاص، مثل حضور الرعاية الشخصية للطلاب ذوي الإعاقة.

8. تدريب الموظفين والطلاب



- توفير تدريب فعال لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب حول الوقاية من كوفيد-19، بما في ذلك:
- معلومات حول كوفيد-19، وكيفية منع انتشاره، وأي حالات صحية أساسية قد تجعل الأفراد أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.
 - خطة الوقاية من كوفيد-19 الخاصة بالمرفق.
- الفحص الذاتي في المنزل، بما في ذلك فحوصات درجة الحرارة و/أو الأعراض باستخدام الإرشادات الصادرة
 عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.
- طلب الرعاية الطبية إذا أصبحت الأعراض حادة، بما في ذلك الألم أو الضغط المستمر في الصدر أو الارتباك
 أو الشفاة الزرقاء أو الوجه الأزرق. تتوفر تحديثات وتفاصيل إضافية على صفحة الويب الخاصة بمراكز
 مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).
 - ممارسات التعقيم المعززة
 - الإرشادات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي
- استخدام معدات الوقاية الشخصية والاستخدام السليم لأغطية الوجه من القماش وإزالتها وغسلها، بما في ذلك:
 - أغطية الوجه ليست من معدات الوقاية الشخصية (PPE).
 - يمكن أن تساعد أغطية الوجه في منع تعرض الأشخاص بالقرب من مرتديها ومن يرتديها، ولكنها لا تحل محل الحاجة إلى التباعد الاجتماعي و غسل البدين المتكرر.
 - يجب أن تغطي أغطية الوجه الأنف والفم.
 - يجب غسل اليدين أو تعقيمهما قبل استخدام أغطية الوجه أو تعديلها.
 - تجنب لمس العينين والأنف والفم.
 - يجب عدم مشاركة أغطية الوجه ويجب غسلها أو التخلص منها بعد كل استخدام.
- المعلومات الواردة في إرشادات إدارة الصحة العامة في ولاية كاليفورنيا لاستخدام أغطية الوجه، والتي تنص على الظروف التي يجب فيها ارتداء أغطية الوجه والاستثناءات، بالإضافة إلى أي سياسات وقواعد عمل وممارسات اعتمدتها مؤسسات التعليم العالي لضمان استخدام أغطية الوجه. يجب أن يشمل التدريب أيضًا سياسات مؤسسات التعليم العالي بشأن كيفية التعامل مع الأشخاص المستثنين من ارتداء غطاء الوجه.
- معلومات عن مخصصات الإجازة مدفوعة الأجر التي قد يحق للعامل الحصول عليها، والتي من شأنها أن تيسر ماليًا بقاءه في المنزل. اطلع على معلومات إضافية عن البرامج الحكومية الداعمة للإجازة المرضية مدفوعة الأجر في ظل كوفيد-19، بما في ذلك حقوق العاملين في الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر بموجب قانون الأسر أولًا الفدرالي للاستجابة لفيروس كورونا (Response Act).
 - أهمية عدم الحضور إلى العمل أو الحضور إلى الفصل:
 - إذا كان لدى عامل أو طالب أعراض كوفيد-19 كما وصفها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، مثل الحمى أو القشعريرة أو السعال أو ضيق التنفس أو صعوبة التنفس أو التعب أو آلام العضلات أو الجسم أو الصداع أو فقدان حاسة التذوق أو الشم أو التقرح الحلق أو الاحتقان أو سيلان الأنف أو الغثيان أو القيء أو الإسهال، أو

- إذا تم تشخيص العامل أو الطالب على أنه مصاب بكوفيد-19 ولم يتم إخراجه بعد من العزل، أو
- إذا كان العامل أو الطالب، خلال فترة 14 يومًا الماضية، قد اختلط بشخص تم تشخيص إصابته بكوفيد- 9 ويعتبر معديًا (أي ما زال في العزل).
- لا يجوز عودة أي عامل أو طالب إلى العمل أو الفصل بعد تشخيصه بالإصابة بكوفيد-19، إلا بعد مرور 10 أيام على أول ظهور للأعراض لديه، وبعد تحسن الأعراض، وبعد عدم وجود أي ارتفاع في درجة الحرارة لدى العامل أو الطالب (من دون استخدام أدوية خافضة للحرارة) خلال 24 ساعة الماضية. لا يجوز لأي عامل أو طالب تم تشخيصه بكوفيد-19 ولا يعاني من أي أعراض العودة إلى العمل أو الفصل إلا في حالة مرور 10 أيام من تاريخ جمع العينات لأول فحص يؤكد الإصابة بكوفيد-19.
- التأكد من إطلاع أي مقاولين مستقلين، أو عمال مؤقتين أو متعاقدين، ومتطوعين بشكل صحيح على سياسات الوقاية من كوفيد-19 في الحرم الجامعي ولديهم اللوازم اللازمة ومعدات الوقاية الشخصية. تنبيه المنظمات التي تزود العمال المؤقتين و/أو المتعاقدين في وقت مبكر بهذه المسؤوليات، والتأكد من حصول العمال على التدريب.
 - النظر في إجراء التدريب افتراضيًا، أو إذا كان شخصيًا، التأكد من الحفاظ على التباعد الاجتماعي بمسافة ستة أقدام

9. التحقق من العلامات والأعراض



- تشمل أعراض كوفيد-19، مثل التي وصفها مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC):
 - حمى أو قشعريرة
 - 0 سعال
 - ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس
 - ٥ التعب
 - آلام العضلات أو الجسم
 - ٥ صداع
 - فقدان حاسة الشم أو التذوق مؤخرًا
 - التهاب الحلق
 - احتقان أو سيلان الأنف
 - الغثيان أو القيء
 - و إسهال
- إذا أمكن، إجراء فحوصات صحية يومية أو مطالبة أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب بإجراء فحوصات ذاتية (مثل فحص درجة الحرارة و/أو فحص الأعراض).
- يجب إجراء الفحوصات الصحية بشكل آمن وفقًا لتوصيات التباعد الاجتماعي وباحترام وبما يتفق مع قوانين ولوائح الخصوصية والسرية الفيدرالية المعمول بها. قد يستخدم مسؤولو مؤسسات التعليم العالي أمثلة على طرق الفحص الموجودة في مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) الأسئلة الشائعة حول الأعمال العامة.



10. التخطيط لموعد مرض الموظف أو الطالب أو الزائر

عديم المشورة للأفراد المرضى في معايير العزل المنزلي

- تذكير الموظفين والطلاب المرضى أو الذين اختلطوا مؤخرًا بشخص مصاب بكوفيد- 19 بالبقاء في المنزل أو، إذا
 كانوا يعيشون في سكن داخل الحرم الجامعي، باتباع إجراءات العزل.
 - بالنسبة لإصابة أو مرض خطير، اتصل على 1-1-9 دون تأخير.
- ينبغي على أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين أو الطلاب المرضى عدم العودة إلى الفصول الشخصية أو مرافق مؤسسات التعليم العالي أو إنهاء العزل حتى يستوفوا معايير إيقاف العزل المنزلي .وضع خطة لتقديم الخدمات بما في ذلك الطعام والرعاية الصحية للطلاب الذين يعيشون في الحرم الجامعي والذين تم تشخيصهم بأنهم مصابين بكوفيد-19 أو ظهرت عليهم أعراضه.
- وضع سياسات تشجع الموظفين و الطلاب المرضى و تذكر هم بالبقاء في المنزل دون خوف من الانتقام وضمان أن يكون الموظفون و الطلاب على در اية بهذه السياسات.

عزل ونقل المرضى

- التأكد من أن أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب يعرفون أنه ينبغي عليهم عدم الحضور إلى مؤسسات التعليم العالي إذا شعروا بالمرض، ويجب عليهم إخطار مسؤولي الكلية (على سبيل المثال، جهة الاتصال المعنية بكوفيد- 19 التي تعينها مؤسسات التعليم العالي) إذا أصيبوا بأعراض كوفيد-19، أو كانت نتيجة اختبار كوفيد-19 إيجابية، أو اختلطوا بشخص ظهرت عليه أعراض كوفيد-19 أو حالة مؤكدة.
 - الفصل الفوري بين أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب الذين ظهرت عليهم أعراض كوفيد-19 (كما هو مذكور أعلاه). يجب على الأفراد المصابين:
 - ٥ ارتداء قناع أو غطاء الوجه،
 - العودة إلى المنزل، أو إذا كانوا يعيشون في مكان معزول في الحرم الجامعي، اتباع إجراءات العزل، أو
 الذهاب إلى مرفق رعاية صحية محلي أو في الحرم الجامعي، حسب مدى شدة أعراضها، و
 - اتباع إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) لر عاية الذات والأخرين المرضى. قد تتبع مؤسسات التعليم العالي إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بشأن الإسكان المشترك أو المجمع لأولئك الذين يعيشون في مساكن مؤسسات التعليم العالي.
- العمل مع مسؤولي مؤسسات التعليم العالي ومقدمي الرعاية الصحية لتحديد غرفة أو منطقة أو مبنى/ طابق عزل (للإسكان داخل الحرم الجامعي) لفصل أي شخص تظهر عليه أعراض كوفيد-19 أو تكون نتيجة الاختبارات إيجابية ولكن لا تظهر عليه أعراض. يجب حماية مقدمي الرعاية الصحية لمؤسسات التعليم العالي وفقًا اللباب 8، القسم 5199 عند رعاية المرضى. راجع: دليل مكان العمل في ولاية كاليفورنيا للأمراض المنقولة عن طريق الهباء الجوى.
- وضع إجراءات لنقل أي شخص مريض إلى منزله أو مرفق رعاية صحية بشكل آمن وفقًا للبند 8، القسم 5199. إذا كنت تتصل بالإسعاف أو تحضر شخص إلى المستشفى، الاتصال أو لا لتنبيههم بأن الشخص قد يكون مصابًا بكوفيد-19.

خدمات صحة الطلاب التابعة لمؤسسات التعليم العالى



- راجع الإرشادات المفصلة الصادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها وإدارة السلامة والصحة المهنية في ولاية كاليفورنيا بشأن السلامة
 - تقديم خدمات الرعاية الصحية لأعراض كوفيد-19
 - حماية الموظفين والطلاب من كوفيد-19 أثناء تلقى الرعاية.

التنظيف والتطهير

- غلق المناطق التي يستخدمها شخص مريض و عدم استخدام هذه المناطق إلا بعد التنظيف والتطهير، كما هو موضح
- الانتظار 24 ساعة على الأقل قبل التنظيف والتعقيم. إذا لم تكن 24 ساعة ممكنة، انتظر قدر الإمكان. التأكد من الاستخدام الأمن والصحيح للمطهرات مع موظفين مدربين باستخدام معدات الحماية الشخصية والتهوية الموصى بها للتنظيف، كما هو موضح أعلاه. الاحتفاظ بالمنتجات المطهرة بعيدًا عن متناول الأطفال. والوضع في الاعتبار خدمات التنظيف الخاصة بطرف ثالث المتخصصة في تطهير المناطق المصابة.





- إخطار مسؤولي الصحة المحليين وأفراد المجتمع في الحرم الجامعي على الفور بأي حالة إيجابية من كوفيد-19 مع الحفاظ على السرية على النحو الذي تقتضيه القوانين الفيدر الية وقوانين الولاية، بما في ذلك قانون الحقوق والخصوصية التعليمية للأسرة (FERPA) وقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة (ADA). يمكن العثور على إرشادات إضافية هنا.
- إبلاغ أولئك الذين خالطوا شخص تم تشخيصه بكوفيد-19 بالبقاء في المنزل أو في أماكن معيشتهم والمراقبة الذاتية للأعراض، واتباع إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في حالة ظهور الأعراض.
- توثيق/تتبع حوادث التعرض المحتمل وإخطار مسؤولي الصحة المحليين والموظفين المناسبين والعائلات على الفور بأي حالة محتملة لكوفيد-19 مع الحفاظ على السرية، حسبما يقتضيه قانون الحقوق والخصوصية التعليمية للأسرة (FERPA) وقانون الولاية المتعلق بخصوصية السجلات التعليمية. يمكن العثور على إرشادات إضافية هنا يمكن أن يقوم منسق الموظفين بدور التنسيق لضمان الإخطار الفوري والمسؤول.
- إبلاغ الموظفين والطلاب المرضى بعدم العودة حتى يستوفوا معايير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها لوقف العزل المنزلي، بما في ذلك 24 ساعة بدون حمى، وتحسن الأعراض، و10 أيام منذ ظهور الأعراض لأول مرة.
 - التأكد من عدم التمييز ضد الطلاب والموظفين الذين تم أو يتم تشخيص إصابتهم بكوفيد-19.



11. الحفاظ على العمليات الصحية

- حماية الأشخاص المعرضين لخطر أعلى للإصابة بمرض شديد من كوفيد-19

- تقديم خيارات لأعضاء هيئة التدريس والموظفين المعرضين لخطر أكبر للإصابة بأمراض خطيرة (بما في ذلك كبار السن والأشخاص من جميع الأعمار الذين يعانون من بعض الحالات الطبية الأساسية) التي تحد من مخاطر تعرضهم (على سبيل المثال، العمل عن بعد، وتقديم الدورات التدريبية عن بُعد، ومسؤوليات الوظيفة المعدلة).
- تقديم خيارات للطلاب المعرضين لخطر أكبر للإصابة بمرض خطير يحد من مخاطر تعرضهم (على سبيل المثال، فرص التعلم الافتر اضية).
- توفير فرص لجميع الموظفين للعمل عن بعد، وفرص للطلاب للتعلم الافتر اضي والدراسة المستقلة وخيارات أخرى، قدر الإمكان، لتقليل مخاطر النقل.

الوعي التنظيمي



 كن على دراية بسياسات الوكالة التنظيمية الحكومية أو المحلية الحالية المتعلقة بالتجمعات الجماعية لتحديد ما إذا كان يمكن عقد الأحداث.

الأنشطة الأنشطة



- بالنسبة للأنشطة الطلابية الخاصة بـ IHE، متابعة الفعاليات الجماعية أو التجمعات أو الاجتماعات الافتر اضية، إن أمكن. يجب أن تلتزم التجمعات بالحضور الشخصى بالتوجيهات التالية:
 - الأرجواني واسع الانتشار المستوى 1: التجمعات ممنوعة.
 - الأحمر جوهري المستوى 2: يُسمح بالتجمعات ولكن يجب أن يقتصر العدد على 25% من السعة أو 100 شخص، أيهما أقل، مع تعديلات.
 - البرتقالي متوسط المستوى 3: يُسمح بالتجمعات ولكن يجب أن يقتصر العدد على 50% من السعة أو 200 شخص، أيهما أقل، مع تعديلات.
 - o الأصفر بسيط المستوى 4: يُسمح بالتجمعات ولكن يجب أن يقتصر العدد على 50% من السعة مع تعديلات.
- اتباع الإرشادات التي تنطبق على الأحداث الرياضية والمشاركة في الأنشطة الرياضية بطرق تقلل من خطر انتقال كوفيد-19 إلى اللاعبين والأسر والمدربين والمجتمعات. (راجع الإرشادات الخاصة بالألعاب الرياضية الجامعية أدناه.)
- بالنسبة لجميع التجمعات الأخرى، مثل العروض العامة، اتباع طلبات المسؤولين الحكوميين الحاليين والمستشارين المحليين بشأن الارشادات المطبقة على التجمعات.
- الحد، إلى أقصى حد يسمح به القانون، من أي زوار غير أساسيين أو متطوعين من الوصول إلى الحرم الجامعي. لا يُسمح في الوقت الحالي بالأنشطة الشخصية أو الاجتماعات التي تتضمن مجموعات أو منظمات خارجية - خاصة مع الأفراد الذين ليسوا من المنطقة الجغرافية المحلية (على سبيل المثال، المجتمع أو البلدة أو المدينة أو المقاطعة).

🛜 العمل عن بعد والاجتماعات والخدمات الافتراضية

- تشجيع العمل عن بعد الأكبر عدد ممكن من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وخاصة العمال المعرضين لخطر أكبر للإصابة بأمراض خطيرة من كوفيد-19
 - استبدال الاجتماعات الشخصية بمكالمات الفيديو أو المكالمات الجماعية كلما أمكن ذلك.
 - تقديم خدمات دعم الطلاب فعليًا قدر الإمكان.
- عندما يكون ذلك ممكنًا، استخدام مواقع العمل أو التعلم المرنة (على سبيل المثال، العمل عن بعد، التعلم الافتراضي) والعمل المرن أو ساعات التعلم (على سبيل المثال، التحولات التدرجية أو الفصول الدراسية) للمساعدة في وضع سياسات وممارسات للتباعد الاجتماعي.

السفر والعبور

- الوضع في الاعتبار خيارات الحد من السفر غير الضروري وفقًا للوائح والتوجيهات المحلية والخاصة بالولاية.
- تشجيع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين الذين يستخدمون وسائل النقل الجماعي على التفكير في استخدام خيارات النقل الأخرى (على سبيل المثال، المشي أو ركوب الدراجات أو القيادة أو ركوب السيارة بمفردهم أو مع أفراد الأسرة فقط) إذا كان ذلك ممكنًا.

جهة اتصال كوفيد-19 المعينة

 تعيين مسؤول أو مكتب ليكون مسؤولاً عن الاستجابة لمخاوف كوفيد-19. يجب على جميع طلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في مؤسسات التعليم العالي معرفة هويتهم وكيفية الاتصال بهم. يجب تدريب المنسق على تنسيق التحقيق والتوثيق وتتبع حالات التعرض المحتملة لكوفيد-19، من أجل توجيه المخالطين بشكل مناسب إلى الحجر الصحي، وإخطار مسؤولي الصحة المحليين والموظفين والعائلات بطريقة سريعة ومسؤولة.

المشاركة في جهود الاستجابة المجتمعية

• الوضع في الاعتبار المشاركة مع سلطات الولاية أو السلطات المحلية في جهود استجابة المجتمع الأوسع لكوفيد-19 بما في ذلك السعي وراء السلطة المفوضة لتتبع المخالطة، والجلوس في لجان استجابة المجتمع، واستخدام مختبرات وموارد مؤسسات التعليم العالي، عند توفرها، لزيادة قدرة الاختبار.

و أنظمة الاتصالات

- الحفاظ على أنظمة الاتصالات التي
- تسمح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بما يلي:
- إبلاغ مؤسسات التعليم العالي إذا كانت لديهم أعراض كوفيد-19، أو كانت نتيجة اختبار كوفيد-19
 إيجابية، أو تعرضوا لشخص مصاب بكوفيد-19 وفقًا لإرشادات مشاركة المعلومات الصحية لكوفيد-19، و

- تلقى إخطارات فورية بالتعرضات والإغلاقات مع الحفاظ على السرية، كما هو مطلوب بموجب قانون الحقوق والخصوصية التعليمية للأسرة (FERPA) وقانون الولاية المتعلق بخصوصية السجلات التعليمية. يمكن العثور على إرشادات إضافية هنا.
- إخطار أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب والعائلات والجمهور بإغلاق مؤسسات التعليم العالي وأي قيود مفروضة للحد من التعرض لكوفيد-19 (على سبيل المثال، ساعات محدودة من العمل).



سياسات الإجازة والغياب بإذن

 وضع سياسات للعودة إلى الفصول ومرافق مؤسسات التعليم العالى بعد مرض كوفيد-19. يمكن لمعايير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الخاصة بوقف العزل المنزلي والحجر الصحى الاسترشاد بهذه السياسات.



مع خطة التوظيف الاحتياطية

مراقبة تغيب العمال والطلاب، وتدريب الموظفين، وإنشاء قائمة من الموظفين الاحتياطيين المدربين.



المؤسسات التابعة

• التأكد من أن أي منظمات تابعة لمؤسسات التعليم العالى، مثل النوادي خارج الحرم الجامعي، والمنظمات اليونانية، وما إلى ذلك، تتبع هذه الإرشادات. تطوير أنظمة لفرض الالتزام بهذه الإرشادات على المنظمات التابعة ومساءلتها



عم التكيف والمرونة كالمرونة

- تشجيع العمال والطلاب على أخذ فترات راحة من مشاهدة القصص الإخبارية أو قراءتها أو الاستماع إليها، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي إذا كانوا يشعرون بالإرهاق أو الضيق.
 - تعزيز الأكل الصحى وممارسة الرياضة والنوم وإيجاد وقت للاسترخاء.
 - تشجيع العمال والطلاب على التحدث مع الأشخاص الذين يثقون بهم بشأن مخاوفهم وكيف يشعرون.
 - دراسة وضع لافتات للخط الساخن الوطني للاستغاثة: 5990-985-1- أو إرسال TalkWithus إلى .66746
- · نشر لافتات على الموارد داخل الحرم الجامعي لمساعدة الطلاب على علاج الإجهاد والحضور إلى عيادات الصحة



الاختبار (1)

يجب أن يؤخذ في الاعتبار إجراء اختبار الفحص الدوري المنتظم للطلاب والموظفين للكشف عن عدوى كوفيد-19 الحالية، وشراء الموارد لفحص طلاب وموظفي IHE المعرضين في حالة تعرضهم. فائدة الاختبار الأولى أو الروتيني لوجود الأجسام المضادة في المصل بعد الإصابة غير واضحة حاليًا.



12. اعتبارات للإغلاقات الجزئية أو الكلية

- التحقق من أو امر مسؤول الصحة بالولاية والمحلي و إشعار ات إدارة الصحة بشكل متكرر حول الإرسال في المنطقة أو الإغلاق وضبط العمليات وفقًا لذلك.
 - عندما تكون نتيجة اختبار الطالب أو عضو من أعضاء هيئة التدريس أو الموظف إيجابية لكوفيد-19 وتعرص لآخرين في المدرسة، تنفيذ الخطوات التالية:
 - استشارة إدارة الصحة العامة المحلية بخصوص المتابعة الإضافية اللازمة لتحديد المخالطين، والإجراءات الموصى بها، والإغلاق، أو التدابير الأخرى لحماية مجتمعك.
 - تقديم إرشادات قياسية للعزل المنزلي لمدة 10 أيام بالنسبة للأشخاص المصابين بعدوى كوفيد-19.
- تقديم إرشادات قياسية للحجر الصحي في المنزل لمدة 14 يومًا على الأقل بعد المخالطة، فقد تحتاج أجزاء من الحرم الجامعي أو كله إلى الإغلاق مؤقتًا أثناء عزل الطلاب أو الموظفين. الرجوع إلى موقع إدارة الصحة المحلية أو إرشادات العزل والحجر الصحى الصادرة عن إدارة الصحة العامة في ولاية كاليفورنيا.
 - صيحب أيضًا فرض الحجر الصحي على المخالطين الإضافيين خارج محل الإقامة والفصل الدراسي لمدة 14 يومًا في محل إقامتهم.
 - وضع خطط اتصال لإخطارات التعرض أو إغلاق المدرسة لتشمل التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والمجتمع.
 - تضمين معلومات للعاملين فيما يتعلق بقوانين العمل، والمعلومات المتعلقة بتأمين الإعاقة، والإجازة العائلية
 مدفوعة الأجر، والتأمين ضد البطالة، حسب الاقتضاء.
 - تقديم الإرشادات للطلاب وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس والموظفين لتذكير هم بأهمية تدابير التباعد
 الاجتماعي المجتمعية في حين أن يكون بعض أو جميع الحرم الجامعي مغلق، بما في ذلك حث الطلاب أو
 الموظفين على عدم التجمع في مكان آخر.
 - وضع خطط لاستمراریة التعلیم أو مراجعتها.
 - مراقبة موقع إدارة الصحة العامة المحلية والحفاظ على اتصالات منتظمة.

إرشادات مؤقتة محددة للألعاب الجامعية

تهدف الإرشادات والاعتبارات التالية إلى مساعدة مؤسسات التعليم العالي ومجتمعاتها على التخطيط والاستعداد لاستئناف التدريب الرياضي في الكليات، واستئناف المنافسة عندما تتطلب الظروف ذلك.

يعتمد خطر نقل فيروس كوفيد-19 على عدة عوامل مرتبطة بالرياضة، بما في ذلك:

- عدد الأشخاص في الموقع
- نوع الموقع (داخلي مقابل خارجي)
- المسافة أو التلامس البدني بين الأشخاص
 - طول الوقت في الموقع
 - لمس العناصر المشتركة
 - استخدام أغطية الوجه
- اختلاط الأشخاص من مواقع ذات مستويات مختلفة من النقل المجتمعي

يزيد طول الوقت وقرب المخالطة واستخدام المعدات المشتركة من المخاطر المحتملة للرياضبين. للمساعدة في التخفيف من هذه المخاطر، يجب على الكليات التي ترغب في استئناف المنافسة توفير حماية قوية للطلاب الرياضبين، بما في ذلك السماح لهم باختيار الانسحاب من الموسم دون التعرض لخطر إلغاء المنحة الدراسية أو تخفيضها أو إلغاؤها أو أي نوع آخر من النشاط الانتقامي. من المتوقع أيضًا أن تقوم الإدارات الرياضية بالكليات بفرض بروتوكو لات الاختبار والإبلاغ الموضحة أدناه بقوة.

كإرشادات عامة، تعتبر المجموعات الأصغر عددًا أكثر أمانًا من المجموعات الأكبر؛ المواقع الخارجية أكثر أمانًا من الداخلية؛ تكون الرياضات التي يمكن أن تضمن مسافة ستة أقدام أو أكثر أمانًا من المخالطة؛ والمدة الأقصر أكثر أمانًا من الأطول. بالنسبة لمعظم الأنشطة الرياضية، تفترض هذه الإرشادات أن استخدام أغطية الوجه أثناء اللعب ليس أمرًا مُجديًا، بالرغم من ضرورة ارتدائها من جانب اللاعبين وغيرهم أثناء التواجد على الخطوط الجانبية. يحتاج المديرون والمدربون الرياضيون إلى التفكير في جميع هذه العوامل أثناء تخطيطهم الستئناف التدريب والتكبيف.

بالإضافة إلى ذلك، يتدرب الطلاب الرياضيون ويدرسون وربما يعيشون خارج الحرم الجامعي ويسافرون للتنافس في مناطق جغرافية أخرى، مما يزيد من مخاطر انتقال العدوى. تحتاج مؤسسات IHE إلى مراعاة هذه العوامل عند استئناف التمرين، ووضع بروتوكولات لاستخدام مرافق اللياقة البدنية في الحرم الجامعي، ووضع توجيهات لإسكان الطلاب الرياضيين. السماح للفرق بالحضور إلى الحرم الجامعي من مناطق جغرافية أخرى يزيد أيضًا من خطر انتقال المرض.

مع تعديل أوامر البقاء في المنزل، من الضروري اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان سلامة الطلاب الرياضيين والعاملين والجمهور.

لا يُسمح للفرق الرياضية الجامعية بالبدء في العودة إلى التدريب إلا إذا:

- تتبنى مؤسسة التعليم العالى، وتتبع فرقها، خطة سلامة خاصة بمؤسسة "العودة إلى اللعب"، و
- يتم تأكيد وتنفيذ الاختبار الدوري للكشف عن كوفيد-19 للرياضيين وموظفي الدعم من قبل IHE. يُقبل كل من اختبار PCR الدوري وكذلك اختبار المستضد اليومي. (انظر القسم 3 أدناه لمعرفة المتطلبات المحددة لإجراء الفحص).
- بما يتفق مع المتطلبات التي تفرضها الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (NCAA)، لا يُطلب من الرياضيين التنازل عن
 حقوقهم القانونية المتعلقة بكوفيد-19 كشرط للمشاركة في الألعاب الرياضية.
- تلتزم مؤسسة التعليم العالي بالتوجيهات العامة لمؤسسات التعليم العالي وإرشادات الصحة العامة الحكومية والمحلية المتعلقة بالعزل والحجر الصحي للأفراد الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 والمخالطين المباشرين لهؤلاء الأفراد.

لا يُسمح بالمنافسة بين الفرق بدون متفرجين إلا إذا:

- يمكن لـ IHE توفير اختبار الكشف عن كوفيد-19 والنتائج في غضون 48 ساعة قبل المنافسة في الرياضات التي تنطوي على المخالطة عالية الخطورة. 4
- نظرت إدارات الألعاب الرياضية في أفضل السبل لتقديم ضمان معقول بأن نفس المخاطر قد تم در استها ومعالجتها بشكل مناسب
 من قبل الفرق الأخرى. وهذا يشمل النظر في كيفية مشاركة نتائج الاختبار وضمانات السلامة ذات الصلة مع الفرق المتنافسة قبل
 بدء الحدث بطريقة تتفق مع قوانين المعلومات الصحية والخصوصية التعليمية المعمول بها.
 - بالاشتراك مع مسؤولي الصحة العامة المحليين ومتتبعي المخالطة، يجب أن يكون لدى المدارس آلية لإخطار المدارس الأخرى
 في حالة ظهور نتيجة إيجابية لاختبار رياضي من أحد الفرق في غضون 48 ساعة بعد المنافسة مع فريق آخر.
- يجب على إدارات الألعاب الرياضية، بالتشاور مع القيادة المؤسسية، تقييم مدى توافر موارد تتبع المخالطين المحلية والوصول اليها. عندما يكون توافر موارد تتبع المخالطين المحلية غير كاف، يجب على المدارس تدريب العاملين في الموقع أو شراء موارد تتبع المخالطين. يمكن أن يكون الموظفون الذين يكملون تدريبًا رسميًا في تتبع المخالطين مورداً لا يقدر بثمن فيما يتعلق بجهود إدارة المخاطر المؤسسية والموارد.

هذه الإرشادات مؤقتة. تستند هذه الإرشادات والاعتبارات إلى أفضل بيانات الصحة العامة المتاحة في هذا الوقت، وأفضل الممارسات الدولية المستخدمة حاليًا، والحقائق العملية لإدارة العمليات؛ سيتم تحديث الإرشادات مع ظهور بيانات وممارسات جديدة. بالإضافة إلى ذلك، لا تعكس الإرشادات والاعتبارات النطاق الكامل للمشكلات التي ستحتاج برامج الألعاب الجامعية إلى معالجتها.

يُتوقع من مؤسسات التعليم العالي وإدارات الألعاب الرياضية اتباع المعايير المعتمدة من قبل NCAA، بما في ذلك <u>توجيهات NCAA لإعادة التكييف الاجتماعي للرياضات</u> ورأو مؤتمراتها الرياضية، إذا كان الأمر منطبقًا. إلى الحد الذي تفرض فيه هذه التوجيهات أو توجيهات إدارة الصحة المحلية قيودًا أو متطلبات إضافية تتجاوز هذه التوجيهات، أي أكثر صرامة من هذه التوجيهات، يجب على مؤسسات التعليم العالى وإدارات الألعاب الرياضية الالتزام بالمتطلبات الأكثر صرامة.

سيعتمد تنفيذ هذه التوجيهات كجزء من إعادة الفتح التدريجي على تحسين اتجاهات وبائية محلية أو مفضلة وتوافر قدرات الرعاية الصحية لموارد الاختبار الخاصة بـ IHE والمجتمع، وتأهب IHE الكافي للاستجابة للتحقيق في الحالات وحوادث التفشي. ينبغي اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بخطط IHE المخصصة بالتعاون مع مسؤولي الصحة العامة المحليين والسلطات الأخرى. قد يكون لدى إدارات الصحة العامة المحلية متطلبات أكثر صرامة من هذه التوجيهات والتي يجب اتباعها.

يجب أن يكون تنفيذ هذه الإرشادات مصممة خصيصًا لكل مكان، بما في ذلك الاعتبار الكافي للبرامج العاملة في كل مؤسسة واحتياجات الطلاب الرياضيين والعاملين. يجب على المسؤولين إشراك أصحاب المصلحة المعنيين - بما في ذلك الطلاب الرياضيين وأسر هم والموظفين وشركاء العمل في مجتمع المدرسة - لصياغة وتنفيذ الخطط.

حتى مع الالتزام بالتباعد البدني، فإن الاجتماع في مكان يجلب أشخاصًا من مجتمعات متعددة ومختلفة للمشاركة في نفس النشاط، وعلى الأخص الأنشطة الداخلية أو مع مخالطين مباشرين، ينطوي على مخاطر أعلى لانتقال فيروس كوفيد-19 على نطاق واسع، وقد يؤدي إلى زيادة معدلات العدوى ودخول المستشفى والوفاة، خاصة بين الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

ولذلك يجب أن تحد المرافق الرياضية من إشغال الموظفين الأساسيين، مثل اللاعبين والمدربين والأمن وموظفي الأحداث. ستقوم إدارة الصحة العامة المعامة في ولاية كاليفورنيا، بالتشاور مع إدارات الصحة العامة المحلية، بمراجعة وتقييم أثر هذه القيود المفروضة على الصحة العامة وتقديم مزيد من التوجيه كجزء من استعادة تدريجية للأنشطة الترفيهية.

الاستخدام المطلوب لأغطية الوجه


في 18 يونيو، أصدرت إدارة الصحة العامة في ولاية كاليفورنيا (CDPH) إرشادات حول استخدام أغطية الوجه، والتي تتطلب على نطاق واسع استخدام أغطية الوجه لكل من أفراد الجمهور والعاملين في جميع الأماكن العامة وأماكن العمل حيث يوجد خطر كبير من التعرض. يخضع جميع هؤلاء المشاركين في الألعاب الجامعية، بما في ذلك المدربين والموظفين ووسائل الإعلام والملاعبين الذين لا يشاركون في اللعب لهذه المتطلبات. يمكن العثور على تفاصيل أغطية الوجه في الصفحة 3 من هذه الإرشادات.

تم تحديد المجالات التالية على أنها قضايا شاملة يجب الالتزام بها عند التخطيط لاستئناف الألعاب الجامعية.

1. الخطة الخاصة بالمرفق الرياضي

- وضع خطة مكتوبة للوقاية من كوفيد-19 خاصة بالمنشأة في كل موقع، وإجراء تقييم شامل للمخاطر لجميع مجالات العمل والرياضة، مع تخصيص شخص في كل منشأة لتطبيق الخطة. ينبغي اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بخطط IHE المخصصة بالتعاون مع مسؤولي الصحة العامة المحليين والسلطات الأخرى.
- تعيين شخص مسؤول عن الاستجابة لمخاوف كوفيد-9[الخاصة بالألعاب الرياضية بشكل عام، ولكل فريق أو رياضة. يجب على جميع المدربين والموظفين والرياضيين معرفة الشخص الذي تتصل به المعني بكوفيد-9[وكيفية الاتصال به.
 - دمج إرشادات إدارة الصحة العامة في ولاية كاليفورنيا لاستخدام أغطية الوجه، في خطة خاصة بالمرفق الرياضي تتضمن سياسة للتعامل مع الاستثناءات.
- تحديد معلومات الاتصال الخاصة بإدارة الصحة المحلية حيث يوجد المرفق لتوصيل معلومات حول تفشي كوفيد-19 بين العمال والطلاب الرياضيين.
 - تدريب والتواصل مع العمال وممثلي العمال والطلاب الرياضيين بشأن الخطة وإتاحة الخطة للعمال وممثليهم.
 - تقييم المرفق بانتظام للتأكد من الامتثال للخطة والوثائق وتحديد أوجه القصور الصحيحة.
- التحقق من أي مرض كوفيد-19 وتحديد ما إذا كانت هناك أي عوامل تتعلق بالعمل أو تتعلق بالرياضة قد أسهمت في خطر العدوى. تحديث الخطة حسب الضرورة لمنع ظهور المزيد من الحالات.
 - تطبيق العمليات والبروتوكولات وفقًا لتوجيهات وزارة الصحة العامة لولاية كاليفورنيا وأوامر إدارة الصحة المحلية، إذا شهد مكان العمل تغشيًا.
 - الامتثال للإرشادات أدناه. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى أمراض قد تتسبب في إغلاق العمليات مؤقتًا أو تقييدها.

2. موضوعات إضافية لتدريب الطلاب الرياضيين والعمال



- المخاطر التي يشكلها كوفيد-19 على الرياضيين
 - الاستخدام السليم لأغطية الوجه، بما في ذلك:
- أغطية الوجه ليست من معدات الوقاية الشخصية (PPE).
- يمكن أن تساعد أغطية الوجه في منع تعرض الأشخاص بالقرب من مرتديها ومن يرتديها، ولكنها لا تحل
 محل الحاجة إلى التباعد الاجتماعي و غسل اليدين المتكرر.
 - يجب أن تغطي أغطية الوجه الأنف والفم.
 - يجب على العمال غسل اليدين أو تطهير ها قبل وبعد استخدام أغطية الوجه أو تعديلها.
 - تجنب لمس العينين والأنف والفم.
 - يجب عدم مشاركة أغطية الوجه ويجب غسلها أو التخلص منها بعد كل نوبة عمل.
- المعلومات الواردة في إرشادات إدارة الصحة العامة في ولاية كاليفورنيا لاستخدام أغطية الوجه، والتي تنص على
 الظروف التي يجب فيها ارتداء أغطية الوجه والاستثناءات، بالإضافة إلى أي سياسات وقواعد عمل وممارسات



- اعتمدها أصحاب العمل لضمان استخدام أغطية الوجه. يجب أن يشمل التدريب أيضًا سياسات مؤسسات التعليم العالى بشأن كيفية التعامل مع الأشخاص المستثنين من ارتداء غطاء الوجه.
- ينبغي أن يكون جميع الموظفين و العاملين و المدربين و الطلاب الرياضيين على دراية بنشاطهم اليومي و مخالطاتهم عالية الخطورة (في نطاق 6 أقدام لمدة 15 دقيقة على الأقل).
- قد يحق للعمال الحصول على معلومات عن صاحب العمل أو مزايا الإجازة التي ترعاها الحكومة والتي تجعل البقاء في المنزل أسهل من الناحية المالية. راجع المعلومات الإضافية عن البرامج الحكومية التي تدعم الإجازة المرضية وتعويضات العمال بسبب كوفيد-19، بما في ذلك حقوق الإجازة المرضية للعامل بموجب قانون كورونا الأول للاستجابة للعائلات وحقوق العمال في مزايا تعويض العمال وافتراض ارتباط كوفيد-19 بالعمل وفقًا للأمر التنفيذي رقم 10-62-10 الذي أصدره الحاكم أثناء سريان هذا الأمر.
 - أهمية التباعد الاجتماعي
 - بروتوكولات الإبلاغ عن أي أعراض
 - أي تغييرات خاصة بالمرفق

3. تدابير المكافحة الفردية والفحص

- وضع إجراءات فعالة للاختبار الدوري المنتظم للرياضيين والعاملين الذين يعملون مع الرياضيين للكشف عن كوفيد 19 وفقًا لأي توجيهات منشورة من قبل مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) وإدارة الصحة العامة بكاليفورنيا (CDPH) وفي المناقشة مع إدارة الصحة المحلية.
 - الحد من نقاط دخول المبنى أو المرفق متى أمكن.
- توفير فحوصات للأعراض وفحوصات صحية لجميع العمال والطلاب الرياضيين الذين يدخلون المرفق أو الحدث. التأكد من أن القائم بفحص درجة الحرارة/الأعراض يتجنب مخالطة العمال أو الطلاب الرياضيين إلى أقصى حد ممكن.
 - الفحص: ينبغي فحص الرياضيين والموظفين للكشف عن الحمى وأعراض كوفيد-19 أو التعرض قبل كل تمرين لرفع اللياقة أو اجتماع فريق أو تدريب أو منافسة
 - قياس درجة الحرارة للكشف عن الحمى (≥100.4° فهرنهايت)
- اسأل عما إذا كان لديهم سعال جديد، أو التهاب جديد في الحلق، أو ضيق في التنفس، أو بداية جديدة لفقدان حاسة التذوق أو الشم، أو القيء، أو الإسهال
 - اسأل عما إذا كانوا قد تعرضوا لحالة كوفيد-19 معروفة أو مشتبه بها في الأيام الـ 14 الماضية
 - إذا تطلب الأمر الفحص الذاتي في المنزل، وهو بديل مناسب لتقديمه في المؤسسة، فتأكد من إجراء الفحص قبل مغادرة العامل للمنزل لمناوبته واتباع إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.
 - يجب على العمال ارتداء القفازات عند مناولة المواد الملوثة بسوائل الجسم.
- يجب على المدربين أو الحكام الذين ينقلون الأشياء التي يستخدمها الرياضيون (على سبيل المثال، الكرات) أو يقومون بمناولة أكياس القمامة استخدام قفازات يمكن التخلص منها (وغسل اليدين قبل ارتدائها وبعد إزالتها) أو غسل اليدين قبل وبعد التعامل مع العناصر المشتركة.
 - الحد من أي زوار غير أساسيين أو موظفين أو متطوعين قدر الإمكان. لا يُسمح حاليًا بالمشاهدين أثناء التدريب أو المنافسة.

- يجب تأكيد وتنفيذ اختبارات كوفيد-19 الدورية المنتظمة للرياضيين وموظفي الدعم من قبل مؤسسات IHE التي تتفق على الحد الأدنى من معايير الاختبار التي تشمل معدل تكرار الاختبار، ومن الأشخاص الذين يخضعون للاختبار (جميع الرياضيين والموظفين الذين لديهم اتصال وثيق بالرياضيين)، وما نوع الاختبار الذي يتم إجراؤه، قبل العودة إلى التدريب.
- استنادًا إلى الأدلة والمعايير الحالية، يعد كل من اختبار المستضد اليومي واختبار PCR الدوري طرق اختبار مقبولة لكل من اختبار الفحص الأساسي والمستمر.
- في حالة اتباع بروتوكول اختبار مستضد يومي، يجب أن يبدأ البروتوكول باختبار PCR متبوعًا باختبار مستضد يومي. يجب أن يؤدي أي اختبار مستضد إيجابي النتيجة إلى إجراء اختبار PCR للتأكيد. اختبار PCR مطلوب للرياضيين والموظفين الذين تظهر عليهم الأعراض وينبغي إجراؤه في غضون 24 ساعة من الإبلاغ عن الأعراض.
- استراتيجيات الاختبار مرتبطة دائمًا بتوافر لوازم اختبار وافرة، وقدرة المختبر، ووقت المعالجة الفعال، وسهولة الوصول إلى الاختبار. إذا تم إعطاء الأولوية لاختبار PCR في المجتمع للأفراد الذين تظهر عليهم الأعراض (معايير أولوية الاختبار المحدثة على موقع CDPH الإلكتروني)، أو إذا لم يكن اختبار المستضد اليومي ممكنًا، أو إذا كانت لوازم اختبار PCR/وقت المعالجة غير موثوقين، أو مع تطور تقنية الاختبار، فقد تكون هناك حاجة لأن تؤخذ استراتيجيات بديلة بعين الاعتبار.
- لاحظ أن نتيجة اختبار PCR الإيجابية تشير إلى وجود الحمض النووي الرايبوزي (RNA) لفيروس SARS CoV-2 في تلك النقطة الزمنية، والذي يمكن أن يمثل عدوى حالية أو سابقة، وقد لا يشير إلى قابلية العدوى الحالية. يشير اختبار المستضد الإيجابي إلى وجود مستضد SARS-CoV-2 في تلك النقطة الزمنية، ومن المحتمل أن يشير إلى قابلية العدوى الحالية. من الممكن ظهور نتيجة سلبية في أي من الاختبارين إذا تم جمع العينة في وقت مبكر من الإصابة. من الممكن أيضًا الحصول على نتائج إيجابية كاذبة مع أي من الاختبارين.
 - يُسمح ببدء المنافسة بين الفرق بدون متفرجين فقط إذا:
- يمكن لـ IHE توفير اختبار كوفيد-19 والنتائج في غضون 48 ساعة من المنافسة في الرياضات التي تنطوي على مخالطة عالية الخطورة. 6

4. العزل والحجر الصحي

- من أجل المشاركة في ممارسة الرياضية أو المنافسة التي تتطلب الاحتكاك الجسدي، يجب على مؤسسات التعليم العالى ومديري الفرق الرياضية والرياضيين الالتزام بإجراءات العزل والحجر الصحى المناسبة.
- يجب أن يظل جميع الرياضيين والموظفين الذين تظهر عليهم الأعراض تحت العزل حتى تتوفر نتائج الاختبار،
 ويجب التفكير في تكرار الاختبار إذا كانت الاختبارات الأولية سلبية ولكن الأعراض مستمرة ومتوافقة مع أعراض كوفيد-19.
 - يجب على جميع الرياضيين والموظفين الذين أظهرت اختبار اتهم نتيجة إيجابية أو تم تشخيص إصابتهم سريريًا بمرض كوفيد-19 الخضوع للعزل:
 - لمدة 10 أيام بعد ظهور الأعراض لأول مرة (أو 10 أيام من جمع عينة الاختبار الذي أظهر أول نتيجة إيجابية)، و
 - مرور 24 ساعة على الأقل بدون حمى (زوال الحمى بدون استخدام الأدوية الخافضة للحرارة)، و
 - طرأ تحسن على الأعراض الأخرى.



- الأفراد الذين أظهرت اختباراتهم نتيجة إيجابية للإصابة بغيروس SARS-CoV-2 والذين لم تظهر عليهم أعراض على الإطلاق، يمكن أن يعودوا إلى العمل أو المدرسة بعد 10 أيام من تاريخ جمع عينة الاختبار الذي أظهر أول نتيجة إيجابية للإصابة بفيروس SARS-CoV-2.
- يجب على الأفراد الذين تم تحديدهم على أنهم من المخالطين المباشرين (في نطاق 6 أقدام لمدة 15 دقيقة على الأقل) اتباع توجيهات أو أو امر الصحة العامة الحكومية والمحلية أو أو امر الحجر الصحي، بغض النظر عن معدل تكرار الاختبار لمن هم في المجموعة أو المنطقة المتأثرة. يجب على المخالطين المباشرين القيام بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا منذ آخر تعرّض.

نظرًا لطبيعة المشاركة الرياضية، ستتخذ المؤسسات خطوات للمساعدة في تتبع المخالطات بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مراجعة تسجيلات التدريب، إذا كان ذلك متاحًا، والتقييم الموسع للمخالطة المرتبطة بالمشاركة الرياضية بحيث يمكن تحديد جميع المخالطين للرياضي.



5. الإرشادات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي

- تنظيف وتطهير شامل للأسطح في المناطق عالية الحركة، بما في ذلك غرف تغيير الملابس، والمخابئ، والمقاعد، ودر ابزين السلم، والكراسي، والأبواب/ مقابض الأبواب، وما إلى ذلك، حسب الاقتضاء.
- يجب تجنب استخدام الأشياء والمعدات المشتركة (مثل الكرات أو المضارب أو معدات الجمباز أو أعلام الجولف)
 أو تنظيفها بين كل فرد إن أمكن. لا تدع اللاعبين يشتركون في المناشف أو الملابس أو الأشياء الأخرى التي يستخدمونها لمسح وجوههم أو يديهم.
- تجنب مشاركة المعدات أو الكرات قدر الإمكان. بالنسبة للرياضات القابلة للتطبيق، يجب تدوير الكرات بشكل منتظم للحد من التلامس من قبل عدة مستخدمين حتى يتم تطهير ها. على سبيل المثال، في لعبة البيسبول والكرة اللينة، يجب أن يحد الحكام من ملامسة الكرة إلا إذا كانوا يرتدون قفازات، ويجب على الحكام استرداد الكرات الخاطئة والكرات الممررة حيثما أمكن ذلك. يجب عزل الكرات المستخدمة في الإحماء داخل الملعب/خارج الملعب عن حاوية كرة مشتركة.
 - التأكد من وجود إمدادات كافية من العناصر لتقليل مشاركة المعدات إلى أقصى حد ممكن، على سبيل المثال عن طريق وضع العلامات عليها وتخصيصها للأفراد (على سبيل المثال، المعدات الواقية والكرات والمضارب وزجاجات المياه)؛ خلاف ذلك، قصر استخدام الإمدادات والمعدات على مجموعة واحدة من اللاعبين في وقت واحد وتنظيفها وتطهيرها بين الاستخدام.
 - تحديد أحد الموظفين أو المتطوعين لضمان التنظيف والتطهير الملائمين للأدوات والمعدات، خاصة بالنسبة لأي معدات مشتركة أو أسطح يتم لمسها بشكل متكرر.
 - تنظيف الأسطح التي يمكن لمسها بين المناوبات أو بين المستخدمين، أيهما أكثر تكرارًا، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ساعات اللعبة، لوحات النتائج، المجارف، الساعات، الأقلام الشائعة لصفحات تسجيل الدخول وما إلى ذلك.
- تجنب مشاركة المعدات الصوتية والهواتف والأجهزة اللوحية والأقلام ومستلزمات العمل الأخرى حيثما أمكن ذلك.
- التوقف عن الاستخدام المشترك لسماعات الرأس وغيرها من المعدات بين العمال ما لم يكن من الممكن تطهير
 الجهاز بشكل صحيح بعد الاستخدام. استشارة الشركات المصنعة للمعدات لتحديد خطوات التطهير المناسبة، خاصة
 بالنسبة للأسطح الناعمة المسامية مثل أغطية الأذن الرغوية.
 - وضع وتنفيذ جدول زمني للتنظيف والتطهير الروتيني المتزايد.
- توفير الوقت للعمال لتنفيذ ممارسات التنظيف خلال مناوباتهم. يجب تعيين مهام التنظيف أثناء ساعات العمل كجزء من مهام عمل العمال.

- توفير خيارات لشركات التنظيف الخارجية للمساعدة في زيادة الطلب على التنظيف حسب الحاجة.
- التأكد من أن تظل المرافق الصحية دائمًا عاملة ومزودة بالمخزون وتوفير الصابون الإضافي والمناشف الورقية ومطهر اليدين عند الحاجة.
- عند اختيار مواد كيميائية مطهرة، يجب على الإدارات الرياضية استخدام المنتجات المعتمدة للاستخدام ضد كوفيد- 19 في القائمة المعتمدة من وكالة حماية البيئة واتباع تعليمات المنتج. استخدم المطهرات المصنفة على أنها فعالة ضد مسببات الأمراض الفيروسية الناشئة، أو محاليل التبييض المنزلية المخففة (5 ملاعق كبيرة لكل جالون من الماء)، أو محاليل كحولية تحتوي على 70% كحول على الأقل مناسبة للأسطح. تقديم تدريب العمال على المخاطر الكيميائية، وتوجيهات الشركة المصنعة، والتهوية المطلوبة، ومتطلبات إدارة السلامة والصحة المهنية في ولاية كاليفورنيا للاستخدام الأمن. يجب على العمال الذين يستخدمون المنظفات أو المطهرات ارتداء القفازات والمعدات الواقية الأخرى وفقًا لتعليمات المنتج. يجب الوفاء بمتطلبات إدارة تنظيم المبيدات الحشرية في ولاية كاليفورنيا للاستخدام الأمن للمطهرات. اتباع طرق تنظيف أكثر أمانًا من الربو التي أوصت بها إدارة الصحة العامة.
- يجب أن تزيد المرافق الداخلية من دوران الهواء النقي عن طريق فتح النوافذ أو الأبواب، إن أمكن. لا تفتح النوافذ والأبواب إذا كان القيام بذلك يشكل خطرًا على السلامة أو الصحة (على سبيل المثال، خطر السقوط أو ظهور أعراض الربو) للاعبين أو الأخرين الذين يستخدمون المرفق.
 - التفكير في تركيب منظفات هواء محمولة عالية الكفاءة، ورفع مستوى فلاتر الهواء في المبنى إلى أعلى كفاءة ممكنة، وإجراء تعديلات أخرى لزيادة كمية الهواء الخارجي والتهوية في جميع مناطق العمل.
 - تأكد من أن المساحات المغلقة للتدريب والألعاب هي مناطق داخلية كبيرة ذات تهوية جيدة وبها تبادل للهواء.
 - على سبيل المثال، قم بزيادة ترشيح الهواء المركزي لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء لأقصى درجة
 ممكنة (تصنيف المرشح المستهدف MERV 13 على الأقل).
 - تركيب موزعات المعقم اليدوي، إذا أمكن، في المداخل ومناطق عالية التلامس.
- اتباع إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها للتأكد من أن جميع أنظمة المياه آمنة للاستخدام بعد إغلاق المرفق لفترة طويلة لتقليل مخاطر الإصابة بمرض الفيالقة والأمراض الأخرى المرتبطة بالمياه.

6. الإرشادات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي

- إعطاء الأولوية للممارسة واللعب في الهواء الطلق، قدر الإمكان.
- إذا كان اختبار المستضد اليومي هو البروتوكول المعتمد، يمكن أن تتدرب الفرق في الهواء الطلق في مجموعات لا تزيد عن 75 شخصًا. يوصى بتقسيم الفرق، لأقصى درجة ممكنة، إلى مجموعات من 25 شخصًا.
- التدريب في مجموعات صغيرة. ينبغي أن تنشئ مؤسسات IHE مجموعات كاستراتيجية لتقليل الانتشار المحتمل لكوفيد-19. يمكن أن تتكون المجموعة من 25 شخصًا بحد أقصى، جميعهم أعضاء في نفس الفريق بما في ذلك المدربين والموظفين، الذين يمارسون التمارين ويشاركون في الأنشطة معًا باستمرار. ينبغي أن تتجنب كل مجموعة الاختلاط بالمجموعات الأخرى.
 - افصل بين المجموعات المختلفة إلى أقصى حد ممكن. ضع في اعتبارك استخدام العلامات أو الأقماع أو الشرائط لتوضيح خطوط التقسيم.
 - خاصة بالنسبة للرياضيين الذين يمارسون الرياضات عالية خطر التلامس على النحو المحدد سابقًا، إلى أقصى حد ممكن عمليًا، يتم توفير أماكن مخصصة داخل الحرم الجامعي وفصول در اسية منفصلة عن باقي الحرم الجامعي لتقليل مخاطر الانتقال أثناء التدريب والتكييف.
 - يجب أن يحافظ الرياضيون و المدربون على مسافة ستة أقدام على الأقل من الآخرين عندما لا يكونون في ميدان
 اللعب أو يشاركون في اللعب/النشاط، حيثما كان ذلك ممكنًا.



- اترك مسافة معقولة بين اللاعبين عند شرح التدريبات أو قواعد اللعبة أو التجمع للتشاور.
- تحدید عدد اللاعبین الذین یجلسون في مناطق جلوس اللاعبین المحصورة (على سبیل المثال، المخبأ) من خلال السماح للاعبین بالانتشار في مناطق المتفرج إذا توفر مساحة أكبر.
- حظر التلامس الجسدي غير الضروري مثل الأطفال دون سن الخامسة وخطوط المصافحة وغيرها من أشكال التلامس الجسدي مع الزملاء والفرق المقابلة والمدربين والحكام والمشجعين. يجب على المدربين مراجعة قواعد التباعد الاجتماعي بانتظام مع الرياضيين.
 - التفكير في توفير أدلة مادية، مثل اللافتات والشريط اللاصق على الأرضيات أو الملاعب، للتأكد من أن
 المدربين واللاعبين لا يز الون على مسافة ستة أقدام على الأقل.
 - الحفاظ على مسافة ستة أقدام على الأقل بين اللاعبين أثناء المشاركة في الرياضة كلما أمكن (على سبيل المثال، أثناء الإحماء وأنشطة بناء المهارات وتمارين المحاكاة).
 - يجب على المسؤولين الحفاظ على مسافة ستة أقدام من الأخرين وعند التفاعل مع الرياضيين والمدربين خارج الملعب. يجب أن يتجنب المسؤولون تبادل الوثائق أو المعدات مع اللاعبين والمدربين. قد يتطلب ذلك إدخالًا رقميًا للتشكيلات وتعديلات أخرى.
- إذا كان يجب مشاركة مرافق التدريب أو المنافسة، التفكير في زيادة مقدار الوقت بين الممارسات والمسابقات للسماح لمجموعة واحدة بالمغادرة قبل دخول مجموعة أخرى إلى المرفق. بالنسبة للمرافق التي يمكن مشاركتها مع مجتمع الحرم الجامعي الأوسع، تخصيص وقتًا منفصلاً لاستخدام الفريق. إذا أمكن، ترك وقت التنظيف و/أو التطهير.
 - يجب استخدام بروتوكو لات التباعد الاجتماعي في أي مناطق عالية الكثافة وعالية الحركة.
- ينبغي إجراء الاجتماعات والتدريبات لأكثر من 25 شخصًا بشكل افتراضي، ويمكن أن تشمل الاجتماعات بالحضور الشخصي 25 شخصًا كحد أقصى. ينبغي أن تعقد الاجتماعات في الهواء الطلق وفي المناطق التي تسمح بالتباعد الجسدي المناسب بين الموظفين أو الرياضيين أو غير هم من العاملين.
 - تناوب فترات الاستراحة، وفقًا للوائح الأجور والساعات عند الاقتضاء، للالتزام ببروتوكو لات التباعد الاجتماعي.
 - النظر في تزويد العمال الذين يطلبون تعديل المهام بخيارات تقلل من اتصالهم باللاعبين والمدربين والمسؤولين والعمال الأخرين.

7. الأطعمة وتناول الطعام

- ينبغي على جميع اللاعبين والمدربين والحكام إحضار زجاجات المياه أو الشراب الخاصة بهم. ينبغي وضع ملصق على زجاجة الشرب باسم صاحبها. لا توفر مبردات مياه جماعية أو محطات شرب مشتركة. يمكن أن يعطى الفريق أيضًا مياه معلبة.
 - إذا تم تقديم طعام، الحرص على توفير صناديق أو أكياس معبأة مسبقًا للاعبين بدلاً من بوفيه أو وجبة عائلية.
 - حظر استخدام:
 - علب توابل ذاتية الخدمة، وأو عية للأواني، والمناديل، والأغطية، والشفاطات، وأباريق الماء، والحاويات الجاهزة، وما إلى ذلك.
 - o آلات الخدمة الذاتية، بما في ذلك موز عات الثلج والصودا والزبادي المجمد، وما إلى ذلك.
 - مناطق الطعام ذاتية الخدمة، مثل البوفيهات، وبارات الصلصة، وبارات السلطة، وما إلى ذلك.
 - اتباع إرشادات السلامة الخاصة بإدارة الصحة العامة وإدارة السلامة والصحة المهنية في ولاية كاليفورنيا بشأن مطاعم تناول الطعام في الداخل.





8. السفر أثناء المنافسة

- يجب أن يقتصر السفر على الموظفين الأساسيين (على سبيل المثال، الرياضيون والمدربون وفريق العمل الطبي).
 - يجب أن تقود الفرق إلى الأحداث متى أمكن ذلك.
- في حالة استخدام أكثر من مركبة، يجب تقسيم أطراف السفر وفقًا لأولئك الذين بينهم اختلاط بالفعل (على سبيل المثال، المجموعات).
 - يجب ارتداء أغطية الوجه وإزالتها بحد أدنى للطعام أو الشرب.
- في حالة السفر بالحافلة، محاولة إيقاء المقاعد مفتوحة أمام وخلف كل شخص (على سبيل المثال، باستخدام نمط "رقعة الشطرنج").
- عندما يكون السفر بالطائرة ضروريًا، يجب أن يكون على شركة نقل ذات أساليب قوية لمكافحة العدوى (على سبيل المثال، أغطية الوجه المطلوبة لجميع الركاب وموظفي الرحلة)، ويجب أن يتم غسل اليدين أو استخدام مطهر اليدين بشكل متكرر، وفقًا لإرشادات مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها.
 - عند السفر إلى المباريات الخارجية، يجب أن تظل الفرق في مجموعة ضمن نطاق الفريق دون اختلاط بالفرق المحلية أو أعضاء آخرين من المجتمع المضيف.

0

9. العودة إلى المرفق أو التدريب بعد اختبار إيجابي

- إبلاغ الموظفين والطلاب الرياضيين المرضى بعدم العودة حتى يستوفوا معايير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها لوقف العزل المنزلي، بما في ذلك 24 ساعة بدون حمى (بدون أدوية خافضة للحمى)، وتحسن الأعراض، و10 أيام منذ ظهور الأعراض لأول مرة أو منذ إجراء الاختبار.
- يجب أن يعمل الطلاب الرياضيون مع مقدم الخدمات الطبية وأي عضو في الفريق الطبي لتحديد كيفية الحصول على تصريح للعودة إلى التدريب بأمان. يجب أن تسمح العودة إلى النشاط في جميع الحالات بعملية التأقلم.
 - قد تنظر إدارات الصحة المحلية في التوقف عن التدرب بالحضور الشخصي والمنافسة لبقية الموسم إذا كانت نتيجة اختبار أكثر من 10% من الرياضيين في الفريق إيجابية خلال فترة 14 يومًا. بالنسبة للفرق التي تضم أقل من 20 رياضيًا في المجموع، إذا كانت نتيجة اختبار أكثر من 5 أعضاء إيجابية، يمكن النظر في التوقف عن التدرب بالحضور الشخصي والمنافسة لبقية الموسم.



10. التواصل والتوعية العامة

يجب أن تلتزم مؤسسات IHE بتطوير وتنفيذ خطة للتواصل، أو إجراء إضافات للخطط الحالية، والتي تتناول الحد من المخاطر في مجتمع الحرم الجامعي والخريجين وقاعدة المعجبين الأوسع فيما يتعلق باتباع طرق أكثر أمانًا للاستمتاع باللعبة أو المنافسة (التباعد الجسدي، والكمامات، وضرورة الالتزام بأوامر وتوجيهات الصحة العامة المحلية فيما يتعلق بأي تجمعات أو أحداث في كل من الألعاب المحلية والخارجية) وتوزيع هذه الرسائل في أوضاع متعددة (وسائل التواصل الاجتماعي والتقليدي) قبل وأثناء العرض التلفزيوني للأحداث الرياضية.

ا توفر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها معلومات إضافية محددة إلى الجامعات والكليات .

2 ما لم يتم الاستثناء بموجب إرشادات الولاية لأماكن عامة محددة

3 ما لم يتم توجيهك بخلاف ذلك من قبل أحد العاملين أو مقدم الرعاية الصحية

4 تعتمد هذه الإرشادات تصنيف "الرياضة عالية الخطورة" المحدد في إرشادات الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات لإعادة دمج الرياضات في المجتمع التي تشمل: كرة السلة، وهوكي الحقل، وكرة القدم، والاسكواش، والكرة الطائرة، والكرة الكائرة، والكرة المائية، والمصارعة.

⁵ <u>الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (NCAA)</u>: إعادة دمج الرياضة الجامعية في المجتمع: وضع معايير للممارسة والمنافسة.7/16/20.

6 راجع أعلاه.



