Farmácia de Manipulação e ao Paciente:

- O Paciente está ciente de que deverá ser consultado ao término das formulações descritas, e as mesmas deverão ser manipuladas de acordo com a posologia de cada prescrição e limitada a duração do tratamento descrito abaixo.
- As Formulações descritas abaixo são personalizadas e foram elaboradas exclusivamente para o presente tratamento, com base na avaliação clínica e exames do paciente e de acordo com as suas necessidades e objetivos.
- Sua reprodução total ou parcial, sem nova avaliação médica e prescrição atualizada, não está autorizada, nos termos da Resolução CFM nº 1.974/2011 e RDC nº 67/2007 da ANVISA.
- O uso sem acompanhamento do médico prescritor ou por terceiros não é recomendado, e exime este profissional de responsabilidades.

Duração do Tratamento: 30 dias
CID: N484 + E291 + F90 + F41.2 + E14 + E66.0

Acido Cloridrico 10% - 60ml - 2 frascos de 30 ml
Pingar 5 gotas em um copo com 10ml de água (1 dedo) e tomar 30 min Antes do Almoço
Pingar 5 gotas em um copo com 10ml de água (1 dedo) e tomar 30 min Antes do Jantar

---

Solução de Lugol 5%
1 Frasco de 30 ml
Pingar 5 gotas em um copo com 10ml de água (1 dedo) e tomar 30 min Antes do Café Manhã

T3 10mcg
1 dose VO – Em Jejum
1 dose VO - Após Almoço - Sugestão À tarde - 14h

T4 30mcg
1 dose VO – Em Jejum (Não se alimentar por 15 minutos)

Zinco Bisglicinato 30mg
Selênio Bisglicinato 300mcg
Boro Bisglicinato 1,5mg
Anastrozol 0,5mg
Cobre quelado 0,5mg
Cromo Picolinato 250mcg
Manganês quelado 5mg
Molibdênio quelado 0,5mg
Vanádio quelado 0,5mg
Coleus Forskohlii 100mg
Fucus Vesiculosus 25mg
Kelp Iodine 200mcg
TirÀ osina 200mg
1 doses VO – “Durante” o Café da Manhã

Ferro Bisglicinato 50mg
Vitamina C (Ester-C® ou Lipossomal) 50 mg
Vitamina A (Retinol Palmitato) 1.000 UI
Vitamina B1 (Tiamina) 50 mg
Vitamina B2 (Riboflavina-5-fosfato) 10 mg
Vitamina B3 (Hexanicotinato de Inositol – NO FLUSH) 25mg
Vitamina B6 Inativa (Piridoxina) 25 mg
Vitamina B6 Ativa (Piridoxal-5-fosfato P-5-P) 25mg
Vitamina B9 Inativa (Ácido Fólico) 1mg
Vitamina B9 Ativa (Metilfolato) 15mg
Vitamina B12 Ativa (Metilcobalamina) 1.500mcg
Vitamina E (Tocoferol Acetato) 100ui
Vitamina K2 (MK-7) 250mcg
Inulina qsp 500mg
Famotidina 2,5mg
Cápsulas XR Liberação Entérica + Matriz Liberação Lenta (DRcaps® ou HPMC)
Usar Excipientes como: HPMC, Ethocel e Celulose Microcristalina
**Observação.: Evitar ingerir junto às refeições, de café, chá preto ou laticínios
1 doses VO – “Durante” o Jantar

Solução de iodeto de potássio (KI) 150 mcg/gota
Solução em glicerina vegetal/água purificada?conservantes compatíveis)
Frasco conta-gotas 20 mL (≈600 gotas)
Diluir 2 gotas em 50ml de água e tomar Antes do Café Manhã

Iodeto de potássio (KI) 150 mcg
Selenometionina 100 mcg
Cápsula Vegetal - Excipiente q.s.
1 doses VO – “Durante” o Café Manhã

Mio-inositol qsp 500 mg

1 doses VO – “Durante” o Jantar

Silimarina 100mg
L-Metionina 50mg
L-Cisteina 25mg (Anidra)
Cynara Scolymus 125mg (Extrato Seco)
Peumus Boldus 50mg (Extrato Seco)
Baccharis trimera 50mg
Inositol 75mg
2 doses VO – Antes Almoço
2 doses VO - Antes do Jantar

FÓRMULA 1 – BLEND “PANAX DUO” (CÁPSULA)
Panax ginseng (asiático) extrato padronizado 5–7% ginsenosídeos 150 mg
Cápsulas Liberação Entérica + Matriz Liberação Lenta (DRcaps® ou HPMC)
Usar Excipientes como: HPMC, Ethocel e Celulose Microcristalina
1 dose VO – Antes do Café da Manhã
1 dose VO – À Tarde – Sugestão: 14h

FÓRMULA 2 – “PANAX NOTOGINSENG” ISOLADO (CÁPSULA)
Panax notoginseng extrato padronizado ≥10% notoginsenosídeos 120 mg
Cápsulas Liberação Entérica + Matriz Liberação Lenta (DRcaps® ou HPMC)
Usar Excipientes como: HPMC, Ethocel e Celulose Microcristalina
1 dose VO – Antes do Café da Manhã
1 dose VO – À Tarde – Sugestão: 14h
Dopaminérgicos

Dimesilato de Lisdexanfetamina 15mg
Cápsulas Liberação Entérica + Matriz Liberação Lenta (DRcaps® ou HPMC)
Usar Excipientes como: HPMC, Ethocel e Celulose Microcristalina
1 dose VO – Antes do Café da Manhã
1 dose VO – À Tarde – Sugestão: 14h

Sibutramina 5mg
Cápsulas Liberação Entérica + Matriz Liberação Lenta (DRcaps® ou HPMC)
Usar Excipientes como: HPMC, Ethocel e Celulose Microcristalina
1 dose VO – À Tarde – Sugestão: 14h
1 dose VO – 2h Antes do Jantar - Sugestão: 18h

Cortisol Isomolecular 10mg
1 dose VO - Ao Acordar
1 dose VO – A tarde - Sugestão: 17h

Bupropiona 180mg
Topiramato 20mg
Cápsulas XR Liberação Entérica + Matriz Liberação Lenta (DRcaps® ou HPMC)
Usar Excipientes como: HPMC, Ethocel e Celulose Microcristalina
1 dose VO – 2h Antes do Almoço - Sugestão: 10h
1 dose VO – 2h Antes do Jantar - Sugestão: 18h

Naltrexone 15mg
Bromoprida 1,5mg
Famotidina 5mg
Zinco quelado 15mg
Selenio quelado 200mcg
Cápsulas XR Liberação Entérica + Matriz Liberação Lenta (DRcaps® ou HPMC)
Usar Excipientes como: HPMC, Ethocel e Celulose Microcristalina
1 dose VO – 2h Antes do Almoço - Sugestão: 10h
1 dose VO – 2h Antes do Jantar - Sugestão: 18h

Picolinato Cromo 500mcg
Dapaglifozina 2,5mg
Cafeina Anidra 200mg
Green Coffee 200mg
Berberina 300mg
1 dose VO - 10 min Antes do Almoço

Cascara Sagrada 250mg
Senne 100mg
Aloina 100mg
1 dose VO - 10 min Antes do JantarL-Theanina 50mg

Passiflora 150mg
Rhodiola 100mg
Funcho (Foeniculum vulgare) extrato 50mg
Melissa officinalis (erva-cidreira) extrato 5:1 25mg

Camomila (Matricaria recutita) extrato 4:1 100mg
Espinheira-santa (Maytenus ilicifolia) extrato 100mg
1 dose VO – 2h Antes do Almoço - Sugestão: 10h
1 dose VO – 2h Antes do Jantar - Sugestão: 18h

Picolinato Cromo 500mcg
Pimenta Caiena (Capsaicina) 5mg
Cascara Sagrada 200mg
Aloina 50mg
Orlistat 80mg
Faseolamina 300mg
1 dose VO - 30 min Antes do Almoço
1 dose VO - 30 min Antes do Jantar

Lactase 9000 FCC - Digestão eficiente da lactose
DPP-IV (Dipeptidil Peptidase-IV) 200 mg - Degradação de glúten e peptídeos inflamatórios
Bile bovina purificada - 300 mg - Reposição de sais biliares, auxilia digestão de gordura
Lipase 5000 FIP - Digestão de gorduras sem vesícula
Amilase 15000 DU - Digestão de carboidratos (especialmente glúten)
Protease 20000 HUT - Melhora quebra de proteínas alimentares
Betaína HCl - 250 mg - Aumenta acidez gástrica, potencializa digestão
Gengibre extrato seco padronizado - 100 mg - Pró-digestivo, melhora esvaziamento gástrico
Berberina cloridrato 100 mg - Melhora disbiose e contribui para regulação intestinal
Cápsulas XR Liberação Entérica + Matriz Liberação Lenta (DRcaps® ou HPMC)
Usar Excipientes como: HPMC, Ethocel e Celulose Microcristalina
1 dose VO – 15 min - Antes Almoço
1 dose VO – 15 min - Antes Jantar

Ortopedia

Fórmula 1 – Dores articulares, fortalecimento tendíneo e hidratação intracapsular
UC-II (Colágeno tipo II não desnaturado) 20mg
Ácido Hialurônico 50mg
MSM (Metilsulfonilmetano) 250mg
Boswellia serrata extrato padronizado (65% AKBA) 150mg
Curcumina fitossomada (Meriva®) 100mg
Vitamina K2-MK7 50mcg
Silício orgânico (Exsynutriment®) 25mg
1 dose VO – No Café da Manhã
1 dose VO – Antes do Jantar

Fórmula 2 – Ferro bisglicinato (uso no almoço, com vitamina C e cofatores de absorção)
Ferro bisglicinato 15 mg
Vitamina C (ácido ascórbico) 150mg
Ácido fólico (metilfolato) 250 mcg
Lactobacillus plantarum (para otimizar biodisponibilidade do ferro) 0,5 bilhão UFC (Liofilizado)
Polifenóis de romã (Punica granatum, extrato seco padronizado) 50mg
Quercetina 50mg
1 dose VO – No Café da Manhã
1 dose VO – Antes do Jantar

Fórmula 3 – Neuropatia periférica, regeneração nervosa e suporte mitocondrial
Vitamina B1 (Benfotiamina) 300 mg
Vitamina B6 (Piridoxal-5-fosfato) 50 mg
Vitamina B9 Ácido fólico - Forma Ativa (5-MTHF) 400 mcg
Vitamina B12 (metilcobalamina) 1000 mcg
Ácido Alfa-Lipóico 300 mg
Acetil-L-Carnitina 500 mg
N-Acetilcisteína 300 mg
Coenzima Q10 (ubiquinona ou ubiquinol) 100 mg
Magnésio treonato 100 mg
Cápsulas XR Liberação Entérica + Matriz Liberação Lenta (DRcaps® ou HPMC)
Usar Excipientes como: HPMC, Ethocel e Celulose Microcristalina
1 dose VO – 15 min - Antes Café Manhã
1 dose VO – 15 min - Antes Jantar

Vasotônicos e Circulação

Furosemida 10mg
Potássio (KCl) 30mg
Magnésio Taurato 150mg
Dente-de-leão (Taraxacum officinale) extrato seco 300mg
Cavalinha (Equisetum arvense) extrato seco 250mg
Urtica dioica extrato seco 200mg

Hibiscus sabdariffa extrato seco 200mg
Chá-verde (Camellia sinensis – EGCG 60%) 150mg
Coenzima Q10 75mg
1 dose VO – Pela Manhã – Sugestão: 10h
1 dose VO – À Tarde – Sugestão: 14h

Diosmina micronizada 600 mg
Hesperidina micronizada 150 mg
Rutina 100 mg
Ginkgo biloba (24% flavonoides, 6% lactonas) 180 mg
Vitis vinifera (OPCs ≥ 95%) 200 mg
Centella asiatica extrato seco (asiaticosídeos ≥ 40%) 200 mg
Nattokinase fibrinolítica ativa 200 mg
Pycnogenol® (extrato de Pinus pinaster) 100 mg
Cápsulas XR Liberação Entérica + Matriz Liberação Lenta (DRcaps® ou HPMC)
Usar Excipientes como: HPMC, Ethocel e Celulose Microcristalina
1 dose VO – Pela Manhã – Sugestão: 10h
1 dose VO – À Tarde – Sugestão: 14h

BioSil® (ácido ortossilícico estabilizado com colina) 10mg
DIM (Diindolilmetano) 100 mg
Cyanotis Vaga Extrato (Ecdisterona 90%) 75 mg
Quercetina 200mg
Gamma Oryzanol 100 mg
1 dose VO - De manhã e 1 dose VO - À Noite
MODULADORES HORMONAIS

Raloxifeno 60 mg
Posologia:
1 dose VO - Antes Café Manhã

Observação : Por 90 dias

Tamoxifeno 15mg
Posologia:
1 dose VO - Antes Café Manhã
1 dose VO - Antes Jantar

Observação:
Usar Por 30 dias - Usar junto com Raloxifeno apenas nos primeiros 30 dias
Depois seguir apenas com Raloxifeno

Cabergolina 0,25mg
Dutasterida 0,5 mg
Tadalafila 20mg
Vardenafila 2,5mg
1 dose VO – Pela Manhã - Apenas na : Segunda - Quarta - Sexta

---

Oxandrolona 2,5mg
NADH 2,5mg
Comprimido Sublingual
1 dose SL - De manhã e 1 dose SL - À tarde e 1 dose SL - À Noite

---

Oximetolona 5mg
1 dose VO - De manhã
PERFORMANCE FÍSICA

Mesterolona 15mg
Fenum Graecum e.s. 50mg
Long Jack 150mg
Epimedium Icarin 25mg
Gama oryzanol 12,5mg
Cava q10 50mg
Tadalafil 10mg
NADH 5mg
1 dose VO – Antes do Café da Manhã

Fenum Graecum e.s. 100mg
Long Jack 200mg
Epimedium Icarin 300mg
Gama oryzanol 100mg
Tadalafil 10mg
1 dose VO – Antes do Café da Manhã

Paroxetina 10mg
Icariin (Epimedium padronizado) 200 mg
Hypericum Perforatum 150mg
Withania Somnifera 250mg

2 Doses VO - Durante Café Manhã e 2 doses - Antes do Jantar

Fosfatidilserina 100mg
Colina 100mg
Taurina 100mg
Tirosina 250mg Ácido fólico 500mcg
1 dose VO – Antes do Café da Manhã

Tadalafila 10mg
NADH 5mg
1 dose VO – Antes do Café da Manhã

Beta Alanina 6g
L-Citrulina Malato 6g
Cafeína Anidra 350mg
L-Tirosina 2g
Taurina 2g
Colina Bitartrato 500mg
Aroma Agradável Natural (Baunilha/Camomila/Tangerina/Limão) qsp
Edulcorante natural: Estévia + Eritritol (1:1) qsp
Sem lactose, sem glúten, sem açúcar. Não contém corantes artificiais
Dissolver 1 Sachê em 200ml de água e ingerir 20 min antes do treino

---

Beta-hidroxi-beta-metilbutirato (HMB) 1g
Creatina monohidratada micronizada 2g
L-citrullina malato 1.5g
Ecdisterona (90%) 150 mg
Leucina 1.500 mg
Vitamina D3 5.000 UI
Magnésio quelado (bisglicinato) 150 mg
Potássio citrato 100 mg
Aroma Agradável Natural (Baunilha/Camomila/Tangerina/Limão) qsp
Edulcorante natural: Estévia + Eritritol (1:1) qsp
Sem lactose, sem glúten, sem açúcar. Não contém corantes artificiais
Dissolver 1 Sachê em 200ml de água e ingerir 20 min antes do treino

---

Cafeína Anidra 200mg
Green Coffee 150mg
Cynara scolymus 50g
Zingiber officinale qsp 500mg
1 dose VO – Antes do Café Manhã
1 dose VO - 30 min antes do treino

Extrato de Beterraba (padronizado em nitratos) 350 mg
L-Tirosina 350mg
Gengibre Extrato Seco 100mg
1 dose VO – Antes do Café da Manhã
1 dose VO - À tarde - 15h

Ashwagandha KSM-66 350mg
L-Theanina 100mg
Passiflora 150mg
Maca 200mg
Mucuna 200mg
Rhodiola Rosea 300mg
1 dose VO – No Café da Manhã
1 dose VO – Apos Almoço - Sugestão: 16h

Ashwagandha (KSM-66® ~5% withanolides) 200mg
Schisandra chinensis *(≥2% schisandrinas)* extrato padronizado 200 mg
Rhodiola rosea extrato padronizado *(≥3% rosavinas, ≥1% salidrosídeo)* 300 mg
1 dose VO – Antes do Café da Manhã
1 dose VO - À tarde - 15h

Saw Palmetto 200mg
Tansulosina 0,25
Finasteride 0,5mg
1 dose VO - Antes do Jantar ou Antes de dormir

Magnésio Dimalato 200mg
Magnésio Treonato qsp 500mg
1 Doses VO - Durante Café Manhã e 1 dose VO - Antes de Dormir

---

Silimarina 200mg
DL-Metionina 100mg
L-Cisteína 50mg (Anidra)
Cynara Scolymus 150mg (Extrato Seco)
Peumus Boldus 150mg (Extrato Seco)

Baccharis Trimera 100mg
Inositol 100mg
1 doses VO – Antes Almoço e 1 dose VO - Antes do Jantar

Vitamina D3 10.000ui (Colecalciferol)
Vitamina A 10.000ui (Acetato de Retinol)
Vitamina E 200ui (Tocoferol Acetato)
Vitamina K2 300mcg (MK-7)
Cápsulas Oleosas
1 Doses VO - Durante Café Manhã

Vitamina B3 100mg (Hexanicotinato de Inositol – NO FLUSH)
Vitamina B6 200mg
Vitamina B9 1mg (Ácido Fólico)
Vitamina B9 20mg (Metilfolato)
Vitamina B12 2.000mcg (Metilcobalamina)
1 doses VO – 1 hora Antes de Dormir

Nutricolin® 100mg
Queratina 50mg
Cisteína 50mg
Cistina 25mg
Vitamina H (Biotina) 10mg
Vitamina B1 75 mg (Tiamina)
Vitamina B2 12,5 mg (Riboflavina)
Vitamina B5 100 mg (Pantotenato Cálcio)
Actrisave 100mg
PQQ 10mg
1 doses VO – Antes do Jantar (Cápsulas de Gelatina Rosa)

Minoxidil oral baixa dose (LDOM) 1,5mg
Posologia:
1 dose VO - Antes de Dormir

Dutasterida 0,5 mg
Posologia:
1 dose VO - Antes de Dormir - Apenas : Segunda - Quarta - Sexta

---

FÓRMULA A — Finasterida tópica “HPCH” (uso diário)
Finasterida 0,25% (1 mg/mL)
Minoxidil 5%
Veículo HPCH (hidroxipropil-quitosana) Solução filmógena q.s.p. 60 mL
Aplicar 0,5 (10 gotas) mL à noite, somente na linha anterior do couro cabeludo (hairline) todos os dias.

FÓRMULA B — Dutasterida tópica lipossomal (3×/semana)
Dutasterida 0,02% (0,2 mg/mL).
Veículo lipossomal/hidroalcoólico leve q.s.p. 30 mL.
Aplicar 0,5 mL na hairline, seg/qua/sex à noite (dias alternados em relação à A).

PRESCRIÇÃO — BLEND ÚNICO FÓRMULA C
Finasterida 0,05% (0,5 mg/mL).
Dutasterida 0,01% (0,1 mg/mL).
Veículo HPCH + lipossomas q.s.p. 60 mL.
Aplicar 0,4–0,5 mL na hairline à noite, 5–6×/semana

Loção capilar 60 mL – Circulação e Nutrição local
Arginina 2%
Extrato glicólico de Beterraba (rico em nitratos) 5%
Cafeína 1%
Nicotinato de metila 0,1%
Centella asiática extrato padronizado 2%
Veículo hidroalcoólico q.s.
Posologia:
Aplicar 1 mL (20 gotas) no couro cabeludo 1 - 2 vezes /dia
Massageando por 2 - 3 minutos

L-Arginina 250mg
L-Citrulina 250mg
Extrato seco de Beterraba padronizado (2% nitratos) 250mg
Ginkgo Biloba extrato padronizado (24% ginkgoflavonóides) 80mg
Cava Q10 25mg
Posologia:
1 dose VO - Pela Manhã
1 dose VO - À tarde - 15h

Nootrópicos

Invermectina 12mg
Tinidazol 250mg

1 semana - 1 Ciclo - Segunda - Terça - Quarta
1 dose VO - Durante o Café Manha
1 dose VO - Durante o Jantar
2 semana - 2 Ciclo - Segunda - Terça - Quarta
1 dose VO - Durante o Café Manha
1 dose VO - Durante o Jantar
3 semana - 3 Ciclo - Segunda - Terça - Quarta
1 dose VO - Durante o Café Manha
1 dose VO - Durante o Jantar
4 semana - 4 Ciclo - Segunda - Terça - Quarta
1 dose VO - Durante o Café Manha
1 dose VO - Durante o Jantar

Tiabendazol 2%
Benzoato Benzila 15%
Invermectina 1%
Enxofre 1%
Lidocaína 1%
Mentol 0,5%
Prometazina 1%
Loção Cremosa 200ml
Aplicar de Manhã - Na área afetada e em volta da área afetada
Aplicar à Noite - Na área afetada e em volta da área afetada

Bacopin (20% bacosídeos) 250mg
Teacrine 100mg
Gingko Biloba 120mg
Vimpocetina 10mg
1 dose VO – Antes do Café Manhã
1 dose VO – À Tarde – Sugestão: 14h

Antioxidantes

Ácido Alfa Lipóico 300mg
Cápsulas Gastrorresistentes
1 dose VO – Antes do Café Manhã
1 dose VO – Antes Jantar

Piperina 5mg
Curcuma Longa 300mg
1 dose - Antes do Almoço
1 dose - Antes de Jantar

Trimetilglicina 500mg (Betaína Anidra)
1 dose - Antes de Jantar
Indutores Sono

Solução com Psicotrópicos (Restauração do Sono Imediata)

Alprazolam	2mg		
Trazodona	25mg	A) Usar conforme:	ORIENTAÇÃO MÉDICA !
Zolpidem	10mg	B) Gotejar somente a:	QUANTIDADE NECESSÁRIA

Produzir em frascos para 30 dias – Se duração tratamento > 30 dias produzir mais frascos para 30 dias
Sorbitol Sublingual qsp 0,5ml para garantir um SONO SEM INTERRUPÇÃO !
Pingar de 2 à 10 gotas - SL (Embaixo da língua) – 1h antes de dormir

---

L-triptofano 150mg
L-Theanina 200mg
Magnésio Bisglicinato 200mg
Passiflora 200mg
GABA 150mg
Apigenina (matricária/camomila) 35mg
Magnolia officinalis extrato (honokiol/magnolol) 100 mg
Piridoxal-5-Fosfato 25mg
Fosfatidilserina 125mg
Melatonina DUO 1,5mg
1 dose VO – 1 hora Antes de Dormir

SACHÊ NOTURNO - BLEND NOTURNO - PRÓ SONO
Glicina 2g
Taurina 1g
L-Glutamina 3g
Mio-Inositol 2g
Magnésio (elementar) 220 mg proveniente de blend
Magnésio bisglicinato (≈60% do Mg elementar)
Magnésio taurato (≈25% do Mg elementar).
Magnésio L-treonato (≈15% do Mg elementar).
Aroma Agradável Natural (Limão) qsp
Edulcorante natural: Estévia + Eritritol (1:1) qsp
Sem lactose, sem glúten, sem açúcar. Não contém corantes artificiais

Dissolver 1 Sachê em 200ml de água e ingerir 1h antes de dormir
Observação : *Farmácia: ajustar os sais para atingir ~220 mg Mg elementar.*
Por exemplo: bisglicinato + taurato + L-treonato conforme teor do fornecedor

---

Cápsula Balanço Vasomotor
Cimicifuga racemosa (extrato padronizado) 40mg
Magnólia (extrato) 200mg
L-Teanina 200mg
Safranal (açafrão - extrato padronizado) 30mg
Vitamina E (d-alfa tocoferol) 200UI
1 dose VO – Antes Café Manhã
1 dose VO – Antes Jantar

Trifolium pratense (Trevo-vermelho – 40 mg isoflavonas) 150mg
Cimicifuga racemosa (extrato padronizado) 40mg
Withania somnifera (Ashwagandha KSM-66®) 150mg
Magnolia officinalis (extrato) 200 mg
Passiflora incarnata (extrato) 150 mg
Gamma-oryzanol 100mg
Salvia officinalis (extrato) 100mg
Pycnogenol® (Pinus pinaster) 25mg
1 dose VO – Antes Café Manhã
1 dose VO – Antes Jantar

Progesterona Bioidentica Micronizada 15mg
Estriol - Estradiol Micronizada 2mg-0,5mg/ml
HRT Base 30g
Aplicar 1 Pump (1ml) – Aplicar na Face Interna do antebraço ou coxas À NOITE

Progesterona Bioidentica Micronizada 20mg
HRT Base 30g
Aplicar 1 Pump (1ml) – Do 15 O ao 30 O dia do Mês - Aplicar na Face Interna do antebraço ou coxas À NOITE

Estriol - Estradiol Micronizada 4mg-1mg/ml
HRT Base 30g
Aplicar 1 Pump (1ml) – Do 1 O ao 14 O dia do Mês - Aplicar na Face Interna do antebraço ou coxas À NOITE

Testosterona Bioidentica Micronizada 5mg
HRT Base 30g
Aplicar 1 Pump (1ml) – Aplicar na Face Interna do antebraço ou coxas DE MANHÃ

OBSERVAÇÃO em relação à HIDRATAÇÂO !

Solução "MINERAL BALANCE SHIELD"

Como preparar ?
- Para cada 1 Litro de Água acrescente:
- 1 Colher de Café (rasa) de: * Sal Rosa do Himalaia
- 1 Colher de Café (rasa) de: * Bicarbonato de Sódio

Como Ingerir ?

- Tomar 1 Litro da Solução MINERAL BALANCE de Água : Ao Longo da Manhã
- Tomar 1 Litro da Solução MINERAL BALANCE de Água : À Tarde e no Final da Tarde

---

SUPLEMENTOS PARA ADQUIRIR EM LOJAS DA INTERNET

A) CREATINA MARCA VITAFOR - Creafort Creatina Creapure - 300g
Dissolver 2 Scoops (6g) em 100ml (1/2 Copo) de Água, e Ingerir pela Manhã
B) Manteiga Ghee Clarificada Lotus 500g - Sem Lactose e Sem Sal
- Utilizar para cozinhar os alimentos e/ou para Preparar o Café a Prova de Balas
C) MCT - Triglicerídeos de Cadeia Média (TCM) - Com AGE 250ml
- Para Preparar o Café a Prova de Balas

BULLETPROOF COFFEE

O café à prova de balas (Bulletproof Coffee) é uma bebida energética e saciante, popular em dietas e jejum intermitente.feita pela mistura de café forte com manteiga sem sal e óleo MCT (ou óleo de coco).
Ingredientes :
- 250 a 300 ml de café preto forte: Café Normal Forte ou recém-passado de grãos de alta qualidade
- 1 a 2 colheres de sopa de manteiga sem sal: Manteiga ghee (manteiga clarificada
- 1 a 2 colheres de chá (ou sopa) de óleo MCT ou óleo de coco:
Modo de Preparo :

- Prepare o café: Coe o café de forma tradicional, garantindo que ele esteja bem quente
- Misture: Com um Mini Mexer dissolva a manteiga ghee e o óleo coco (ou o óleo MCT) até que a mistura fique cremosa, espumosa e com uma aparência de latte
- Sirva: Beba imediatamente para aproveitar a textura e o calor.

---

*FASE 1 - ASSENTAMENTO ROBUSTO - SIMBIÓTICO (MESES 1 E 2)
Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) 10^10 UFC
Bifidobacterium lactis BB-12 10^10 UFC
Lactobacillus reuteri DSM 17938 10^9 UFC
Goma guar parcialmente hidrolisada (PHGG) 3 g
Vitamina C 50 mg
Dissolver 1 sachê em 250ml de água e ingerir a noite (Pode ocorrer intolerância intestinal nos primeiros 7 dias)

Adjuvante de barreira intestinal (pó ou sachê)
L-Glutamina 5 g
Zinco carnosina 37,5 mg
N-acetilglucosamina 500 mg
Dissolver 1 sachê em 250ml de água e ingerir a noite (Pode ocorrer intolerância intestinal nos primeiros 7 dias)

---

*FASE 2 - RECONSTRUÇÃO E DIVERSIDADE - RECOLONIZAÇÃO (MESES 3 E 4)
Lactobacillus plantarum 299v 10^10 UFC
Bifidobacterium longum subsp. longum 10^10 UFC
Bifidobacterium breve 10^9 UFC
Galacto-oligossacarídeos (GOS) 2 g
Inulina 2 g
Dissolver 1 sachê em 250ml de água e ingerir a noite (Pode ocorrer intolerância intestinal nos primeiros 7 dias)

Sódio/magnésio butirato 300–600 mg
1 dose VO - À noite - Antes de dormir

---

*FASE 3 - CONSOLIDAÇÃO E MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO (MESES 5 E 6)
Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) 10^10 UFC
Bifidobacterium lactis HN019 10^9 UFC
Lactobacillus reuteri DSM 17938 10^9 UFC
FOS (fruto-oligossacarídeos) 2 g
Amido resistente (RS2/RS3) 3 g
Dissolver 1 sachê em 250ml de água e ingerir a noite (Pode ocorrer intolerância intestinal nos primeiros 7 dias)

Dieta de suporte (resumo).
Reduzir glúten/açúcar simples por 12–24 semanas.
Incrementar fibras solúveis (aveia, psyllium, leguminosas bem demolhadas).
Fermentados tolerados (kefir/coalhada) 3–4×/semana.
Proteína adequada, ômega-3 e polifenóis (açafrão, chá verde).

FASE 1 - ASSENTAMENTO ROBUSTO (MESES 1 E 2)
Resumo para o paciente. Nesta etapa vamos “assentar” bactérias mais resistentes e estabilizar o intestino.

Objetivo é reduzir gases, regular o trânsito e fortalecer a barreira intestinal para receber maior diversidade depois.
PROBIÓTICO Fase 1(A) - CÁPSULAS LIOFILIZADAS GASTRO-RESISTENTES
Lactiplanti Bacillus plantarum 299v 10 bilhões de UFC por cápsula
Lacticasei Bacillus rhamnosus GG 10 bilhões de UFC por cápsula
Limos Lactobacillus reuteri DSM 17938 5 bilhões de UFC por cápsula
Bifidobacterium lactis HN019 10 bilhões de UFC por cápsula
Bifidobacterium longum BB536 5 bilhões de UFC por cápsula
Bacillus coagulans IS2 2 bilhões de UFC por cápsula
1 dose VO – Antes do Café da Manhã
1 dose VO – Antes de dormir
PROBIÓTICO Fase 1(B) - CÁPSULAS LIOFILIZADAS GASTRO-RESISTENTES
SACCHAROMYCES BOULARDII 250mg (Fórmula Separada)
1 dose VO – Antes do Café da Manhã
1 dose VO – Antes de dormir
PREBIÓTICO Fase 1(C) - SACHÊ MONODOSE
PHGG guar parcialmente hidrolisada 6 g por sachê
GOS galacto-oligossacarídeos 3 g por sachê
Dissolver 1 sachê em 250ml de água e ingerir a noite (Pode ocorrer intolerância intestinal nos primeiros 7 dias)

FASE 2 - RECONSTRUÇÃO E DIVERSIDADE (MESES 3 E 4)
Resumo para o paciente. Agora ampliaremos a “Obra”:
Trazemos novas espécies e aumentamos a diversidade, melhorando digestão, absorção e controle da inflamação.
PROBIÓTICO Fase 2(A) - CÁPSULAS LIOFILIZADAS GASTRO-RESISTENTES
Lacticasei Bacillus paracasei 8700:2 10 bilhões de UFC por cápsula
Lactobacillus gasseri 5 bilhões de UFC por cápsula
Bifidobacterium breve M-16V ou BR03 10 bilhões de UFC por cápsula
Bifidobacterium bifidum 5 bilhões de UFC por cápsula
Lactiplanti Bacillus plantarum 299v 5 bilhões de UFC por cápsula

Bacillus coagulans IS2 2 bilhões de UFC por cápsula
1 dose VO – Antes do Café da Manhã
1 dose VO – Antes de dormir
PROBIOTICO Fase 2(B) - CÁPSULAS LIOFILIZADAS GASTRO-RESISTENTES
SACCHAROMYCES BOULARDII 250mg (Fórmula Separada)
1 dose VO – Antes de dormir
PREBIÓTICO Fase 2(C) - SACHÊ MONODOSE
GOS galacto-oligossacarídeos 5 g por sachê
Inulina 2 g por sachê
Dissolver 1 sachê em 250ml de água e ingerir a noite (Pode ocorrer intolerância intestinal nos primeiros 7 dias)
FASE 3 - CONSOLIDAÇÃO E MANUTENÇÃO (MESES 5 E 6)
Resumo para o paciente. Fase de "Acabamento:
Consolidamos o equilíbrio, reduzimos cápsulas quando possível e priorizamos a manutenção sustentável.
PROBIÓTICO Fase 3(A) - CÁPSULAS LIOFILIZADAS GASTRO-RESISTENTES
Lactiplanti Bacillus plantarum 299v 10 bilhões de UFC por cápsula
Lacticasei Bacillus rhamnosus GG 5 bilhões de UFC por cápsula
Lacticasei Bacillus paracasei 8700:2 5 bilhões de UFC por cápsula
Bifidobacterium longum BB536 10 bilhões de UFC por cápsula
Bifidobacterium lactis HN019 5 bilhões de UFC por cápsula
1 dose VO – Antes do Café da Manhã
1 dose VO – Antes de dormir
PROBIÓTICO Fase 3(B) - CÁPSULAS LIOFILIZADAS GASTRO-RESISTENTES
SACCHAROMYCES BOULARDII 250mg (Fórmula Separada)
1 dose VO – Antes de dormir
PREBIÓTICO Fase 3(C) - SACHÊ MONODOSE
Amido resistente RS2 5 g por sachê
Arabinogalactana 2 g por sachê
PHGG 3 g por sachê
Dissolver 1 sachê em 250ml de água e ingerir a noite (Pode ocorrer intolerância intestinal nos primeiros 7 dias)

ANEXO TÉCNICO E LEGAL – MANIPULAÇÃO, PROBIÓTICOS, RECOMENDAÇÕES AO PACIENTE E POLÍTICA DE CONTROLADOS (REVALIDAÇÃO EM ATÉ 60 DIAS)
Observações Técnicas para o Laboratório de Manipulação.
• Evitar cápsulas convencionais sem revestimento, pois provocam liberação imediata dos ativos.
• Quando disponível, preferir microgrânulos/pellets com revestimento polimérico (liberação por difusão).
• Objetivo: liberação sustentada dos ativos por até 12 horas, reduzindo efeitos adversos e otimizando o efeito terapêutico.
Resumo Técnico – Cápsulas de Liberação Prolongada (XR).
• Solicito manipulação em cápsula de liberação prolongada (XR) apenas para as substâncias especificadas nesta prescrição.
• Excipientes recomendados para liberação controlada: HPMC, ethocel e celulose microcristalina.
• Preferir cápsulas DRcaps® ou revestimento gastrorresistente polimérico.
• Objetivo: liberação gradual dos ativos por 8–12 horas.
Resumo Técnico – Cápsulas Liofilizadas (Probióticos).
• Cepas especificadas por código: 299v, GG, DSM 17938, HN019, BB536, IS2 (ou equivalentes com laudo).
• Garantir CFU no fim da validade (não apenas na fabricação); laudos de viabilidade por lote.
• Cápsulas gastro-resistentes (ex.: DRcaps® ou entéricas).
• Envase com dessecante e frasco opaco. Headspace minimizado; opção de nitrogênio recomendada.
• Armazenamento 2–8 °C (ou ≤25 °C se o fornecedor garantir estabilidade). Umidade relativa <50%.
• S. boulardii em frasco separado das bactérias.
• Rótulo: cepas, CFU/cápsula, data de fabricação, validade, CFU garantidos na validade, conservação e alerta de uso concomitante com antifúngicos.
Recomendações ao Paciente com Doenças Autoimunes.
• Iniciar com metade da dose por 3–5 dias e, se bem tolerado, subir à dose cheia.
• Hidratação de 2–3 L/dia; pode-se utilizar sal rosa do Himalaia (1 colher de café rasa por litro de água).
• Se usar antibiótico, tomar o probiótico 2–3 h após cada dose.
• Evitar antifúngicos sistêmicos durante o uso de S. boulardii.
• Pacientes imunossuprimidos ou com cateter venoso não devem usar S. boulardii.
• Acompanhar TSH, T4 Livre, T3 Livre, Anti-TPO e Anti-Tg a cada 8–12 semanas conforme quadro clínico.
• Sinais de alerta: dor abdominal intensa, febre ou diarreia persistente → contatar o médico.
Política para Medicamentos Controlados (Substâncias sob Controle Especial) – Revalidação em até 60 dias.
• Todo medicamento sujeito a controle especial não será prescrito de forma indefinida/contínua.
• O paciente deve realizar consulta periódica (presencial ou por telemedicina regulamentada) para revalidação clínica da prescrição em até 60 dias.
• Essa diretriz atende à segurança do paciente e aos prazos máximos de tratamento por prescrição definidos pela Portaria SVS/MS nº 344/1998.
Orientações Formais à Farmácia (Manipulação/Dispensação).
• Não aviar receitas de controlados fora dos prazos legais ou sem posologia/quantidade em conformidade com a Portaria 344/98.
• Quando houver previsão normativa, doses acima dos limites devem vir com justificativa clínica; observar normas locais.
• Receitas devem ser originais, legíveis, com dados completos do prescritor e do paciente e dentro da validade.
• Respeitar a validade nacional das receitas (Lei nº 13.732/2018), sem prejuízo dos prazos máximos de tratamento da Portaria 344/98.
Orientações Formais ao Paciente sob uso de Medicamentos Controlados.
• Ainda que seja portador de doença crônica, é obrigatória a consulta periódica para revalidação da prescrição de controlados.
• Intervalo máximo entre consultas no Instituto Pádua: 60 dias.
• Teleconsulta é aceita quando cabível, validada pelo médico e registrada em prontuário.
• Ausência de reavaliação no prazo impede a renovação da receita por responsabilidade ética e legal.
Base Legal e Respaldo Técnico.
• Resolução CFM nº 1.974/2011 – Ato privativo do médico prescrever/renovar receitas; vedada a terceiros a alteração ou reprodução sem consentimento.
• Resolução CFM nº 2.217/2018 (Código de Ética Médica) – Vedado prescrever sem avaliação adequada; responsabilidade ética na prescrição.

• Resolução CFM nº 2.314/2022 – Telemedicina: válida quando atendidos requisitos técnicos, registros e consentimentos.
• Portaria SVS/MS nº 344/1998 – Define controle especial e prazos máximos por prescrição (ex.: 30–60 dias conforme lista; exceções específicas podem atingir 180 dias).
• RDC ANVISA nº 67/2007 – Boas Práticas de Manipulação em Farmácias.
• Lei nº 5.991/1973 – Controle sanitário do comércio de medicamentos.
• Lei nº 13.021/2014 – Farmácia como estabelecimento de saúde; dispensação depende de prescrição válida e adequada.
• Lei nº 13.732/2018 – Validade nacional das receitas (não altera prazos máximos da Portaria 344/98).