

Caio César de Oliveira
Diabetes em pessoas adultas entre 30 e 60 anos.


Seleção e Estruturação Multidimensional de Atributos

A seleção de atributos provenientes da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS 2019) foi estruturada através de uma abordagem multidimensional, fundamentada no método CAPTO (ZÁRATE et al., 2023). Para garantir que o modelo de mineração de dados capta a natureza multifatorial da diabetes, as variáveis foram organizadas em quatro domínios apoiados pela literatura:

- **Dimensão Sociodemográfica:** Integra variáveis como idade, sexo, escolaridade e rendimento, essenciais para mapear as fortes desigualdades no acesso à saúde e no consumo alimentar associadas às doenças crônicas no Brasil.
- **Dimensão de Hábitos Alimentares (Núcleo):** Contrapõe o consumo de alimentos protetores à ingestão de ultraprocessados, justificando-se pelo forte impacto da matriz alimentar no controle glicêmico e metabólico.
- **Dimensão de Estilo de Vida e Antropometria:** Incorpora indicadores de sedentarismo, esforço físico e medidas corporais (peso e altura).
- **Dimensão de Saúde Clínica e Mental:** Aborda o paciente de forma integral, monitorizando a multimorbilidade (como a hipertensão arterial) e o impacto de sintomas depressivos e distúrbios do sono na gestão da doença.

Por fim, a variável alvo do modelo — o diagnóstico autorreferido de diabetes — foi definida com base na sua elevada validade científica e forte concordância com os exames de hemoglobina glicada na população (MALTA et al., 2021). Esta estruturação garante a extração de padrões robustos e clinicamente relevantes pelos algoritmos.

Mapa Conceitual



Descrição Atributo do Mapa Conceitual

Descrição do Atributos – Domínio de problema: Diabetes

Base de dados: Pessoas Saudáveis e Doentes entre 30 e 60 anos que responderam toda a PNS

Dimensão: Hábitos Alimentares

Referencial teorico (artigos científicos)	Variavel observacional (codigo e descricao)	Estatisticas descritivas da variavel
Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes (American Diabetes Association) ; Consumo de alimentos não saudáveis (Claro et al.) + Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional (Louzada et al.)	P006 - Em quantos dias da semana o(a) Sr(a) costuma comer feijão?	Escala de mensuracao: Ordinal Valor mínimo: 0 Valor máximo: 7 Media aritmetica: 5.1707 Desvio padrao: 2.2425 Moda: 7.0 Distribuicao de frequencias: 7.0: 10500 (51.20%) ; 3.0: 2270 (11.07%) ; 5.0: 1913 (9.33%) ; 2.0: 1714 (8.36%) ; 4.0: 1215 (5.92%) ; 6.0: 1151 (5.61%) ; 1.0: 977 (4.76%) ; 0.0: 769 (3.75%)
Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes (American Diabetes Association) ; Consumo de alimentos não saudáveis (Claro et al.) + Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional (Louzada et al.)	P00601 - Ontem o(a) Sr(a) comeu arroz, macarrão, polenta, cuscuz ou milho verde.	Escala de mensuracao: Nominal Valor mínimo: Não se aplica Valor máximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 1.0 Distribuicao de frequencias: 1.0: 18791 (91.62%) ; 2.0: 1718 (8.38%)
Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes (American Diabetes Association) ; Consumo de alimentos não saudáveis (Claro et al.) + Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional (Louzada et al.)	P00602 - Batata comum, mandioca/aipim/macaxeira, cará ou inhame.	Escala de mensuracao: Nominal Valor mínimo: Não se aplica Valor máximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 2.0 Distribuicao de frequencias: 2.0: 11806 (57.56%) ; 1.0: 8703 (42.44%)
Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes (American Diabetes Association) ; Consumo de alimentos não saudáveis (Claro et al.) + Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional (Louzada et al.)	P00603 - Feijão, ervilha, lentilha ou grão de bico.	Escala de mensuracao: Nominal Valor mínimo: Não se aplica Valor máximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 1.0 Distribuicao de frequencias: 1.0: 16484 (80.37%) ; 2.0: 4025 (19.63%)
Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes (American Diabetes Association) ; Consumo de alimentos não saudáveis (Claro et al.) + Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional (Louzada et al.)	P00604 - Carne de boi, porco, frango, peixe	Escala de mensuracao: Nominal Valor mínimo: Não se aplica Valor máximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 1.0 Distribuicao de frequencias: 1.0: 18981 (92.55%) ; 2.0: 1528 (7.45%)
Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes (American Diabetes Association) ; Consumo de alimentos não saudáveis (Claro et al.) + Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional (Louzada et al.)	P00605 - Ovo (frito, cozido ou mexido).	Escala de mensuracao: Nominal Valor mínimo: Não se aplica Valor máximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 2.0 Distribuicao de frequencias: 2.0: 11734 (57.21%) ; 1.0: 8775 (42.79%)
Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes (American Diabetes Association) ; Consumo de alimentos não saudáveis (Claro et al.) + Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional (Louzada et al.)	P00607 - Alface, couve, brócolis, agrião ou espinfre.	Escala de mensuracao: Nominal Valor mínimo: Não se aplica Valor máximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 2.0 Distribuicao de frequencias: 2.0: 10524 (51.31%) ; 1.0: 9985 (48.69%)
Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes (American Diabetes Association) ; Consumo de alimentos não saudáveis (Claro et al.) + Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional (Louzada et al.)	P00608 - Abóbora, cenoura, batata doce ou quiabo/caruru.	Escala de mensuracao: Nominal Valor mínimo: Não se aplica Valor máximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 2.0 Distribuicao de frequencias: 2.0: 12558 (61.23%) ; 1.0: 7951 (38.77%)
Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes (American Diabetes Association) ; Consumo de alimentos não saudáveis (Claro et al.) + Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional (Louzada et al.)	P00609 - Tomate, pepino, abobrinha, berinjela, chuchu ou beterraba.	Escala de mensuracao: Nominal Valor mínimo: Não se aplica Valor máximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 1.0 Distribuicao de frequencias: 1.0: 12615 (61.51%) ; 2.0: 7894 (38.49%)
Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes (American Diabetes Association) ; Consumo de alimentos não saudáveis (Claro et al.) + Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional (Louzada et al.)	P00610 - Mamão, manga, melão amarelo ou pequi.	Escala de mensuracao: Nominal Valor mínimo: Não se aplica Valor máximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 2.0 Distribuicao de frequencias: 2.0: 13943 (67.98%) ; 1.0: 6566 (32.02%)

Referencial teorico (artigos científicos)	Variavel observacional (codigo e descricao)	Estatisticas descritivas da variavel
Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes (American Diabetes Association) ; Consumo de alimentos não saudáveis (Claro et al.) + Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional (Louzada et al.)	P00611 - Laranja, banana, maçã, abacaxi.	Escala de mensuracao: Nominal Valor mínimo: Não se aplica Valor máximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 1.0 Distribuicao de frequencias: 1.0: 12241 (59.69%) ; 2.0: 8268 (40.31%)
Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes (American Diabetes Association) ; Consumo de alimentos não saudáveis (Claro et al.) + Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional (Louzada et al.)	P00613 - Amendoim, castanha de caju ou castanha do Brasil/Pará	Escala de mensuracao: Nominal Valor mínimo: Não se aplica Valor máximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 2.0 Distribuicao de frequencias: 2.0: 17886 (87.21%) ; 1.0: 2623 (12.79%)
Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes (American Diabetes Association) ; Consumo de alimentos não saudáveis (Claro et al.) + Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional (Louzada et al.)	P00617 - Salgadinho de pacote ou biscoito/bolacha salgado.	Escala de mensuracao: Nominal Valor mínimo: Não se aplica Valor máximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 2.0 Distribuicao de frequencias: 2.0: 15918 (77.61%) ; 1.0: 4591 (22.39%)
Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes (American Diabetes Association) ; Consumo de alimentos não saudáveis (Claro et al.) + Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional (Louzada et al.)	P00618 - Biscoito/bolacha doce ou recheado ou bolo de pacote.	Escala de mensuracao: Nominal Valor mínimo: Não se aplica Valor máximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 2.0 Distribuicao de frequencias: 2.0: 16032 (78.17%) ; 1.0: 4477 (21.83%)
Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes (American Diabetes Association) ; Consumo de alimentos não saudáveis (Claro et al.) + Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional (Louzada et al.)	P00619 - Sorvete, chocolate, gelatina, flan ou outra sobremesa industrializada.	Escala de mensuracao: Nominal Valor mínimo: Não se aplica Valor máximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 2.0 Distribuicao de frequencias: 2.0: 16946 (82.63%) ; 1.0: 3563 (17.37%)
Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes (American Diabetes Association) ; Consumo de alimentos não saudáveis (Claro et al.) + Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional (Louzada et al.)	P00620 - Salsicha, linguiça, mortadela ou presunto.	Escala de mensuracao: Nominal Valor mínimo: Não se aplica Valor máximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 2.0 Distribuicao de frequencias: 2.0: 15173 (73.98%) ; 1.0: 5336 (26.02%)
Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes (American Diabetes Association) ; Consumo de alimentos não saudáveis (Claro et al.) + Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional (Louzada et al.)	P00621 - Pão de forma, de cachorro-quente ou de hambúrguer.	Escala de mensuracao: Nominal Valor mínimo: Não se aplica Valor máximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 2.0 Distribuicao de frequencias: 2.0: 14242 (69.44%) ; 1.0: 6267 (30.56%)
Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes (American Diabetes Association) ; Consumo de alimentos não saudáveis (Claro et al.) + Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional (Louzada et al.)	P00622 - Margarina, maionese, ketchup ou outros molhos industrializados.	Escala de mensuracao: Nominal Valor mínimo: Não se aplica Valor máximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 2.0 Distribuicao de frequencias: 2.0: 11192 (54.57%) ; 1.0: 9317 (45.43%)
Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes (American Diabetes Association) ; Consumo de alimentos não saudáveis (Claro et al.) + Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional (Louzada et al.)	P00623 - Macarrão instantâneo, sopa de pacote, lasanha congelada ou outro prato congelado comprado pronto industrializado.	Escala de mensuracao: Nominal Valor mínimo: Não se aplica Valor máximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 2.0 Distribuicao de frequencias: 2.0: 19309 (94.15%) ; 1.0: 1200 (5.85%)
Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes (American Diabetes Association) ; Consumo de alimentos não saudáveis (Claro et al.) + Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional (Louzada et al.)	P00901 - Em quantos dias da semana, o(a) Sr(a) costuma comer pelo menos um tipo de verdura ou legume (sem contar batata, mandioca, cará ou inhame) como alface, tomate, couve, cenoura, chuchu, berinjela, abobrinha?	Escala de mensuracao: Ordinal Valor mínimo: 0 Valor máximo: 7 Media aritmetica: 4.5432 Desvio padrao: 2.3628 Moda: 7.0 Distribuicao de frequencias: 7.0: 7883 (38.44%) ; 3.0: 3033 (14.79%) ; 2.0: 2492 (12.15%) ; 5.0: 2095 (10.22%) ; 4.0: 1606 (7.83%) ; 0.0: 1252 (6.10%) ; 1.0: 1175 (5.73%) ; 6.0: 973 (4.74%)
Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes (American Diabetes Association) ; Consumo de alimentos não saudáveis (Claro et al.) + Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional (Louzada et al.)	P01001 - Em geral, o(a) Sr(a) costuma comer esse tipo de verdura ou legume:	Escala de mensuracao: Nominal Valor mínimo: Não se aplica Valor máximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 1.0 Distribuicao de frequencias: 1.0: 6928 (63.26%) ; 2.0: 3838 (35.05%) ; 3.0: 185 (1.69%)

Referencial teorico (artigos científicos)	Variavel observacional (codigo e descricao)	Estatísticas descritivas da variavel
Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes (American Diabetes Association) ; Consumo de alimentos não saudáveis (Claro et al.) + Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional (Louzada et al.)	P01101 - Em quantos dias da semana o(a) Sr(a) costuma comer carne vermelha (boi, porco, cabrito, bode, ovelha etc.)?	Escala de mensuracao: Ordinal Valor mínimo: 0 Valor máximo: 7 Media aritmetica: 3.4668 Desvio padrao: 1.9826 Moda: 3.0 Distribuicao de frequencias: 3.0: 5051 (24.63%) ; 2.0: 3989 (19.45%) ; 7.0: 2850 (13.90%) ; 4.0: 2780 (13.56%) ; 5.0: 2129 (10.38%) ; 1.0: 1839 (8.97%) ; 0.0: 1135 (5.53%) ; 6.0: 736 (3.59%)
Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes (American Diabetes Association) ; Consumo de alimentos não saudáveis (Claro et al.) + Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional (Louzada et al.)	P013 - Em quantos dias da semana o(a) Sr(a) costuma comer frango/galinha?	Escala de mensuracao: Ordinal Valor mínimo: 0 Valor máximo: 7 Media aritmetica: 2.8841 Desvio padrao: 1.6757 Moda: 2.0 Distribuicao de frequencias: 2.0: 5724 (27.91%) ; 3.0: 5478 (26.71%) ; 1.0: 2419 (11.79%) ; 4.0: 2405 (11.73%) ; 5.0: 1622 (7.91%) ; 0.0: 1194 (5.82%) ; 7.0: 1117 (5.45%) ; 6.0: 550 (2.68%)
Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes (American Diabetes Association) ; Consumo de alimentos não saudáveis (Claro et al.) + Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional (Louzada et al.)	P015 - Em quantos dias da semana o(a) Sr(a) costuma comer peixe?	Escala de mensuracao: Ordinal Valor mínimo: 0 Valor máximo: 7 Media aritmetica: 1.1184 Desvio padrao: 1.4320 Moda: 0.0 Distribuicao de frequencias: 0.0: 8761 (42.72%) ; 1.0: 6151 (29.99%) ; 2.0: 2921 (14.24%) ; 3.0: 1360 (6.63%) ; 4.0: 484 (2.36%) ; 5.0: 377 (1.84%) ; 7.0: 314 (1.53%) ; 6.0: 141 (0.69%)
Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes (American Diabetes Association) ; Consumo de alimentos não saudáveis (Claro et al.) + Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional (Louzada et al.)	P018 - Em quantos dias da semana o(a) Sr(a) costuma comer frutas?	Escala de mensuracao: Ordinal Valor mínimo: 0 Valor máximo: 7 Media aritmetica: 3.9578 Desvio padrao: 2.4297 Moda: 7.0 Distribuicao de frequencias: 7.0: 5970 (29.11%) ; 3.0: 3359 (16.38%) ; 2.0: 3074 (14.99%) ; 0.0: 2091 (10.20%) ; 5.0: 2018 (9.84%) ; 4.0: 1776 (8.66%) ; 1.0: 1473 (7.18%) ; 6.0: 748 (3.65%)
Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes (American Diabetes Association) ; Consumo de alimentos não saudáveis (Claro et al.) + Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional (Louzada et al.)	P019 - Em geral, quantas vezes por dia o(a) Sr(a) come frutas?	Escala de mensuracao: Ordinal Valor mínimo: 1 Valor máximo: 3 Media aritmetica: 1.5575 Desvio padrao: 0.6724 Moda: 1.0 Distribuicao de frequencias: 1.0: 4763 (54.52%) ; 2.0: 3076 (35.21%) ; 3.0: 897 (10.27%)
Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes (American Diabetes Association) ; Consumo de alimentos não saudáveis (Claro et al.) + Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional (Louzada et al.)	P02501 - Em quantos dias da semana o(a) Sr(a) costuma comer alimentos doces como biscoito/bolacha recheado, chocolate, gelatina, balas e outros?	Escala de mensuracao: Ordinal Valor mínimo: 0 Valor máximo: 7 Media aritmetica: 1.5699 Desvio padrao: 2.0125 Moda: 0.0 Distribuicao de frequencias: 0.0: 9291 (45.30%) ; 2.0: 3200 (15.60%) ; 1.0: 3059 (14.92%) ; 3.0: 2055 (10.02%) ; 7.0: 1287 (6.28%) ; 4.0: 746 (3.64%) ; 5.0: 646 (3.15%) ; 6.0: 225 (1.10%)
Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes (American Diabetes Association)	P02601 - Considerando a comida preparada na hora e os alimentos industrializados, o(a) Sr(a) acha que o seu consumo de sal é:	Escala de mensuracao: Ordinal Valor mínimo: 1 Valor máximo: 5 Media aritmetica: 3.1404 Desvio padrao: 0.6548 Moda: 3.0 Distribuicao de frequencias: 3.0: 13609 (66.36%) ; 4.0: 4291 (20.92%) ; 2.0: 1843 (8.99%) ; 5.0: 491 (2.39%) ; 1.0: 275 (1.34%)
Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes (American Diabetes Association) ; Consumo de alimentos não saudáveis (Claro et al.) + Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional (Louzada et al.)	P02602 - Em quantos dias da semana o(a) Sr(a) costuma substituir a refeição do almoço por lanches rápidos como sanduíches, salgados, pizza, cachorro quente, etc?	Escala de mensuracao: Ordinal Valor mínimo: 0 Valor máximo: 7 Media aritmetica: 0.4102 Desvio padrao: 1.0313 Moda: 0.0 Distribuicao de frequencias: 0.0: 16446 (80.19%) ; 1.0: 1757 (8.57%) ; 2.0: 1291 (6.29%) ; 3.0: 567 (2.76%) ; 4.0: 161 (0.79%) ; 7.0: 128 (0.62%) ; 5.0: 121 (0.59%) ; 6.0: 38 (0.19%)

Dimensão: Ingestão de Bebidas e Álcool

Referencial teorico (artigos científicos)	Variavel observacional (codigo e descricao)	Estatísticas descritivas da variavel
Consumo de alimentos não saudáveis (Claro et al.) + Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional (Louzada et al.) ; Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes (American Diabetes Association)	P00612 - Leite	Escala de mensuracao: Nominal Valor mínimo: Não se aplica Valor máximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 1.0 Distribuicao de frequencias: 1.0: 11390 (55.54%) ; 2.0: 9119 (44.46%)

Referencial teorico (artigos científicos)	Variavel observacional (codigo e descricao)	Estatisticas descritivas da variavel
Consumo de alimentos não saudáveis (Claro et al.) + Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional (Louzada et al.) ; Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes (American Diabetes Association)	P00614 - ONTEM o(a) Sr(a) tomou ou comeu:Refrigerante	Escala de mensuracao: Nominal Valor mínimo: Não se aplica Valor máximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 2.0 Distribuicao de frequencias: 2.0: 13900 (67.78%) ; 1.0: 6609 (32.22%)
Consumo de alimentos não saudáveis (Claro et al.) + Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional (Louzada et al.) ; Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes (American Diabetes Association)	P00615 - Suco de fruta em caixinha ou lata ou refresco em pó.	Escala de mensuracao: Nominal Valor mínimo: Não se aplica Valor máximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 2.0 Distribuicao de frequencias: 2.0: 16007 (78.05%) ; 1.0: 4502 (21.95%)
Consumo de alimentos não saudáveis (Claro et al.) + Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional (Louzada et al.) ; Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes (American Diabetes Association)	P00616 - Bebida achocolatada ou iogurte com sabor.	Escala de mensuracao: Nominal Valor mínimo: Não se aplica Valor máximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 2.0 Distribuicao de frequencias: 2.0: 17824 (86.91%) ; 1.0: 2685 (13.09%)
Consumo de alimentos não saudáveis (Claro et al.) + Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional (Louzada et al.) ; Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes (American Diabetes Association)	P01601 - Em quantos dias da semana o(a) Sr(a) costuma tomar suco de fruta natural (incluída a polpa de fruta congelada)?	Escala de mensuracao: Ordinal Valor mínimo: 0 Valor máximo: 7 Media aritmetica: 2.7619 Desvio padrao: 2.3903 Moda: 0.0 Distribuicao de frequencias: 0.0: 5124 (24.98%) ; 2.0: 3545 (17.29%) ; 3.0: 3036 (14.80%) ; 7.0: 2893 (14.11%) ; 1.0: 2126 (10.37%) ; 5.0: 1623 (7.91%) ; 4.0: 1509 (7.36%) ; 6.0: 653 (3.18%)
Consumo de alimentos não saudáveis (Claro et al.) + Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional (Louzada et al.) ; Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes (American Diabetes Association)	P02001 - Em quantos dias da semana o(a) Sr(a) costuma tomar suco de caixinha/lata ou refresco em pó ?	Escala de mensuracao: Ordinal Valor mínimo: 0 Valor máximo: 7 Media aritmetica: 1.1654 Desvio padrao: 2.0266 Moda: 0.0 Distribuicao de frequencias: 0.0: 13467 (65.66%) ; 2.0: 1786 (8.71%) ; 1.0: 1407 (6.86%) ; 3.0: 1226 (5.98%) ; 7.0: 1214 (5.92%) ; 5.0: 634 (3.09%) ; 4.0: 537 (2.62%) ; 6.0: 238 (1.16%)
Consumo de alimentos não saudáveis (Claro et al.) + Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional (Louzada et al.) ; Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes (American Diabetes Association)	P02002 - Em quantos dias da semana o(a) Sr(a) costuma tomar refrigerante?	Escala de mensuracao: Ordinal Valor mínimo: 0 Valor máximo: 7 Media aritmetica: 1.2346 Desvio padrao: 1.7788 Moda: 0.0 Distribuicao de frequencias: 0.0: 10287 (50.16%) ; 1.0: 3970 (19.36%) ; 2.0: 2872 (14.00%) ; 3.0: 1292 (6.30%) ; 7.0: 799 (3.90%) ; 4.0: 537 (2.62%) ; 5.0: 523 (2.55%) ; 6.0: 229 (1.12%)
Consumo de alimentos não saudáveis (Claro et al.) + Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional (Louzada et al.) ; Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes (American Diabetes Association)	P02101 - Que tipo de suco de caixinha/lata ou refresco em pó o(a) Sr(a) costuma tomar? (Ler as opções de resposta)	Escala de mensuracao: Nominal Valor mínimo: Não se aplica Valor máximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 2.0 Distribuicao de frequencias: 2.0: 6783 (96.32%) ; 3.0: 149 (2.12%) ; 1.0: 110 (1.56%)
Consumo de alimentos não saudáveis (Claro et al.) + Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional (Louzada et al.) ; Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes (American Diabetes Association)	P02102 - Que tipo de refrigerante o(a) Sr(a) costuma tomar?	Escala de mensuracao: Nominal Valor mínimo: Não se aplica Valor máximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 2.0 Distribuicao de frequencias: 2.0: 9636 (94.27%) ; 1.0: 330 (3.23%) ; 3.0: 256 (2.50%)
Consumo de alimentos não saudáveis (Claro et al.) + Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional (Louzada et al.) ; Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes (American Diabetes Association)	P023 - Em quantos dias da semana o(a) Sr(a) costuma tomar leite? (de origem animal: vaca, cabra, búfala etc.)	Escala de mensuracao: Ordinal Valor mínimo: 0 Valor máximo: 7 Media aritmetica: 3.5359 Desvio padrao: 2.9832 Moda: 7.0 Distribuicao de frequencias: 7.0: 7240 (35.30%) ; 0.0: 6210 (30.28%) ; 2.0: 1784 (8.70%) ; 3.0: 1604 (7.82%) ; 1.0: 1150 (5.61%) ; 5.0: 1136 (5.54%) ; 4.0: 841 (4.10%) ; 6.0: 544 (2.65%)
Consumo de alimentos não saudáveis (Claro et al.) + Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional (Louzada et al.) ; Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes (American Diabetes Association)	P02401 - Que tipo de leite o(a) Sr(a) costuma tomar?	Escala de mensuracao: Nominal Valor mínimo: Não se aplica Valor máximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 2.0 Distribuicao de frequencias: 2.0: 12129 (84.82%) ; 1.0: 1499 (10.48%) ; 3.0: 671 (4.69%)

Referencial teorico (artigos científicos)	Variavel observacional (codigo e descricao)	Estatisticas descritivas da variavel
Machine Learning and Data Mining Methods in Diabetes Research (Kavakiotis et al.)	P027 - Com que frequência o(a) Sr(a) costuma consumir alguma bebida alcoólica?	Escala de mensuracao: Ordinal Valor mínimo: 1 Valor máximo: 3 Media aritmetica: 1.7771 Desvio padrao: 0.9037 Moda: 1.0 Distribuicao de frequencias: 1.0: 11169 (54.46%) ; 3.0: 6597 (32.17%) ; 2.0: 2743 (13.37%)
Machine Learning and Data Mining Methods in Diabetes Research (Kavakiotis et al.)	P02801 - Quantos dias por semana o(a) Sr(a) costuma consumir alguma bebida alcoólica?	Escala de mensuracao: Ordinal Valor mínimo: 0 Valor máximo: 7 Media aritmetica: 1.7755 Desvio padrao: 1.5299 Moda: 1.0 Distribuicao de frequencias: 1.0: 2785 (42.22%) ; 2.0: 1840 (27.89%) ; 0.0: 771 (11.69%) ; 3.0: 575 (8.72%) ; 7.0: 275 (4.17%) ; 4.0: 196 (2.97%) ; 5.0: 116 (1.76%) ; 6.0: 39 (0.59%)
Machine Learning and Data Mining Methods in Diabetes Research (Kavakiotis et al.)	P029 - Em geral, no dia que o(a) Sr(a) bebe, quantas doses de bebida alcoólica o(a) Sr(a) consome?	Escala de mensuracao: Ordinal Valor mínimo: 1 Valor máximo: 60 Media aritmetica: 4.9276 Desvio padrao: 4.5015 Moda: 2.0 Distribuicao de frequencias: 2.0: 1695 (18.15%) ; 3.0: 1511 (16.18%) ; 1.0: 1327 (14.21%) ; 5.0: 1106 (11.84%) ; 4.0: 1067 (11.42%) ; 6.0: 718 (7.69%) ; 10.0: 678 (7.26%) ; 12.0: 382 (4.09%) ; 8.0: 312 (3.34%) ; 7.0: 143 (1.53%) ; ... +25 categorias
Machine Learning and Data Mining Methods in Diabetes Research (Kavakiotis et al.)	P03201 - Nos últimos trinta dias, o(a) Sr(a) chegou a consumir cinco ou mais doses de bebida alcoólica em uma única ocasião?	Escala de mensuracao: Nominal Valor mínimo: Não se aplica Valor máximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 2.0 Distribuicao de frequencias: 2.0: 5177 (55.43%) ; 1.0: 4163 (44.57%)

Dimensão: Atividade Física e Sedentarismo

Referencial teorico (artigos científicos)	Variavel observacional (codigo e descricao)	Estatisticas descritivas da variavel
Prática de atividade física no tempo livre e deslocamento ativo (Garcia et al.) ; Prática de atividade física e comportamento sedentário (Malta et al.)	P034 - Nos últimos três meses, o(a) Sr(a) praticou algum tipo de exercício físico ou esporte?	Escala de mensuracao: Nominal Valor mínimo: Não se aplica Valor máximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 2.0 Distribuicao de frequencias: 2.0: 11724 (57.17%) ; 1.0: 8785 (42.83%)
Prática de atividade física no tempo livre e deslocamento ativo (Garcia et al.) ; Prática de atividade física e comportamento sedentário (Malta et al.)	P035 - Quantos dias por semana o(a) Sr(a) costuma (costumava) praticar exercício físico ou esporte?	Escala de mensuracao: Ordinal Valor mínimo: 0 Valor máximo: 7 Media aritmetica: 3.2974 Desvio padrao: 1.8804 Moda: 3.0 Distribuicao de frequencias: 3.0: 2099 (23.89%) ; 5.0: 1539 (17.52%) ; 2.0: 1537 (17.50%) ; 1.0: 1484 (16.89%) ; 4.0: 746 (8.49%) ; 7.0: 720 (8.20%) ; 6.0: 399 (4.54%) ; 0.0: 261 (2.97%)
Prática de atividade física no tempo livre e deslocamento ativo (Garcia et al.) ; Prática de atividade física e comportamento sedentário (Malta et al.)	P036 - Qual o exercício físico ou esporte que o(a) Sr(a) pratica (praticava) com mais frequência? (Anotar apenas o primeiro citado)	Escala de mensuracao: Nominal Valor mínimo: Não se aplica Valor máximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 1.0 Distribuicao de frequencias: 1.0: 2892 (33.93%) ; 5.0: 1709 (20.05%) ; 12.0: 1545 (18.13%) ; 3.0: 588 (6.90%) ; 11.0: 433 (5.08%) ; 6.0: 360 (4.22%) ; 8.0: 194 (2.28%) ; 17.0: 192 (2.25%) ; 10.0: 147 (1.72%) ; 2.0: 146 (1.71%) ; ... +7 categorias
Prática de atividade física no tempo livre e deslocamento ativo (Garcia et al.) ; Prática de atividade física e comportamento sedentário (Malta et al.)	P03701 - Em geral, no dia que o(a) Sr(a) pratica exercício ou esporte, quanto tempo em horas dura essa atividade? Horas	Escala de mensuracao: Ordinal Valor mínimo: 0 Valor máximo: 12 Media aritmetica: 1.0515 Desvio padrao: 0.7928 Moda: 1.0 Distribuicao de frequencias: 1.0: 5206 (61.07%) ; 0.0: 1672 (19.62%) ; 2.0: 1351 (15.85%) ; 3.0: 206 (2.42%) ; 4.0: 50 (0.59%) ; 5.0: 16 (0.19%) ; 6.0: 15 (0.18%) ; 8.0: 6 (0.07%) ; 12.0: 1 (0.01%) ; 7.0: 1 (0.01%)

Referencial teorico (artigos científicos)	Variavel observacional (codigo e descricao)	Estatisticas descritivas da variavel
Prática de atividade física no tempo livre e deslocamento ativo (Garcia et al.) ; Prática de atividade física e comportamento sedentário (Malta et al.)	P03702 - Em geral, no dia que o(a) Sr(a) pratica (praticava) exercício ou esporte, quanto tempo em minutos dura essa atividade?Minutos	Escala de mensuracao: Ordinal Valor mínimo: 0 Valor máximo: 59 Media aritmetica: 13.2904 Desvio padrao: 16.7040 Moda: 0.0 Distribuicao de frequencias: 0.0: 5002 (58.68%) ; 30.0: 2105 (24.69%) ; 40.0: 637 (7.47%) ; 20.0: 227 (2.66%) ; 50.0: 187 (2.19%) ; 45.0: 161 (1.89%) ; 15.0: 78 (0.92%) ; 10.0: 68 (0.80%) ; 25.0: 20 (0.23%) ; 35.0: 15 (0.18%) ; ... +12 categorias
Prática de atividade física no tempo livre e deslocamento ativo (Garcia et al.) ; Prática de atividade física e comportamento sedentário (Malta et al.)	P038 - No seu trabalho, o(a) Sr(a) anda bastante a pé?	Escala de mensuracao: Nominal Valor mínimo: Não se aplica Valor máximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 2.0 Distribuicao de frequencias: 2.0: 9928 (61.58%) ; 1.0: 6194 (38.42%)
Prática de atividade física no tempo livre e deslocamento ativo (Garcia et al.) ; Prática de atividade física e comportamento sedentário (Malta et al.)	P039 - No seu trabalho, o(a) Sr(a) faz faxina pesada, carrega peso ou faz outra atividade pesada que requer esforço fisico intenso?	Escala de mensuracao: Nominal Valor mínimo: Não se aplica Valor máximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 2.0 Distribuicao de frequencias: 2.0: 12119 (75.17%) ; 1.0: 4003 (24.83%)
Prática de atividade física no tempo livre e deslocamento ativo (Garcia et al.) ; Prática de atividade física e comportamento sedentário (Malta et al.)	P040 - Para ir ou voltar do trabalho, o(a) Sr(a) faz algum trajeto a pé ou de bicicleta?	Escala de mensuracao: Ordinal Valor mínimo: 1 Valor máximo: 3 Media aritmetica: 2.4441 Desvio padrao: 0.8343 Moda: 3.0 Distribuicao de frequencias: 3.0: 10780 (66.87%) ; 1.0: 3620 (22.45%) ; 2.0: 1722 (10.68%)
Prática de atividade física no tempo livre e deslocamento ativo (Garcia et al.) ; Prática de atividade física e comportamento sedentário (Malta et al.)	P04001 - Quantos dias por semana o(a) Sr(a) faz algum trajeto a pé ou bicicleta?	Escala de mensuracao: Ordinal Valor mínimo: 0 Valor máximo: 7 Media aritmetica: 4.8542 Desvio padrao: 1.5410 Moda: 5.0 Distribuicao de frequencias: 5.0: 2085 (39.03%) ; 6.0: 1368 (25.61%) ; 7.0: 530 (9.92%) ; 3.0: 523 (9.79%) ; 4.0: 326 (6.10%) ; 2.0: 288 (5.39%) ; 1.0: 139 (2.60%) ; 0.0: 83 (1.55%)
Prática de atividade física no tempo livre e deslocamento ativo (Garcia et al.) ; Prática de atividade física e comportamento sedentário (Malta et al.)	P04101 - Quanto tempo o(a) Sr(a) gasta, por dia, para percorrer este trajeto a pé ou de bicicleta, considerando a ida e a volta do trabalho?Horas	Escala de mensuracao: Nominal Valor mínimo: Não se aplica Valor máximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 0.0 Distribuicao de frequencias: 0.0: 4300 (81.76%) ; 1.0: 728 (13.84%) ; 2.0: 151 (2.87%) ; 3.0: 41 (0.78%) ; 4.0: 23 (0.44%) ; 6.0: 7 (0.13%) ; 5.0: 7 (0.13%) ; 7.0: 2 (0.04%)
Prática de atividade física no tempo livre e deslocamento ativo (Garcia et al.) ; Prática de atividade física e comportamento sedentário (Malta et al.)	P04102 - Quanto tempo o(a) Sr(a) gasta, por dia, para percorrer este trajeto a pé ou de bicicleta, considerando a ida e a volta do trabalho?Minutos	Escala de mensuracao: Nominal Valor mínimo: Não se aplica Valor máximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 20.0 Distribuicao de frequencias: 20.0: 1062 (20.19%) ; 10.0: 941 (17.89%) ; 30.0: 926 (17.61%) ; 0.0: 743 (14.13%) ; 40.0: 536 (10.19%) ; 5.0: 264 (5.02%) ; 15.0: 215 (4.09%) ; 2.0: 97 (1.84%) ; 50.0: 91 (1.73%) ; 6.0: 67 (1.27%) ; ... +25 categorias
Prática de atividade física e comportamento sedentário (Malta et al.)	P04501 - Em média, quantas horas por dia o(a) Sr(a) costuma ficar assistindo televisão?	Escala de mensuracao: Ordinal Valor mínimo: 1 Valor máximo: 6 Media aritmetica: 2.6980 Desvio padrao: 1.4507 Moda: 2.0 Distribuicao de frequencias: 2.0: 6281 (30.63%) ; 1.0: 4567 (22.27%) ; 3.0: 4445 (21.67%) ; 4.0: 2837 (13.83%) ; 6.0: 1626 (7.93%) ; 5.0: 753 (3.67%)
Prática de atividade física e comportamento sedentário (Malta et al.)	P04502 - Em um dia, quantas horas do seu tempo livre (excluindo o trabalho), o(a) Sr(a) costuma usar computador, tablet ou celular para lazer, tais como: utilizar redes sociais, para ver notícias, vídeos, jogar etc?	Escala de mensuracao: Ordinal Valor mínimo: 1 Valor máximo: 6 Media aritmetica: 3.3425 Desvio padrao: 1.8438 Moda: 6.0 Distribuicao de frequencias: 6.0: 4812 (23.46%) ; 2.0: 4607 (22.46%) ; 1.0: 4056 (19.78%) ; 3.0: 3065 (14.94%) ; 4.0: 2631 (12.83%) ; 5.0: 1338 (6.52%)

Referencial teorico (artigos científicos)	Variavel observacional (codigo e descricao)	Estatisticas descritivas da variavel
Prática de atividade fisica no tempo livre e deslocamento ativo (Garcia et al.) ; Prática de atividade fisica e comportamento sedentário (Malta et al.)	VDM001 - Faixa de tempo gasto por dia no deslocamento casa-trabalho pelas pessoas ocupadas que se deslocavam para o trabalho	Escala de mensuracao: Ordinal Valor minimo: 1 Valor maximo: 4 Media aritmetica: 2.1936 Desvio padrao: 1.0813 Moda: 1.0 Distribuicao de frequencias: 1.0: 4896 (34.81%) ; 2.0: 3779 (26.87%) ; 3.0: 3163 (22.49%) ; 4.0: 2228 (15.84%)

Dimensão: Perfil Antropométrico

Referencial teorico (artigos científicos)	Variavel observacional (codigo e descricao)	Estatisticas descritivas da variavel
Machine Learning and Data Mining Methods in Diabetes Research (Kavakiotis et al.)	P00103 - Peso - Informado (em kg) (3 inteiros e 1 casa decimal)	Escala de mensuracao: Ordinal Valor minimo: 30 Valor maximo: 180 Media aritmetica: 73.2520 Desvio padrao: 14.6344 Moda: 70.0 Distribuicao de frequencias: 70.0: 793 (4.14%) ; 65.0: 746 (3.89%) ; 80.0: 703 (3.67%) ; 78.0: 686 (3.58%) ; 72.0: 685 (3.57%) ; 75.0: 668 (3.48%) ; 68.0: 644 (3.36%) ; 60.0: 643 (3.35%) ; 62.0: 611 (3.19%) ; 63.0: 499 (2.60%) ; ... +195 categorias
Machine Learning and Data Mining Methods in Diabetes Research (Kavakiotis et al.)	P00104 - Peso - Final (em kg) (3 inteiros e 1 casa decimal)	Escala de mensuracao: Ordinal Valor minimo: 32 Valor maximo: 160 Media aritmetica: 73.2377 Desvio padrao: 14.5696 Moda: 70.0 Distribuicao de frequencias: 70.0: 826 (4.07%) ; 65.0: 775 (3.81%) ; 80.0: 725 (3.57%) ; 72.0: 720 (3.54%) ; 78.0: 712 (3.50%) ; 75.0: 695 (3.42%) ; 68.0: 684 (3.37%) ; 60.0: 678 (3.34%) ; 62.0: 643 (3.16%) ; 63.0: 545 (2.68%) ; ... +102 categorias
Machine Learning and Data Mining Methods in Diabetes Research (Kavakiotis et al.)	P00403 - Altura - Informada (em cm) (3 inteiros)	Escala de mensuracao: Ordinal Valor minimo: 120 Valor maximo: 202 Media aritmetica: 166.7946 Desvio padrao: 9.5383 Moda: 165.0 Distribuicao de frequencias: 165.0: 1477 (8.17%) ; 160.0: 1306 (7.22%) ; 170.0: 1301 (7.19%) ; 175.0: 965 (5.34%) ; 168.0: 827 (4.57%) ; 162.0: 726 (4.01%) ; 172.0: 645 (3.57%) ; 155.0: 631 (3.49%) ; 167.0: 601 (3.32%) ; 163.0: 572 (3.16%) ; ... +60 categorias
Machine Learning and Data Mining Methods in Diabetes Research (Kavakiotis et al.)	P00404 - Altura - Final (em cm) (3 inteiros)	Escala de mensuracao: Ordinal Valor minimo: 130 Valor maximo: 202 Media aritmetica: 166.3682 Desvio padrao: 9.5753 Moda: 165.0 Distribuicao de frequencias: 165.0: 1578 (7.77%) ; 160.0: 1400 (6.89%) ; 170.0: 1366 (6.72%) ; 175.0: 1006 (4.95%) ; 168.0: 897 (4.42%) ; 162.0: 823 (4.05%) ; 155.0: 707 (3.48%) ; 172.0: 692 (3.41%) ; 167.0: 670 (3.30%) ; 163.0: 656 (3.23%) ; ... +61 categorias
Machine Learning and Data Mining Methods in Diabetes Research (Kavakiotis et al.)	W00101 - Peso - 1ª pesagem (em kg) (3 inteiros e 1 casa decimal)	Escala de mensuracao: Ordinal Valor minimo: 34.8000 Valor maximo: 144.1000 Media aritmetica: 74.0836 Desvio padrao: 14.7409 Moda: 70.0 Distribuicao de frequencias: 70.0: 27 (1.89%) ; 72.0: 24 (1.68%) ; 60.0: 23 (1.61%) ; 67.0: 23 (1.61%) ; 62.0: 22 (1.54%) ; 65.0: 19 (1.33%) ; 73.0: 19 (1.33%) ; 76.0: 18 (1.26%) ; 66.0: 17 (1.19%) ; 68.0: 17 (1.19%) ; ... +468 categorias
Machine Learning and Data Mining Methods in Diabetes Research (Kavakiotis et al.)	W00102 - Peso - 2ª pesagem (em kg) (3 inteiros e 1 casa decimal)	Escala de mensuracao: Ordinal Valor minimo: 34.9000 Valor maximo: 144.1000 Media aritmetica: 74.0488 Desvio padrao: 14.7345 Moda: 70.0 Distribuicao de frequencias: 70.0: 24 (1.68%) ; 62.0: 23 (1.61%) ; 67.0: 23 (1.61%) ; 60.0: 23 (1.61%) ; 72.0: 22 (1.54%) ; 65.0: 21 (1.47%) ; 73.0: 20 (1.40%) ; 86.0: 19 (1.33%) ; 68.0: 18 (1.26%) ; 76.0: 17 (1.19%) ; ... +466 categorias
Machine Learning and Data Mining Methods in Diabetes Research (Kavakiotis et al.)	W00103 - Peso - Final (em kg) (3 inteiros e 1 casa decimal)	Escala de mensuracao: Ordinal Valor minimo: 34.9000 Valor maximo: 134.9000 Media aritmetica: 74.2477 Desvio padrao: 14.5729 Moda: 60.0 Distribuicao de frequencias: 60.0: 23 (1.59%) ; 70.0: 22 (1.52%) ; 62.0: 21 (1.45%) ; 72.0: 21 (1.45%) ; 67.0: 21 (1.45%) ; 65.0: 19 (1.31%) ; 73.0: 17 (1.18%) ; 66.0: 17 (1.18%) ; 68.0: 16 (1.11%) ; 75.0: 16 (1.11%) ; ... +472 categorias

Referencial teorico (artigos científicos)	Variavel observacional (codigo e descricao)	Estatisticas descritivas da variavel
Machine Learning and Data Mining Methods in Diabetes Research (Kavakiotis et al.)	W00201 - Altura - 1ª medição (em cm) (3 inteiros e 1 casa decimal)	Escala de mensuracao: Ordinal Valor minimo: 130 Valor maximo: 194.8000 Media aritmetica: 166.3477 Desvio padrao: 9.4236 Moda: 160.0 Distribuicao de frequencias: 160.0: 52 (3.66%) ; 170.0: 48 (3.38%) ; 165.0: 45 (3.16%) ; 163.0: 44 (3.09%) ; 164.0: 40 (2.81%) ; 168.0: 37 (2.60%) ; 174.0: 37 (2.60%) ; 175.0: 36 (2.53%) ; 167.0: 35 (2.46%) ; 162.0: 34 (2.39%) ; ... +264 categorias
Machine Learning and Data Mining Methods in Diabetes Research (Kavakiotis et al.)	W00202 - Altura - 2ª medição (em cm) (3 inteiros e 1 casa decimal)	Escala de mensuracao: Ordinal Valor minimo: 129 Valor maximo: 194.7000 Media aritmetica: 166.3340 Desvio padrao: 9.4254 Moda: 160.0 Distribuicao de frequencias: 160.0: 53 (3.73%) ; 170.0: 48 (3.38%) ; 165.0: 45 (3.16%) ; 163.0: 42 (2.95%) ; 164.0: 39 (2.74%) ; 168.0: 36 (2.53%) ; 167.0: 34 (2.39%) ; 166.0: 33 (2.32%) ; 171.0: 32 (2.25%) ; 175.0: 31 (2.18%) ; ... +277 categorias
Machine Learning and Data Mining Methods in Diabetes Research (Kavakiotis et al.)	W00203 - Altura - Final (em cm) (3 inteiros e 1 casa decimal)	Escala de mensuracao: Ordinal Valor minimo: 135 Valor maximo: 194.8000 Media aritmetica: 166.3682 Desvio padrao: 9.3959 Moda: 160.0 Distribuicao de frequencias: 160.0: 45 (3.11%) ; 170.0: 42 (2.91%) ; 165.0: 39 (2.70%) ; 163.0: 33 (2.28%) ; 164.0: 31 (2.15%) ; 168.0: 30 (2.08%) ; 167.0: 29 (2.01%) ; 172.0: 28 (1.94%) ; 174.0: 26 (1.80%) ; 166.0: 26 (1.80%) ; ... +302 categorias

Dimensão: Perfil Sociodemográfico e Econômico

Referencial teorico (artigos científicos)	Variavel observacional (codigo e descricao)	Estatisticas descritivas da variavel
Desigualdades sociodemográficas no consumo alimentar no Brasil (Souza et al.) ; Socioeconomic inequalities related to noncommunicable diseases and their limitations (Malta et al.)	C006 - Sexo	Escala de mensuracao: Nominal Valor minimo: Não se aplica Valor maximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 1.0 Distribuicao de frequencias: 1.0: 10793 (52.63%) ; 2.0: 9716 (47.37%)
Desigualdades sociodemográficas no consumo alimentar no Brasil (Souza et al.) ; Socioeconomic inequalities related to noncommunicable diseases and their limitations (Malta et al.)	C008 - Idade do morador na data de referência	Escala de mensuracao: Ordinal Valor minimo: 30 Valor maximo: 60 Media aritmetica: 42.1924 Desvio padrao: 8.4627 Moda: 37.0 Distribuicao de frequencias: 37.0: 990 (4.83%) ; 30.0: 977 (4.76%) ; 35.0: 951 (4.64%) ; 34.0: 936 (4.56%) ; 32.0: 922 (4.50%) ; 36.0: 921 (4.49%) ; 33.0: 919 (4.48%) ; 39.0: 913 (4.45%) ; 38.0: 886 (4.32%) ; 31.0: 848 (4.13%) ; ... +21 categorias
Desigualdades sociodemográficas no consumo alimentar no Brasil (Souza et al.) ; Socioeconomic inequalities related to noncommunicable diseases and their limitations (Malta et al.)	C009 - Cor ou raça	Escala de mensuracao: Nominal Valor minimo: Não se aplica Valor maximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 4.0 Distribuicao de frequencias: 4.0: 10634 (51.85%) ; 1.0: 7221 (35.21%) ; 2.0: 2351 (11.46%) ; 3.0: 160 (0.78%) ; 5.0: 142 (0.69%) ; 9.0: 1 (0.00%)
Desigualdades sociodemográficas no consumo alimentar no Brasil (Souza et al.) ; Socioeconomic inequalities related to noncommunicable diseases and their limitations (Malta et al.)	C011 - Qual é o estado civil de ____?	Escala de mensuracao: Nominal Valor minimo: Não se aplica Valor maximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 4.0 Distribuicao de frequencias: 4.0: 9310 (45.39%) ; 1.0: 9063 (44.19%) ; 2.0: 1709 (8.33%) ; 3.0: 427 (2.08%)
Socioeconomic inequalities related to noncommunicable diseases and their limitations (Malta et al.) ; Desigualdades sociodemográficas no consumo alimentar no Brasil (Souza et al.)	E017 - Quantas horas ____ trabalhava normalmente, por semana, nesse trabalho?	Escala de mensuracao: Ordinal Valor minimo: 1 Valor maximo: 120 Media aritmetica: 38.9753 Desvio padrao: 12.1497 Moda: 40.0 Distribuicao de frequencias: 40.0: 5014 (31.10%) ; 44.0: 2900 (17.99%) ; 48.0: 1236 (7.67%) ; 30.0: 1206 (7.48%) ; 20.0: 796 (4.94%) ; 50.0: 570 (3.54%) ; 36.0: 510 (3.16%) ; 60.0: 503 (3.12%) ; 24.0: 308 (1.91%) ; 45.0: 297 (1.84%) ; ... +77 categorias

Referencial teorico (artigos científicos)	Variavel observacional (codigo e descricao)	Estatísticas descritivas da variavel
Socioeconomic inequalities related to noncommunicable diseases and their limitations (Malta et al.) ; Desigualdades sociodemográficas no consumo alimentar no Brasil (Souza et al.)	M005010 - No(s) seu(s) trabalho(s), habitualmente, (s) o(a) Sr(a) trabalha(va) algum período de tempo entre as 8 horas da noite e às 5 horas da manhã	Escala de mensuracao: Nominal Valor mínimo: Não se aplica Valor máximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 2.0 Distribuicao de frequencias: 2.0: 13998 (86.83%) ; 1.0: 2124 (13.17%)
Socioeconomic inequalities related to noncommunicable diseases and their limitations (Malta et al.) ; Desigualdades sociodemográficas no consumo alimentar no Brasil (Souza et al.)	V0001 - Unidade da Federação	Escala de mensuracao: Nominal Valor mínimo: Não se aplica Valor máximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 35 Distribuicao de frequencias: 35: 1271 (6.20%) ; 31: 1150 (5.61%) ; 33: 1092 (5.32%) ; 21: 1062 (5.18%) ; 26: 975 (4.75%) ; 13: 918 (4.48%) ; 41: 901 (4.39%) ; 42: 897 (4.37%) ; 15: 886 (4.32%) ; 32: 816 (3.98%) ; ... +17 categorias
Socioeconomic inequalities related to noncommunicable diseases and their limitations (Malta et al.) ; Desigualdades sociodemográficas no consumo alimentar no Brasil (Souza et al.)	V0026 - Tipo de situação censitária	Escala de mensuracao: Nominal Valor mínimo: Não se aplica Valor máximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 1 Distribuicao de frequencias: 1: 16322 (79.58%) ; 2: 4187 (20.42%)
Socioeconomic inequalities related to noncommunicable diseases and their limitations (Malta et al.) ; Desigualdades sociodemográficas no consumo alimentar no Brasil (Souza et al.)	V0031 - Tipo de área	Escala de mensuracao: Nominal Valor mínimo: Não se aplica Valor máximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 4 Distribuicao de frequencias: 4: 8902 (43.41%) ; 1: 7995 (38.98%) ; 2: 3451 (16.83%) ; 3: 161 (0.79%)
Desigualdades sociodemográficas no consumo alimentar no Brasil (Souza et al.)	VDD004A - Nível de instrução mais elevado alcançado (pessoas de 5 anos ou mais de idade) padronizado para o Ensino Fundamental - SISTEMA DE 9 ANOS	Escala de mensuracao: Nominal Valor mínimo: Não se aplica Valor máximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 5.0 Distribuicao de frequencias: 5.0: 6617 (32.26%) ; 2.0: 5206 (25.38%) ; 7.0: 4093 (19.96%) ; 3.0: 1628 (7.94%) ; 4.0: 1257 (6.13%) ; 1.0: 860 (4.19%) ; 6.0: 848 (4.13%)
Socioeconomic inequalities related to noncommunicable diseases and their limitations (Malta et al.) ; Desigualdades sociodemográficas no consumo alimentar no Brasil (Souza et al.)	VDE014 - Grupos de atividade do trabalho principal da semana de referência para pessoas de 14 anos ou mais de idade	Escala de mensuracao: Nominal Valor mínimo: Não se aplica Valor máximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 4.0 Distribuicao de frequencias: 4.0: 2734 (16.96%) ; 9.0: 2119 (13.14%) ; 1.0: 1958 (12.14%) ; 7.0: 1638 (10.16%) ; 2.0: 1610 (9.99%) ; 3.0: 1233 (7.65%) ; 11.0: 1232 (7.64%) ; 8.0: 1138 (7.06%) ; 5.0: 882 (5.47%) ; 6.0: 834 (5.17%) ; ... +2 categorias
Socioeconomic inequalities related to noncommunicable diseases and their limitations (Malta et al.) ; Desigualdades sociodemográficas no consumo alimentar no Brasil (Souza et al.)	VDF003 - Rendimento domiciliar per capita (exclusive o rendimento das pessoas cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico)	Escala de mensuracao: Ordinal Valor mínimo: 0 Valor máximo: 90000 Media aritmetica: 1576.1549 Desvio padrao: 2556.6954 Moda: 1000.0 Distribuicao de frequencias: 1000.0: 540 (2.63%) ; 998.0: 399 (1.95%) ; 1500.0: 374 (1.82%) ; 2000.0: 367 (1.79%) ; 499.0: 355 (1.73%) ; 500.0: 329 (1.60%) ; 333.0: 250 (1.22%) ; 1200.0: 243 (1.19%) ; 0.0: 236 (1.15%) ; 600.0: 230 (1.12%) ; ... +2409 categorias
Socioeconomic inequalities related to noncommunicable diseases and their limitations (Malta et al.) ; Desigualdades sociodemográficas no consumo alimentar no Brasil (Souza et al.)	VDF004 - Faixa de rendimento domiciliar per capita (exclusive o rendimento das pessoas cuja condição na unidade domiciliar era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico)	Escala de mensuracao: Ordinal Valor mínimo: 1 Valor máximo: 7 Media aritmetica: 3.4777 Desvio padrao: 1.5680 Moda: 3.0 Distribuicao de frequencias: 3.0: 5414 (26.41%) ; 4.0: 5235 (25.54%) ; 2.0: 3313 (16.16%) ; 1.0: 2206 (10.76%) ; 5.0: 1848 (9.02%) ; 6.0: 1345 (6.56%) ; 7.0: 1138 (5.55%)

Dimensão: Saúde e Comportamentos de Risco

Referencial teorico (artigos científicos)	Variavel observacional (codigo e descricao)	Estatísticas descritivas da variavel
Desigualdades sociodemográficas na ocorrência de multi-morbidade no Brasil (Nunes et al.) ; Validade do diabetes autorreferido e a relação com a hemoglobina glicada na população brasileira (Malta et al.) ; Machine Learning and Data Mining Methods in Diabetes Research (Kavakiotis et al.)	I00102 - tem algum plano de saúde médico particular, de empresa ou órgão público?	Escala de mensuracao: Nominal Valor mínimo: Não se aplica Valor máximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 2.0 Distribuicao de frequencias: 2.0: 15748 (76.79%) ; 1.0: 4761 (23.21%)

Referencial teorico (artigos científicos)	Variavel observacional (codigo e descricao)	Estatisticas descritivas da variavel
Desigualdades sociodemográficas na ocorrência de multi-morbididade no Brasil (Nunes et al.) ; Validade do diabetes autorreferido e a relação com a hemoglobina glicada na população brasileira (Malta et al.) ; Machine Learning and Data Mining Methods in Diabetes Research (Kavakiotis et al.)	J012 - Quantas vezes ____ consultou um médico nos últimos 12 meses	Escala de mensuracao: Ordinal Valor minimo: 1 Valor maximo: 110 Media aritmetica: 2.7675 Desvio padrao: 2.8532 Moda: 1.0 Distribuicao de frequencias: 1.0: 5438 (37.59%) ; 2.0: 3749 (25.91%) ; 3.0: 2100 (14.52%) ; 4.0: 1042 (7.20%) ; 5.0: 764 (5.28%) ; 6.0: 433 (2.99%) ; 10.0: 346 (2.39%) ; 8.0: 165 (1.14%) ; 12.0: 120 (0.83%) ; 7.0: 119 (0.82%) ; ... +16 categorias
Depressão no Brasil: resultados da Pesquisa Nacional de Saúde (Lopes et al.)	N010 - Nas duas últimas semanas, com que frequência o(a) Sr(a) teve problemas no sono, como dificuldade para adormecer, acordar frequentemente à noite ou dormir mais do que de costume?	Escala de mensuracao: Nominal Valor minimo: Não se aplica Valor maximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 1.0 Distribuicao de frequencias: 1.0: 15854 (77.30%) ; 2.0: 2808 (13.69%) ; 4.0: 1138 (5.55%) ; 3.0: 709 (3.46%)
Depressão no Brasil: resultados da Pesquisa Nacional de Saúde (Lopes et al.)	N011 - Nas duas últimas semanas, com que frequência o(a) Sr(a) teve problemas por não se sentir descansado(a) e disposto(a) durante o dia, sentindo-se cansado(a), sem ter energia?	Escala de mensuracao: Ordinal Valor minimo: 1 Valor maximo: 4 Media aritmetica: 1.3799 Desvio padrao: 0.7397 Moda: 1.0 Distribuicao de frequencias: 1.0: 15093 (73.59%) ; 2.0: 3859 (18.82%) ; 4.0: 819 (3.99%) ; 3.0: 738 (3.60%)
Depressão no Brasil: resultados da Pesquisa Nacional de Saúde (Lopes et al.)	N012 - Nas duas últimas semanas, com que frequência o(a) Sr(a) teve pouco interesse ou não sentiu prazer em fazer as coisas?	Escala de mensuracao: Ordinal Valor minimo: 1 Valor maximo: 4 Media aritmetica: 1.2459 Desvio padrao: 0.5876 Moda: 1.0 Distribuicao de frequencias: 1.0: 16714 (81.50%) ; 2.0: 2936 (14.32%) ; 3.0: 469 (2.29%) ; 4.0: 390 (1.90%)
Depressão no Brasil: resultados da Pesquisa Nacional de Saúde (Lopes et al.)	N013 - Nas duas últimas semanas, com que frequência o(a) Sr(a) teve problemas para se concentrar nas suas atividades habituais?	Escala de mensuracao: Ordinal Valor minimo: 1 Valor maximo: 4 Media aritmetica: 1.1678 Desvio padrao: 0.4964 Moda: 1.0 Distribuicao de frequencias: 1.0: 17916 (87.36%) ; 2.0: 1992 (9.71%) ; 3.0: 354 (1.73%) ; 4.0: 247 (1.20%)
Depressão no Brasil: resultados da Pesquisa Nacional de Saúde (Lopes et al.)	N014 - Nas duas últimas semanas, com que frequência o(a) Sr(a) teve problemas na alimentação, como ter falta de apetite ou comer muito mais do que de costume?	Escala de mensuracao: Ordinal Valor minimo: 1 Valor maximo: 4 Media aritmetica: 1.1870 Desvio padrao: 0.5610 Moda: 1.0 Distribuicao de frequencias: 1.0: 17933 (87.44%) ; 2.0: 1726 (8.42%) ; 3.0: 441 (2.15%) ; 4.0: 409 (1.99%)
Depressão no Brasil: resultados da Pesquisa Nacional de Saúde (Lopes et al.)	N015 - Nas duas últimas semanas, com que frequência o(a) Sr(a) teve lentidão para se movimentar ou falar, ou ao contrário ficou muito agitado(a) ou inquieto(a)?	Escala de mensuracao: Ordinal Valor minimo: 1 Valor maximo: 4 Media aritmetica: 1.1389 Desvio padrao: 0.4757 Moda: 1.0 Distribuicao de frequencias: 1.0: 18511 (90.26%) ; 2.0: 1390 (6.78%) ; 3.0: 365 (1.78%) ; 4.0: 243 (1.18%)
Depressão no Brasil: resultados da Pesquisa Nacional de Saúde (Lopes et al.)	N016 - Nas duas últimas semanas, com que frequência o(a) Sr(a) se sentiu deprimido(a), “pra baixo” ou sem perspectiva?	Escala de mensuracao: Ordinal Valor minimo: 1 Valor maximo: 4 Media aritmetica: 1.2276 Desvio padrao: 0.5710 Moda: 1.0 Distribuicao de frequencias: 1.0: 17029 (83.03%) ; 2.0: 2644 (12.89%) ; 3.0: 484 (2.36%) ; 4.0: 352 (1.72%)
Depressão no Brasil: resultados da Pesquisa Nacional de Saúde (Lopes et al.)	N017 - Nas duas últimas semanas, com que frequência o(a) Sr(a) se sentiu mal consigo mesmo, se achando um fracasso ou achando que decepcionou sua família?	Escala de mensuracao: Ordinal Valor minimo: 1 Valor maximo: 4 Media aritmetica: 1.1313 Desvio padrao: 0.4557 Moda: 1.0 Distribuicao de frequencias: 1.0: 18550 (90.45%) ; 2.0: 1451 (7.07%) ; 3.0: 282 (1.38%) ; 4.0: 226 (1.10%)
Machine Learning and Data Mining Methods in Diabetes Research (Kavakiotis et al.)	P050 - Atualmente, o(a) Sr(a) fuma algum produto do tabaco?	Escala de mensuracao: Ordinal Valor minimo: 1 Valor maximo: 3 Media aritmetica: 2.7739 Desvio padrao: 0.6238 Moda: 3.0 Distribuicao de frequencias: 3.0: 18067 (88.09%) ; 1.0: 2196 (10.71%) ; 2.0: 246 (1.20%)

Referencial teorico (artigos científicos)	Variavel observacional (codigo e descricao)	Estatisticas descritivas da variavel
Machine Learning and Data Mining Methods in Diabetes Research (Kavakiotis et al.)	P051 - E no passado, o(a) Sr(a) fumou algum produto do tabaco diariamente?	Escala de mensuracao: Nominal Valor minimo: Não se aplica Valor maximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 2.0 Distribuicao de frequencias: 2.0: 135 (54.88%) ; 1.0: 111 (45.12%)
Machine Learning and Data Mining Methods in Diabetes Research (Kavakiotis et al.)	P05401 - Em média, quanto fuma por dia ou por semana Cigarros industrializados	Escala de mensuracao: Ordinal Valor minimo: 1 Valor maximo: 5 Media aritmetica: 2.0258 Desvio padrao: 1.6378 Moda: 1.0 Distribuicao de frequencias: 1.0: 1640 (67.16%) ; 5.0: 525 (21.50%) ; 2.0: 177 (7.25%) ; 3.0: 72 (2.95%) ; 4.0: 28 (1.15%)
Machine Learning and Data Mining Methods in Diabetes Research (Kavakiotis et al.)	P060 - Durante os últimos doze meses, o(a) Sr(a) tentou parar de fumar?	Escala de mensuracao: Nominal Valor minimo: Não se aplica Valor maximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 2.0 Distribuicao de frequencias: 2.0: 1494 (61.18%) ; 1.0: 948 (38.82%)
Desigualdades sociodemográficas na ocorrência de multi-morbidade no Brasil (Nunes et al.) ; Validade do diabetes autorreferido e a relação com a hemoglobina glicada na população brasileira (Malta et al.) ; Machine Learning and Data Mining Methods in Diabetes Research (Kavakiotis et al.)	Q00101 - Quando foi a última vez que o (a) Sr(a) teve sua pressão arterial medida?	Escala de mensuracao: Ordinal Valor minimo: 1 Valor maximo: 5 Media aritmetica: 1.7708 Desvio padrao: 1.1863 Moda: 1.0 Distribuicao de frequencias: 1.0: 12520 (61.05%) ; 2.0: 3594 (17.52%) ; 3.0: 2346 (11.44%) ; 5.0: 1375 (6.70%) ; 4.0: 674 (3.29%)
Desigualdades sociodemográficas na ocorrência de multi-morbidade no Brasil (Nunes et al.) ; Validade do diabetes autorreferido e a relação com a hemoglobina glicada na população brasileira (Malta et al.) ; Machine Learning and Data Mining Methods in Diabetes Research (Kavakiotis et al.)	Q00201 - Algum médico já lhe deu o diagnóstico de hipertensão arterial (pressão alta)?	Escala de mensuracao: Nominal Valor minimo: Não se aplica Valor maximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 2.0 Distribuicao de frequencias: 2.0: 20509 (100.00%)
Desigualdades sociodemográficas na ocorrência de multi-morbidade no Brasil (Nunes et al.) ; Validade do diabetes autorreferido e a relação com a hemoglobina glicada na população brasileira (Malta et al.) ; Machine Learning and Data Mining Methods in Diabetes Research (Kavakiotis et al.)	Q00202 - Essa hipertensão arterial (pressão alta) ocorreu apenas durante algum período de gravidez?	Escala de mensuracao: Ordinal Valor minimo: Não se aplica Valor maximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: Não se aplica Distribuicao de frequencias: Não se aplica
Desigualdades sociodemográficas na ocorrência de multi-morbidade no Brasil (Nunes et al.) ; Validade do diabetes autorreferido e a relação com a hemoglobina glicada na população brasileira (Malta et al.) ; Machine Learning and Data Mining Methods in Diabetes Research (Kavakiotis et al.)	Q00401 - O(A) Sr(a) vai ao médico/serviço de saúde regularmente para acompanhamento da hipertensão arterial (pressão alta) ?	Escala de mensuracao: Ordinal Valor minimo: Não se aplica Valor maximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: Não se aplica Distribuicao de frequencias: Não se aplica
Desigualdades sociodemográficas na ocorrência de multi-morbidade no Brasil (Nunes et al.) ; Validade do diabetes autorreferido e a relação com a hemoglobina glicada na população brasileira (Malta et al.) ; Machine Learning and Data Mining Methods in Diabetes Research (Kavakiotis et al.)	Q00503 - Algum médico já lhe receitou algum medicamento para a hipertensão arterial (pressão alta)?	Escala de mensuracao: Ordinal Valor minimo: Não se aplica Valor maximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: Não se aplica Distribuicao de frequencias: Não se aplica
Desigualdades sociodemográficas na ocorrência de multi-morbidade no Brasil (Nunes et al.) ; Validade do diabetes autorreferido e a relação com a hemoglobina glicada na população brasileira (Malta et al.) ; Machine Learning and Data Mining Methods in Diabetes Research (Kavakiotis et al.)	Q00601 - Nas duas últimas semanas, o(a) Sr(a) tomou os medicamentos para controlar a hipertensão arterial (pressão alta)?	Escala de mensuracao: Ordinal Valor minimo: Não se aplica Valor maximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: Não se aplica Distribuicao de frequencias: Não se aplica
Desigualdades sociodemográficas na ocorrência de multi-morbidade no Brasil (Nunes et al.) ; Validade do diabetes autorreferido e a relação com a hemoglobina glicada na população brasileira (Malta et al.) ; Machine Learning and Data Mining Methods in Diabetes Research (Kavakiotis et al.)	Q02901 - Quando foi a última vez que o(a) Sr(a) fez exame de sangue para medir a glicemia, isto é, o açúcar no sangue?	Escala de mensuracao: Ordinal Valor minimo: 1 Valor maximo: 5 Media aritmetica: 2.3574 Desvio padrao: 1.4044 Moda: 1.0 Distribuicao de frequencias: 1.0: 7925 (38.64%) ; 2.0: 4436 (21.63%) ; 3.0: 3880 (18.92%) ; 5.0: 2838 (13.84%) ; 4.0: 1430 (6.97%)
Desigualdades sociodemográficas na ocorrência de multi-morbidade no Brasil (Nunes et al.) ; Validade do diabetes autorreferido e a relação com a hemoglobina glicada na população brasileira (Malta et al.) ; Machine Learning and Data Mining Methods in Diabetes Research (Kavakiotis et al.)	Q03001 - Algum médico já lhe deu o diagnóstico de diabetes?	Escala de mensuracao: Nominal Valor minimo: Não se aplica Valor maximo: Não se aplica Media aritmetica: Não se aplica Desvio padrao: Não se aplica Moda: 2.0 Distribuicao de frequencias: 2.0: 19954 (97.29%) ; 1.0: 555 (2.71%)

Referencial teorico (artigos científicos)	Variavel observacional (codigo e descricao)	Estatisticas descritivas da variavel
Desigualdades sociodemográficas na ocorrência de multi-morbididade no Brasil (Nunes et al.) ; Validade do diabetes autorreferido e a relação com a hemoglobina glicada na população brasileira (Malta et al.) ; Machine Learning and Data Mining Methods in Diabetes Research (Kavakiotis et al.)	Q031 - Que idade o(a) Sr(a) tinha no primeiro diagnóstico do diabetes?	Escala de mensuracao: Ordinal Valor minimo: 0 Valor maximo: 60 Media aritmetica: 41.4502 Desvio padrao: 10.9114 Moda: 50.0 Distribuicao de frequencias: 50.0: 30 (5.98%) ; 52.0: 26 (5.18%) ; 40.0: 26 (5.18%) ; 45.0: 21 (4.18%) ; 35.0: 21 (4.18%) ; 38.0: 20 (3.98%) ; 30.0: 20 (3.98%) ; 43.0: 19 (3.78%) ; 53.0: 18 (3.59%) ; 48.0: 16 (3.19%) ; ... +41 categorias
Desigualdades sociodemográficas na ocorrência de multi-morbididade no Brasil (Nunes et al.) ; Validade do diabetes autorreferido e a relação com a hemoglobina glicada na população brasileira (Malta et al.) ; Machine Learning and Data Mining Methods in Diabetes Research (Kavakiotis et al.)	Q03201 - O(A) Sr(a) vai ao médico/serviço de saúde regularmente para acompanhamento do diabetes?	Escala de mensuracao: Ordinal Valor minimo: 1 Valor maximo: 3 Media aritmetica: 1.5080 Desvio padrao: 0.6619 Moda: 1.0 Distribuicao de frequencias: 1.0: 294 (58.57%) ; 2.0: 161 (32.07%) ; 3.0: 47 (9.36%)

Referências Bibliográficas

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes. **Diabetes Care**, v. 27, Suplemento 1, p. S36-S46, Jan. 2004.

CLARO, R. M. et al. Consumo de alimentos não saudáveis relacionados a doenças crônicas não transmissíveis no Brasil: Pesquisa Nacional de Saúde, 2013 e 2019. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, Brasília, v. 30, n. 1, e2020870, 2021.

GARCIA, L. M. T. et al. Prática de atividade física no tempo livre e deslocamento ativo em adultos: Pesquisa Nacional de Saúde, 2013 e 2019. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, São Paulo, v. 24, supl. 2, e210005, 2021.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Pesquisa Nacional de Saúde 2019: percepção do estado de saúde, estilos de vida, doenças crônicas e saúde bucal**. Rio de Janeiro: IBGE, 2020.

KAVAKIOTIS, I. et al. Machine Learning and Data Mining Methods in Diabetes Research. **Computational and Structural Biotechnology Journal**, v. 15, p. 104-116, 2017.

LOPES, C. S. et al. Depressão no Brasil: resultados da Pesquisa Nacional de Saúde, 2013 e 2019. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, Brasília, v. 30, n. 1, e2020533, 2021.

LOUZADA, M. L. C. et al. Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional da dieta no Brasil. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 49, n. 38, 2015.

MALTA, D. C. et al. Socioeconomic inequalities related to noncommunicable diseases and their limitations: National Health Survey, 2019. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, São Paulo, v. 24, Suplemento 2, p. E210011, 2021.

MALTA, D. C. et al. Prática de atividade física e comportamento sedentário na população adulta brasileira: resultados da Pesquisa Nacional de Saúde 2019. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, Brasília, v. 30, n. 1, e2020833, 2021.

MALTA, D. C. et al. Validade do diabetes autorreferido e a relação com a hemoglobina glicada na população brasileira: Pesquisa Nacional de Saúde. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, São Paulo, v. 24, supl. 2, e210003, 2021.

NUNES, B. P. et al. Desigualdades sociodemográficas na ocorrência de multi-morbididade no Brasil: Pesquisa Nacional de Saúde, 2019. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, São Paulo, v. 24, supl. 2, e210010, 2021.

SOUZA, A. M. et al. Desigualdades sociodemográficas no consumo alimentar no Brasil: resultados da Pesquisa Nacional de Saúde 2019. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, Brasília, v. 30, n. 1, e2020839, 2021.

ZÁRATE, L. E. et al. CAPTO - A Method for Understanding Problem Domains for Data Science Projects. **Concilium**, v. 23, n. 15, 2023.