11. Parto, cuidados à mãe e ao bebé, e plantas medicinais

Guia Oracle OS. Manuais no acervo: Hesperian "Manual para Parteiras" / "A Book for Midwives", "Onde Não Há Médico", OMS "Cuidados na gravidez, parto e pós-parto", MSF Obstetrics, Culpeper "Complete Herbal", WikiMed/MDWiki. Este guia não substitui uma parteira treinada: formem pelo menos duas pessoas por comunidade.

Gravidez — acompanhar

- Comer variado (leguminosas, ovos, verduras escuras, peixe), água limpa, descanso. Evitar álcool, fumo e ervas abortivas (arruda, poejo, artemísia, tanaceto).
- Pesar/medir a barriga todos os meses: o fundo do útero sobe ~1 cm por semana a partir das 20 semanas (umbigo ≈ 20–22 semanas).
- **Sinais de perigo na gravidez** — procurar a pessoa mais treinada já: sangramento vaginal; dor de cabeça forte, visão turva, inchaço súbito da cara/mãos ou convulsões (pré-eclâmpsia/eclâmpsia); febre; saída de líquido antes das 37 semanas; o bebé deixa de mexer; dor de barriga forte e constante.

Preparar o parto (kit limpo)

Sabão, água fervida, panos limpos e fervidos, 2 cordões/fios fervidos, lâmina nova ou tesoura fervida 20 min, luvas ou mãos lavadas e unhas curtas, manta para o bebé, recipiente para a placenta, lanterna. **Os "3 limpos": mãos limpas, superfície limpa, corte do cordão limpo.**

Trabalho de parto (normal)

1. **Dilatação**: contrações regulares que aumentam; deixar a mãe andar, beber, urinar, escolher a posição. Primeiro filho: muitas vezes 12 h ou mais.
2. **Expulsão**: vontade de fazer força; apoiar o períneo com um pano, deixar a cabeça sair devagar. Se o cordão estiver à volta do pescoço e solto, passá-lo por cima da cabeça.
3. Bebé fora: secar, pôr pele-com-pele no peito da mãe, cobrir. Se não respirar: secar e esfregar as costas, limpar boca/nariz, cabeça ligeiramente para trás, 5 sopros suaves só cobrindo nariz+boca, depois ~40 sopros/min; se o coração estiver abaixo de 60 após 1 min de ventilação, compressões com 2 polegares (3:1).
4. **Cordão**: esperar 1–3 min (ou que deixe de pulsar), atar em dois pontos (2 e 5 cm do bebé), cortar entre eles com lâmina limpa. Manter seco, sem pôr nada em cima.
5. **Placenta**: sai normalmente em 30 min. Não puxar o cordão com força. Depois, massajar o útero (fica duro como uma bola) e pôr o bebé a mamar — ambos reduzem a hemorragia. Verificar se a placenta está inteira.

Emergências do parto — reconhecer

- **Hemorragia pós-parto** (> 500 ml, ou a mãe fica pálida, tonta, pulso rápido): massagem do útero contínua, bebé ao peito, esvaziar a bexiga, pernas elevadas, líquidos; se houver misoprostol/oxitocina no kit, usar conforme o manual. Compressão bimanual (manual de parteiras). É a causa nº 1 de morte materna.

- Parto parado > 12 h na expulsão ou > 2 h sem progresso a fazer força; bebé atravessado; braço ou cordão a sair primeiro; pélvico difícil; febre com cheiro mau; convulsões. Ver os capítulos específicos no manual.

Pós-parto e recém-nascido

- Amamentar na primeira hora e a pedido (8–12 vezes/dia); colostro é precioso. Bebé quente (pele-com-pele, gorro).
- Vigiar a mãe 6 semanas: febre, sangue com mau cheiro, dor na barriga → infeção (ver Onde Não Há Médico).
- Sinais de perigo no bebé: não mama, frio ou febre, respiração rápida (> 60/min) ou gemente, pele amarela nas 24 h, umbigo vermelho/com pus, convulsões.
- Espaçar gravidezes ≥ 2 anos: amamentação exclusiva protege só nos 6 primeiros meses e se a menstruação não voltou (método LAM).

Plantas medicinais — uso prudente

Regras: identificar com certeza (2 fontes, ver o módulo Plantas), começar com doses baixas, uma planta de cada vez, nada na gravidez sem certeza, crianças com metade ou menos. Chás: 1 colher de sopa de planta seca (ou 2 fresca) por chávena de água; infusão para folhas/flores (10 min tapado), decocção para raízes/cascas (ferver 10–15 min).

- **Camomila**: digestão, cólicas leves, calmante suave.
- **Hortelã/menta**: náusea, gases (evitar em refluxo forte e em bebés).
- **Gengibre**: náusea (incluindo enjoo da gravidez em dose alimentar), resfriados.
- **Alho**: antimicrobiano suave na comida; cru esmagado sobre feridas pode queimar — usar diluído.
- **Tanchagem (Plantago)**: folha mastigada/esmagada em picadas, pequenas feridas; chá para tosse.
- **Calêndula**: pomada/óleo para pele, feridas superficiais, assaduras.
- **Mil-folhas (Achillea)**: estanca pequenos sangramentos em feridas (não na gravidez).
- **Salgueiro (casca)**: dor e febre (contém salicilatos) — não dar a crianças, nem a quem tem alergia à aspirina ou úlcera.
- **Tomilho**: tosse, garganta (gargarejo).
- **Sabugueiro (flores; bagas só cozidas)**: resfriados, febre.
- **Equinácea**: início de resfriados (curto prazo).
- **Mel**: tosse (nunca a bebés < 1 ano), feridas (mel puro como penso).
- **Valeriana**: insónia, ansiedade.
- **Consolda (confrei)**: apenas externo, em contusões — tóxica para o fígado se ingerida.
- Plantas **perigosas** confundíveis: cicuta (parece cenoura/salsa selvagem), dedaleira, beladona, acónito, teixo. Na dúvida, não usar.

- Secar à sombra, guardar em frascos escuros e etiquetados com nome e data (validade ~1 ano).