12. Plantas silvestres — identificar, comer, usar e evitar envenenamentos

Guia Oracle OS. Baseado em US Army FM 3-05.70 / ATP 3-50.21 (plantas comestíveis e venenosas, **com ilustrações** no acervo), Wikipédia offline e Hesperian. Use a função **Identificar planta pela foto** (aba Acervo ou Início → Plantas) como ponto de partida, nunca como confirmação final.

Regras de ouro

1. **Na dúvida, não coma.** Fome mata em semanas; algumas plantas matam em horas.
2. Confirme com **duas fontes** (foto + guia ilustrado + alguém que conheça). Veja **todas as partes**: folhas (forma, disposição, cheiro), caule (oco? manchado? peludo?), flor, fruto, raiz.
3. **Cogumelos: nunca** por foto ou por "teste". Vários mortais (Amanita phalloides) parecem comestíveis e os sintomas surgem tarde demais.
4. Evite plantas perto de estradas, campos pulverizados, águas poluídas e terrenos industriais.
5. Crianças, grávidas, idosos e doentes são mais sensíveis.

Sinais de alerta (evitar se não tiver certeza absoluta)

- Família da cenoura (**Apiaceae**: flores em guarda-chuva brancas) — inclui **cicuta e cicuta-aquática**, as plantas mais mortais da Europa. Caule com manchas roxas e cheiro a rato = cicuta.
- Seiva leitosa (exceto dente-de-leão e alguns conhecidos), cheiro a amêndoa amarga, folhas em grupos de três (hera-venenosa na América), sementes dentro de vagens (muitas leguminosas silvestres são tóxicas), bagas brancas ou amarelas, frutos com aspeto de amêndoa.
- Sabor amargo forte ou ardor na boca → cuspir.

Sósias perigosos clássicos (Europa)

- **Alho-de-urso** (cheira a alho ao esmagar) × **lírio-do-vale**, **cólquico** e **jarro** (sem cheiro a alho, mortais).
- **Cenoura-brava / pastinaga** × **cicuta**, **cicuta-aquática**, **embude** (Oenanthe — mortal, em valas e margens).
- **Consolda** × **dedaleira** (digitalis, afeta o coração).
- **Salsa/coentros silvestres** × **cicuta-menor** (Aethusa).
- **Sabugueiro-negro** (bagas maduras e cozinhadas comestíveis; cruas, folhas e caules tóxicos) × **sabugueiro-anão/ébulo** (tóxico).
- **Mirtilos** × bagas de **beladona** (pretas, brilhantes, com "estrela" de 5 sépalas — mortais).

Plantas comuns e úteis no Reino Unido e em Portugal (confirme sempre)

- **Urtiga**: folhas novas cozidas (a fervura tira o ardor) — sopa, chá; fibra para corda.
- **Dente-de-leão**: folhas novas em salada (amargas), raiz torrada como "café", flores.
- **Silvas/amoras**: frutos crus; folhas novas em chá.
- **Sabugueiro**: flores em infusão/xarope; bagas maduras **só cozinhadas**.
- **Tanchagem**: folhas novas cozidas; folha esmagada em picadas de inseto.
- **Trevo**, **azedas** (pouca quantidade — oxalatos), **beldroega**, **saramago/mostarda-brava**.
- **Castanheiro** (castanhas cozidas/assadas; não confundir com **castanha-da-índia**, cuja casca tem picos curtos e o fruto não tem ponta — tóxica), **avelãs**, **bolotas** (demolhar e ferver em várias águas para tirar taninos), **pinhões** (pinheiro-manso).
- **Rosa-brava (bagas)**: rica em vitamina C, tirar os pelos das sementes.
- **Algas** de águas limpas: alface-do-mar, nori/laver.

Teste de comestibilidade universal (só em último recurso, e nunca com cogumelos)

Leva cerca de 24 horas por planta e por parte. Teste só plantas abundantes.

1. Jejue 8 horas (só água). Separe a planta nas partes (folha, caule, raiz, flor, fruto) e teste **uma parte de cada vez**.
2. Cheire: cheiro forte e desagradável, a amêndoa amarga ou a pêssego → rejeitar.
3. Esfregue no pulso ou na parte de dentro do cotovelo; espere 15 min. Ardor, comichão ou vermelhidão → rejeitar.
4. Prepare como vai comer (cozer é mais seguro). Encoste ao lábio 3 min; depois na ponta da língua 15 min; depois mastigue e mantenha na boca 15 min **sem engolir**. Qualquer ardor, dormência ou amargor → cuspir e rejeitar.
5. Engula um bocado pequeno e espere **8 horas** sem comer mais nada. Náusea, cólicas → provocar o vómito não é recomendado em geral; beba água, carvão ativado se tiver.
6. Sem reação: coma ¼ de chávena preparada da mesma forma e espere mais 8 horas. Sem reação → essa parte, assim preparada, é provavelmente segura.

Usos além da comida

- **Lenha e fogo**: bétula (casca arde mesmo húmida), pinheiro (resina = acendalha), carvalho e freixo (brasas duradouras). Evite queimar **teixo**, **loendro** e **hera-venenosa** (fumo tóxico).
- **Corda/fibra**: urtiga, casca interior de tília/salgueiro, tábua (ver guia "Cordas e nós").
- **Abrigo**: ramos de conífera para cama isolante; fetos secos.
- **Remédios tradicionais** (eficácia variável, não substituem medicina): casca de salgueiro (salicilatos, dor — evitar em crianças e com anticoagulantes), tanchagem (picadas), camomila e tília (chá calmante), tomilho (tosse). Doses e interações: consulte "MSF Essential drugs" e "Where There Is No Doctor".
- **Repelente**: fumo de folhas verdes; murta e eucalipto esmagados.

- **Água**: folhas de árvores em saco plástico ao sol (transpiração) dão pouca água; nunca de plantas tóxicas.

Envenenamento por planta — o que fazer

- Tire restos da boca, guarde uma amostra da planta (para identificação), ligue 112/999/111 ou o centro antivenenos (Portugal **800 250 250**; Reino Unido NHS **111**).
- Não provoque vómito. Pequenos goles de água. Posição lateral se sonolento. RCP se parar de respirar.
- Seiva na pele (ex.: **pastinaga-gigante / Heracleum** causa queimaduras ao sol): lavar logo com água e sabão, tapar do sol 48 horas.