31. Alongamentos e dores — costas, pescoço, braços, pernas, pés, cãibras e esforço

Guia Oracle OS. Baseado em US Army FM 7-22 e ATP 7-22.02 (alongamentos e recuperação **ilustrados**), NIH/NIA "Exercise & Physical Activity", NHS (dores, cãibras, entorses) e IFRC. Para hemorragias, torniquete, fraturas e feridas veja também "Primeiros socorros" e o PDF ilustrado "Stop the Bleed".

Sinais de alarme — procure ajuda médica (não é para alongar)

- Dor nas costas com **dormência na zona entre as pernas/nádegas**, perda de controlo da urina ou fezes, ou fraqueza das pernas a piorar → **urgência imediata** (compressão de nervos).
- Dor no peito, braço esquerdo ou maxilar, falta de ar → pode ser coração (112/999).
- Barriga da perna **inchada, quente, vermelha e dolorosa** → possível trombose; não massajar.
- Dor após queda ou pancada com deformação, incapacidade de apoiar o peso, osso visível → fratura: imobilizar.
- Dor com febre, perda de peso inexplicada, dor que acorda à noite e não alivia, ou após cancro → avaliação médica.

Regras para alongar bem

1. **Aquecer** 5 minutos antes (andar, rodar braços, marchar no lugar). Músculo frio rasga mais.
2. Alongar até sentir **tensão confortável**, nunca dor aguda. Sem balanços.
3. **Manter 20–30 segundos**, 2–3 vezes cada lado. Respirar devagar, expirar ao aprofundar.
4. Diariamente é melhor do que muito de vez em quando. Depois de esforço grande, alongar suave e caminhar.
5. Dor que piora durante ou fica pior no dia seguinte → reduzir.

Costas (lombar)

- **Joelho ao peito**: deitado de costas, puxe um joelho ao peito com as mãos, 20–30 s; troque; depois os dois.
- **Báscula pélvica**: deitado, joelhos dobrados, encoste a zona lombar ao chão contraindo a barriga, 5 s, 10 vezes.
- **Gato–vaca**: de quatro apoios, arredonde as costas para cima (expirar), depois deixe descer a barriga e olhe em frente (inspirar). 10 vezes devagar.
- **Postura da criança**: de joelhos, sente-se nos calcanhares e estique os braços à frente no chão, testa no chão. 30–60 s.
- **Rotação deitado**: joelhos dobrados juntos, deixe-os cair para um lado, ombros no chão, 20 s; outro lado.
- **Ponte**: deitado, joelhos dobrados, levante a anca até alinhar joelhos-anca-ombros, 5 s, 10 vezes (fortalece glúteos que protegem a lombar).

- **Extensão em decúbito ventral** (dor tipo hérnia que melhora de pé): deitado de barriga para baixo, apoie-se nos antebraços 30 s; depois em mãos com braços esticados, anca no chão, 10 vezes. Pare se a dor descer pela perna.
- **Figura 4 (piriforme / ciático)**: deitado, tornozelo direito sobre o joelho esquerdo, puxe a coxa esquerda ao peito, 30 s; troque.
- **Isquiotibiais**: deitado, perna esticada para cima com uma toalha à volta do pé, 30 s.
- **Flexor da anca**: em posição de cavaleiro (um joelho no chão), empurre a anca para a frente mantendo o tronco direito, 30 s.
- Na dor lombar comum: **manter-se ativo** (caminhar) recupera mais depressa que repouso na cama. Calor alivia a rigidez.

Pescoço e ombros

- **Queixo para trás** (duplo queixo): 5 s, 10 vezes — contra a "cabeça para a frente" de olhar o telefone.
- **Inclinação lateral**: orelha ao ombro, a mão do mesmo lado puxa suave, 20 s cada lado.
- **Rotação**: olhe por cima de um ombro, depois do outro, devagar.
- **Trapézio**: mão atrás das costas, incline a cabeça para o lado oposto e ligeiramente para baixo, 20 s.
- **Rolar os ombros** para trás 10 vezes; **apertar as omoplatas** 5 s, 10 vezes.
- **Peito na porta**: antebraços na ombreira da porta, um passo em frente, 30 s.
- **Ombro cruzado**: braço esticado à frente do peito, o outro braço puxa-o, 20–30 s.
- **Pêndulo** (ombro dorido): incline-se apoiado numa mesa e deixe o braço pendurado fazer pequenos círculos, 1 minuto.

Braços, cotovelos, punhos e mãos

- **Flexores do punho**: braço esticado, palma para cima, puxe os dedos para baixo com a outra mão, 20–30 s.
- **Extensores do punho** (cotovelo de tenista): braço esticado, palma para baixo, dobre o punho para baixo, 20–30 s.
- **Tríceps**: mão atrás da cabeça, a outra empurra o cotovelo, 20 s.
- **Bíceps**: mãos entrelaçadas atrás das costas, braços esticados, levante devagar.
- **Deslizamento dos tendões**: abra a mão, feche em gancho, em punho, em mesa — 10 vezes (formigueiro nas mãos, trabalho repetitivo).
- **Cotovelo de tenista** (dor por fora do cotovelo): fortalecimento lento — segure um peso leve (garrafa), palma para baixo, baixe o punho devagar em 3–4 s, 3×15 por dia, 6–12 semanas.
- Massajar o antebraço com o polegar alivia a sobrecarga de carregar e agarrar.

Pernas

- **Quadríceps**: de pé, apoiado, puxe o calcanhar ao rabo, joelhos juntos, 30 s.

- **Gémeos**: mãos na parede, perna de trás esticada, calcanhar no chão, 30 s; depois com o joelho de trás dobrado (sóleo).
- **Adutores**: sentado, plantas dos pés juntas, joelhos para baixo (borboleta), 30 s.
- **Glúteos**: sentado, cruze uma perna sobre a outra e abrace o joelho ao peito, 30 s.

Pés

- **Fascite plantar** (dor no calcanhar ao primeiro passo da manhã): alongar gémeos (acima) várias vezes por dia; **toalha** à volta da planta do pé puxando os dedos para si, 30 s, antes de se levantar; **rolar a planta do pé** sobre uma garrafa (gelada alivia), 2 minutos; calçado com apoio, evitar andar descalço em chão duro.
- **Dedos**: apanhar uma toalha com os dedos dos pés; abrir os dedos; rodar os tornozelos.
- **Bolhas**: não rebentar se puder; proteger com penso; se rebentar, lavar, deixar a pele, cobrir. Prevenir: meias secas, apertar bem o calçado, fita nas zonas de fricção.
- **Pés de trincheira** (pés frios e molhados muitas horas): secar, aquecer devagar, elevar, trocar meias todos os dias.

Cãibras

- **Na hora**: alongue o músculo no sentido contrário e mantenha até passar — barriga da perna: estique o joelho e puxe a ponta do pé para si; coxa da frente: dobre o joelho puxando o calcanhar; planta do pé: puxe os dedos para cima. Massaje e ande um pouco.
- **Prevenir**: beber água ao longo do dia; em calor e esforço, repor também sais (soro caseiro: 1 L água + 6 colheres de chá rasas de açúcar + ½ colher de chá rasa de sal); alongar gémeos antes de dormir; aquecer antes de esforço.
- Cãibras frequentes, com fraqueza, inchaço ou após começar medicação → médico.

Depois de carregar alguém ou peso durante horas

- **Técnica**: aproxime a carga do corpo, dobre joelhos e anca (não a coluna), costas direitas, levante com as pernas, **não rode o tronco** — rode os pés. Partilhe o peso (maca a 2 ou 4), troque de lado a cada poucos minutos, pause a cada 10–15 minutos.
- **Transporte de feridos**: arrasto pela roupa ou em cobertor gasta menos que carregar ao colo; maca improvisada (ver "Busca e resgate").
- **Recuperar**: caminhar devagar 5–10 min, alongar costas, ombros, antebraços, quadríceps e gémeos; beber e comer (proteína + hidratos); dormir.
- **Dor muscular tardia** (24–72 h depois, músculos rígidos e doridos): é normal; movimento suave, calor, massagem; não precisa de repouso total.
- **Distensão muscular** (dor súbita durante o esforço, por vezes nódoa negra): primeiros 2–3 dias **proteger** (aliviar a carga), **elevar**, **comprimir** com ligadura, frio 15–20 min embrulhado; depois **voltar a mexer** de forma gradual e progressiva sem dor forte.

Dor de osso e articulações

- Dor localizada num ponto do osso que piora ao apoiar após longas marchas → possível **fratura de stress** (pé, tíbia): repouso do impacto 4–8 semanas.
- Entorse (tornozelo torcido): proteger, elevar, comprimir, frio; apoio conforme tolerar; tala/ligadura em 8.
- Joelho ou anca com artrose: movimento regular suave (andar, bicicleta, água) ajuda mais do que parar.

Feridas abertas (resumo)

- Pressão direta forte para parar a hemorragia (10 min). Hemorragia de um membro que ameaça a vida e não para: **torniquete 5–7 cm acima, apertar até parar, anotar a hora** (ver "Primeiros socorros" e "Stop the Bleed").
- Lavar com muita água limpa, tirar sujidade, cobrir com penso limpo; trocar diariamente. Infeção (vermelhidão a alastrar, calor, pus, febre) → antibiótico/médico. Tétano em dia.

Alívio da dor sem e com medicamentos

- Calor (botija, pano quente) para rigidez e contraturas; frio embrulhado 15–20 min para lesão recente e inchaço.
- Paracetamol (adulto: 500 mg–1 g, até 4 g/dia; menos se fígado ou álcool). Ibuprofeno (adulto: 200–400 mg com comida, até 1,2 g/dia sem receita) — **evitar** com úlcera, doença renal, gravidez avançada, anticoagulantes ou asma que piora com anti-inflamatórios. Confirme sempre a bula.