

COGNOMS NOM DNI

Poseu a totes les fulles el NOM i COGNOMS EN MAJÚSCULES i el vostre DNI.

Aquest examen consta de 4 preguntes.

Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la.

Si escau, en cada full podeu escriure per davant i per darrera.

- Només es corregirà el que estigui escrit en bolígraf.
- Si no s'indica el contrari, cal raonar breument totes les respostes.
- Les parts recuperables juntes computen un 70% de la nota de l'assignatura i les parts no recuperables un 30%.

Nota important: La còpia, trànsit d'informació, la **tinència** d'un mòbil o aparell similar (*smartphone*, tauleta, audífon, rellotge intel·ligent, rellotge o calculadora de text, etc.) durant la prova comportarà suspendre l'examen amb una nota de zero, sense perjudici d'estendre la penalització més enllà, d'acord amb els articles de la *Normativa sobre Organització, Desenvolupament i Avaluació dels Estudis de Grau de la Facultat de Ciències* i de la *Normativa Reguladora dels Processos d'Avaluació i Qualificació dels Estudiants* de la Universitat de Girona.

Part No Recuperable

NR) (10 punts) Utilitzant les dades que teniu a continuació, responeu raonadament a les següents qüestions:

- a)** Quin és el comportament general de la primera energia de ionització en moure's per un període de la taula periòdica?
- b)** Es compleix això en comparar el magnesi amb l'alumini? Per què?
- c)** Quin dels dos elements és més reductor? Per què?
- d)** En conseqüència a la resposta a l'apartat anterior, quin dels dos elements té més caràcter metàl·lic i quin presentarà l'òxid més bàsic?

Dades Mg: $Z = 12$; $EL_1 = 737$ kJ/mol; $Z_{3s}^* = 3.308$; $E^0(Mg^{2+}/Mg) = -2.37$ V

Dades Al: $Z = 13$; $EL_1 = 577$ kJ/mol; $Z_{3p}^* = 4.066$; $E^0(Al^{3+}/Al) = -1.68$ V

COGNOMS NOM DNI

Part Recuperable**R1)** (10 punts) Considerant els següents complexos:

- i) di(carbonil)diclorurobis(trifenilfosfina)Fe(II)
- ii) bromuroclorurofluoruroioduroniquelat(2-) de potassi
- iii) $[\text{PdBrCl}(\text{NH}_3)(\text{OH}_2)]$
- iv) $[\text{Cr}(\text{CO})_4(\text{SCN})_2](\text{NO}_3)$


a) Formuleu i) i ii) i anomeu iii) i iv)**b)** Supposeu que ii) és tetraèdric i iii) planoquadrat:**b1)** Quin dels dos complexos presentaria estereoisomeria geomètrica? Representeu i anomeu els dos diastereoisòmers**b2)** Quin dels dos presentaria estereoisomeria òptica? Representeu i anomeu els dos enantiòmers**c)** Sabent que i) i iv) són complexos octaèdrics:**c1)** Quin dels dos pot presentar isomeria òptica? Representeu i anomeu els enantiòmers. Representeu també un diastereoisòmer no quiral**c2)** El que no presenta isomeria òptica, presenta algun tipus d'estereoisomeria?**c3)** Algun dels dos pot tenir algun isòmer estructural d'enllaç? En cas afirmatiu representeu un d'aquests isòmers**d)** Entre i) (Fe^{II} , d^6) i ii) (Ni^{II} , d^8), quin té més possibilitats de ser paramagnètic? Per què?

Dades:

àtom	C	N	O	F	P	S	Cl	Br	I
Z	6	7	8	9	15	16	17	35	53

COGNOMS NOM DNI

R2) (10 punts) Responen a les següents preguntes referents als compostos **A-L** que es mostren a continuació:



a) Completeu la taula següent amb la informació referent als grups funcionals dels compostos **A-L**. En el cas de les amines i els alcohols, indiqueu si són primaris, secundaris o terciaris:

Compost	Grup Funcional	Compost	Grup Funcional
A		H	
B		J	
C		K	
F		L	
G			

b) Anomeneu els compostos següents:

Compost	Nom
B	
C	
G	

c) En relació a la seva habilitat per formar ponts d'hidrogen, classifiqueu els compostos **A-L** en una de les categories següents:

Compostos que poden actuar només com a acceptors de pont d'hidrogen	Compostos que poden actuar tant com a donadors com a acceptors de pont d'hidrogen	Compostos que no poden participar en ponts d'hidrogen


d) Dibuixeu un isòmer de grup funcional del compost **G** i un isòmer de posició del compost **E** que siguin òpticament actius (quirals).

e) Escolliu un dels compostos **A-L** i dibuixeu-ne un isòmer que sigui una forma *meso*.


COGNOMS NOM DNI

R3) (10 punts) Un auxiliar quiral és una molècula òpticament activa que s'incorpora temporalment en una molècula per tal de controlar l'estereoselectivitat d'una reacció. Responen a les següents preguntes que fan referència a la síntesi d'un auxiliar quiral.

a) En la síntesi que es mostra a continuació, indiqueu el grau d'oxidació dels carbonis assenyalats amb una fletxa i indiqueu per a cada una de les reaccions, si es tracta d'una reacció d'oxidació, reducció o d'una reacció en la qual no canvia el grau d'oxidació.




b) Per la primera etapa, que es mostra a continuació, indiqueu els canvis d'hibridació i geometria al passar de reactius a productes.



c) Un dels passos del mecanisme de la reacció de la segona etapa es mostra a continuació. Aquesta reacció es pot explicar per l'atac d'un nucleòfil a un electròfil. Indiqueu quin àtom actua com a centre electròfil i quin com a nucleòfil i dibuixeu amb una fletxa el/s corresponent/s moviment/s d'electrons.

Nota: El mecanisme d'una reacció és el conjunt d'etapes en les quals es desenvolupa una reacció química.



d) El producte de partida de la síntesi és un aminoàcid, la fenilalanina. Dibuixa els dos enantiòmers de la fenilalanina en projecció de Fischer i indica per cada un d'ells si la configuració és D o L.