



整形外科講義

脊椎の変性疾患

2026/6
加藤賢治

腰痛の薬物治療

- 急性腰痛

＊＊行うことを強く推奨する＊＊

- － 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)


＊行うことを弱く推奨する（提案する）＊

- － 筋弛緩薬

- － アセトアミノフェン

- － 弱オピオイド

- － ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液



腰痛の運動療法

- 慢性腰痛

＊＊行うことを強く推奨＊＊


可動域改善，機能障害改善

QOL（生活の質）改善にも効果あり

- 種類の明確な指標はない




リハビリ



腰痛に固定術は有用か

＊行うことを弱く推奨する（提案する） ＊
 椎間板障害であると判明している場合は
 固定術が有用の可能性があるが，厳密に検討．



椎間板性疼痛 臨床治験

腰痛 でお困りの方へ！

長い間、**腰痛**にお悩みではありませんか？


慢性椎間板性疼痛に対しての新規薬剤の治験を行います。



名古屋市立大学病院では、
慢性椎間板性腰痛を対象とした注射剤
による治験※を実施しています。

※治験とは、新しい薬や医療機器、再生医療等製品が厚生労働省で審査を受けて承認され、世の中に出るために、患者さんにご協力いただき、有効性（効果）や安全性（副作用）を確認する試験のことです。

椎間板性腰痛は、日常生活の質に大きな影響を与える病気です。この治験に参加することで、ご自身の症状が改善する可能性がありますし、この治験のデータが今後の治療法の開発・発展に貢献する可能性があります。



治験薬は椎間板内に 1 回のみ注射します。

腰部脊柱管狭窄症：間欠性跛行

一定の距離を歩くと、下肢の痛み・しびれ、脱力感や会陰部の不快感が出て、それ以上歩けない。
しかし腰を曲げると（座ったりしゃがんだりすると）数分で症状が良くなってまた歩ける。



自転車ならどこでも行ける
カートあれば歩ける



腰部脊柱管狭窄症

腰部脊柱管狭窄症：理学所見

- 間欠性跛行
 - 診察時に症状は無いことが多い
- 神経学的所見
 - 通常は筋力低下もなく目立った異常なし
腱反射の低下があるくらい

問診、主訴により診断