

Cognitive Behavioral Therapy — we call it **CBT** !!

精神療法 認知行動療法

南山大学人文学部 心理人間学科 / 保健センター
中野 有美 (名市大卒 精神科医)
yunakano@nanzan-u.ac.jp

2026. 3. 3



認知行動療法 と 聞くと

- どんなことを
ご存知でしょうか
- どのような
イメージが湧きますか



4




5

認知行動療法 と 聞くと

ポジティブな
考え方をしよう、
ってやつですねっ

イメージが湧きま



認知行動療法 は

相談者の、各状況に対する
思い(認知)や**行動**を手掛かりに
一緒に**問題解決を進める**ことで
精神症状や生きづらさを
緩和する
心理的支援

本日の予定

- 認知行動療法の立ち位置と発展
- 認知行動療法を始める際の見立て方
- 認知行動療法を日常で活用する

精神科で行われている治療

- ◆ 薬物療法
- ◆ 非薬物療法
 - 精神療法
 - 心理社会的治療法(ACTなど)
 - 電気痙攣療法
 - 光療法

精神療法とは

心理的な問題をもつ人に対する職業的専門家による心理的治療

精神療法にはどのようなものがあるか

心理教育	来談者中心療法
支持的精神療法	社会生活技能訓練(SST)
精神力動的精神療法	自律訓練法
対人関係療法	バイオフィードバック法
行動療法	催眠療法
認知療法 / 認知行動療法	芸術療法
第3世代認知行動療法	遊戯療法
系統的脱感作法	動機づけ面接法
暴露反応妨害法	森田療法
モデリング法	内観療法
行動活性化技法	家族療法/夫婦療法
問題解決技法	集団精神療法
マインドフルネス	
動機づけ面接法	

標準精神医学(医学書院 2024)第6章
精神科治療学, III 精神療法より


精神療法にはどのようなものがあるか

心理教育	来談者中心療法
支持的精神療法	社会生活技能訓練(SST)
精神力動的精神療法	自律訓練法
対人関係療法	バイオフィードバック法
行動療法	催眠療法
認知療法 / 認知行動療法	芸術療法
第3世代認知行動療法	遊戯療法
系統的脱感作法	動機づけ面接法
暴露反応妨害法	森田療法
モデリング法	内観療法
行動活性化技法	家族療法/夫婦療法
問題解決技法	集団精神療法
マインドフルネス	
動機づけ面接法	

段階的に
分類してみる

標準精神医学(医学書院 2024)第6章
精神科治療学, III 精神療法より

精神療法の 非特異的因子 と 特異的因子



American Association of Directors of Psychiatric Residency Training (AADPRT)

アメリカの精神医学専門実習プログラム
修了生に対し

精神療法についても
コンピテンシー要件を出している

American Association of Directors of Psychiatric Residency Training (AADPRT)

Core Psychotherapy

- 支持的精神療法
- 力動的精神療法
- **認知行動療法**




Aaron T. Beck (1921 ~ 2021)



認知行動療法は
常識に基づくアプローチであり、
次の2つの中心的な教えに
基盤を置いている

- (1) 認知は情動と行動に対して
支配的影響力をもつ
- (2) 活動や行動の仕方が思考パターンや
情動に強い影響を及ぼす可能性がある

Learning Cognitive-Behavior Therapy: an Illustrated Guide Second Edition
(邦訳：認知行動療法トレーニングブック)



認知過程に注目した3人の学者

Aaron T. Beck (1921 ~ 2021)

Albert Ellis (1913 ~ 2007)

Donald H. Meichenbaum (1940 ~)


Aaron T. Beck の 年譜

- 1946年 エール大学医学部を卒業
(ライフサイクル理論エリクソンが教授の1人)
- 精神医学の研修, 精神分析の研修
- 1954年 ペンシルベニア大学にて研究
- 1976年 Cognitive Therapy and the Emotional Disorder 執筆
 - ベックがはじめて認知療法について体系的にまとめた本
 - ベックの認知療法の原点
 - こんな単純な考え方で治療できるわけがない
- 1990年 大野裕が上記著書を翻訳
邦題「認知療法・精神療法の新しい発展」


21

認知療法のパイオニア Aaron T. Beck


- 1960年代に3領域の発展に原型となる考えを打ち出している



< 3 者の関係 >



心理アセスメントは臨床にどう役立つか 丹野 2001



効果研究で有効性を証明された精神療法①

疾患	精神療法	薬物療法
統合失調症	認知行動療法、SST(社会技能訓練) 包括的地域支援プログラム	抗精神病剤
大うつ病	行動療法、認知行動療法 対人関係療法	抗うつ剤
パニック障害	認知行動療法、曝露療法	抗うつ剤 ベンゾジアゼピン
社交不安障害	認知行動療法、曝露療法、SST、リラクゼーション	セロトニン作動性抗うつ剤 ベンゾジアゼピン
強迫性障害	曝露反応妨害法を含む認知行動療法	セロトニン作動性抗うつ剤
PTSD	認知行動療法、曝露療法、EMDR、コーピングスキル訓練	抗うつ剤
睡眠障害	認知行動療法、行動療法	ベンゾジアゼピン

A Guide to Treatments that Work" Oxford University Press, 4th edition 2015

効果研究で有効性を証明された精神療法②

疾患	精神療法	薬物療法
双極性障害	薬物療法の補助的治療法、家族療法 家族への心理教育＋スキルトレーニング	気分安定剤
ADHD	認知行動療法と薬物療法の併用、行動療法、	精神刺激剤
行為障害	認知行動療法、家族療法	
神経性やせ症	認知行動療法＋専門家による支持的な臨床管理	
神経性大食症	認知行動療法、対人関係療法	抗うつ剤
アルコール依存	認知行動療法、動機付け面接 12ステップ促進療法	Naltrexone
ギャンブル障害	認知行動療法	抗うつ剤(?)
境界性人格障害	弁証法的行動療法(認知行動療法) 力動的精神療法	抗うつ剤(?)
抜毛症	認知行動療法	抗うつ剤

A Guide to Treatments that Work" Oxford University Press, 4th edition 2015

我が国の保健医療機関では、
次の疾患について、
16回分の認知行動療法で保険点数が算定できる
(医師もしくは訓練を受けた看護師による実施)

令和2年度 診療報酬点数

- うつ病等の気分障害
- 強迫性障害
- 社交不安障害
- パニック障害
- 心的外傷後ストレス障害
- 神経性過食症

27

2017年10月
世界最大の医学情報サイト Medscapeが発表した
「20世紀に最も影響力のあった医師」

第1位が、DNAの二重らせん構造を発見してノーベル賞を取った
クリックとワトソンのグループ
第2位が小児麻痺の原因になるポリオウイルスの
予防ワクチンを開発した**ソーク博士**、
第3位が、全世界で1000万部を売り上げた育児書で知られる
スブック博士、

第4位が**ベック博士** 認知行動療法を開発・提唱し、
それが世界的に受け入れられて、うつ病をはじめとする
様々な精神疾患の治療や予防に使われるようになったことが
評価された。

第5位は、夢分析で知られる**ユング博士**

ラスカー賞 (アルバート・ラスカー医学研究賞 1946年～)

医学の研究において優れた功績があった者に与えられる賞。
アメリカ医学界最高の賞とされており、
世界的に見てもノーベル生理学・医学賞に次ぐ医学賞と
みなされる。





基礎医学研究賞	2009 山中伸弥 分化した成熟細胞を初期の幹細胞へと誘導する、細胞核再プログラミング(nuclear reprogramming)に関する発見
臨床医学研究賞	2006 <u>アーロンベック</u> 認知療法を開発し 精神疾患への理解および治療に革新をもたらした
公益事業賞	2013 <u>ビル・ゲイツ</u> 世界の喫緊の健康課題に対する見方を変えた歴史的転換、および多くの社会的弱者の生活改善
医学特別業績賞	1994年～

認知療法 / 認知行動療法

① Beckらが開発した認知療法の技法の中には、
創始時より、すでに行動に注目した技法が
含まれていたことなどから、Beckの認知療法を
「認知行動療法」と呼ぶようになった。

② 最近では、行動療法の流れからも「認知を扱うこと」
の重要性が理論化されるようになり、認知と行動を
共に対象とする心理社会的支援を「認知行動療法」
と呼ぶようになってきている。

本日は、①の流れで発展してきているものを扱い
それを認知療法もしくは認知行動療法と呼ぶ。



介入の時期

予防、健康増進、幸福度増進



早期発見、早期介入



精神疾患への治療的介入
症状をターゲットとする

低強度



高強度

本日の予定

- 認知行動療法の立ち位置と発展
- 認知行動療法を始める際の見立て方
- 認知行動療法を日常で活用する

事例：葉子

葉子さんは、大学4年生 元気はつらつな女性です
水泳部に所属し、バイトも文化祭も張り切るタイプ。
4年生になり、張り切って就職活動中。
7月に入り、就活もいよいよ大詰めを迎えています。

ところが、葉子さんは、計らずも苦戦しています。
本命の4社目から、残念な結果をもらい、落ち込みました。
でも、気を取り直して、随分妥協し5社目の面接を受けました。
しかし、それも結局うまく行きませんでした。

葉子さんは気分が沈みがちになり、だんだん自分は就職できないのではないかと思うようになってきました。

5社目をおちて1週間くらいたったころ、大学の食堂で、花子さんが仲間に人気の高い企業に就職が内定したことを大きな声で話していました。花子さんと葉子さんは性格が似ていません。

葉子さんは、自分のような人間は社会では通用しないとますます思うようになりました。食欲も落ちています。

うつ病患者に生じている症状

出来事 → 抑うつ感情 → 抑うつの考え
(もうダメだ・微小妄想)

どちらで考えますか??

出来事 → 暗く捉える → 抑うつ感情

うつ病患者に生じている症状

出来事 → 抑うつ感情 → 抑うつの考え
(もうダメだ・微小妄想)

自分は落ちたが、花子は内定した

落ち込む

自分は社会で必要とされていないダメな人間だ

出来事 → 暗く捉える → 抑うつ感情

自分は落ちたが、花子は内定した

自分は社会で必要とされていないダメな人間だ

落ち込む

～精神病理学のパラダイムシフト～

A: 誘発する出来事 C: 感情 B: 認知

出来事 → 抑うつ症状 → 暗い考え
(もうダメだ・微小妄想)

抑うつ(C)だから抑うつの認知(B)となる

.. CBTでのとらえ方 ↓


A: 誘発する出来事 B: 認知 C: 感情

出来事 → 自動思考 → 抑うつ症状

そういう考え方(B)だから抑うつ(C)になる


Beckの抑うつ認知理論

<A: 誘発する出来事> <B: 認知> <C: 感情>




Beckの認知理論の用語

<A: 誘発する出来事> <B: 認知> <C: 感情>



Beckの認知理論の用語

<A: 誘発する出来事> <B: 認知> <C: 感情>



もう少し、臨床症状が出ている人では・・・？


結婚4年目不妊で悩む Jさん

ある日・・・



結婚4年目不妊で悩む Jさん

<A: 誘発する出来事> <B: 認知> <C: 感情>




事例: 葉子

葉子さんは、大学4年生 元気はつらつな女性です 水泳部に所属し、バイトも文化祭も張り切るタイプ。 4年生になり、張り切って就職活動中。 7月に入り、就活もいよいよ大詰めを迎えています。

ところが、葉子さんは、計らずも苦戦しています。 本命の4社目から、残念な結果をもらい、落ち込みました。 でも、気を取り直して、随分妥協し5社目の面接を受けました。 しかし、それも結局うまく行きませんでした。

葉子さんは気分が沈みがちになり、だんだん自分は就職できないのではないかと思うようになってきました。

5社目をおちて1週間くらいたったころ、大学の食堂で、花子さんが仲間の人気の高い企業に就職が内定したことを大きな声で話していました。 花子さんと葉子さんは性格が似ていません。 葉子さんは、自分のような人間は社会では通用しないとますます思うようになりました。 食欲も落ちています。



疾患別：症状緩和に関連した共通の認知など

	症状に関連した共通の認知、その他の特徴
うつ病	自分、環境(周囲の人)、未来に対する絶望
パニック症	発作が起こると取り返しがつかないことになる
社交不安症	変な人だと思われると排斥される
強迫症	困ったことが起こらないように自分が責任をもたなければならない
慢性腰痛	ぎりぎりまで頑張ることが価値があることだ
ADHD	考えが奔逸しやすい 感情の起伏が大きく感情に飲まれやすい
統合失調症	妄想の中に、 その人が大切にしていることが隠れている

緩和したいのは

精神疾患・精神症状
+
患者が生活の中で困っていること



CBTとしての治療戦略を練る


どの認知
あるいは、その認知に伴う行動に
的を絞るか目星を付ける



本日の予定

- 認知行動療法の立ち位置と発展
- 認知行動療法を始める際の見立て方
- 認知行動療法を日常で活用する


中枢神経









© CSLS University of Tokyo

53

大脳の機能する場所



<http://www.hugly-lovely.jp/kiso/second01.php>



花子さんが先に決まったとなると、焦りも出ますよね。ところで、そんなにこれまでも社会に必要とされていない経験はおもちですか。社会に臨まれていると実感できた経験をおもちなら、それも教えてください。

大学時代は、必要とされていると思っていたから今回落ち込んでしまったのだと思います。総菜屋のバイトも結局3年以上続いているし、文化祭でも、推薦されて実行委員をしていますし。。

なるほど、これまで、自分は必要ではないんだと感じた経験はほとんどないということですね。それなのに、今回は、そう感じている。今までと、今回と、何が違うのですかね。

学生と実社会は違う、厳しい、ということだと思います。

なるほどね。ところで、応募した会社の人は、あなたの何を見ているのですかね。

提出した書類と面接です

そうですね。提出した書類と面接で社会に必要な子かどうか決定しようとする、葉子さんはあまり必要なくて花子さんは必要だった、ということでしょうか

花子とは受けた会社も全然違いますから、運もあると思います。

なるほど、そういう面もあるでしょうね。先ほど、葉子さんは、自分は社会で必要とされていない、とおっしゃっていたけれども、やはりそうでしょうか。

なるほど、そういう面もあるでしょうね。先ほど、葉子さんは、自分は社会で必要とされていない、とおっしゃっていたけれども、やはりそうでしょうか。

社会は、学生時代と違って厳しい、とは思いますが、だから、社会に全面的に拒否された、と思うのは、考え過ぎかもしれません。

ふむ。ちょっと考えすぎていたかもしれませんね。。。社会に全面的に拒否された、というのは確かに大げさすぎるけども、実際、苦戦されているのは事実なわけです。なるべく合格するにはどう工夫したらよいか、そちらを整理していくことも大切だと思います。よろしければ、一緒に工夫していきませんか？

Beckの認知理論の用語

<A: 誘発する出来事> <B: 認知> <C: 感情>

```

  graph LR
    A[出来事] --> B[自動思考]
    B --> C[感情]
  
```

ここを整理する図

浮かんだ考え、思い、イメージ

気分

できごと

ここを整理する図

浮かんだ考え、思い、イメージ

気分

できごと

ある出来事において気分の高まりとそれにリンクしているその人の思い(考え)に注目

どのような感情・感覚があるか




マイナスの感情を分類する

感情	感情用語
つらい感情	がっかりした、絶望した、残念な、みじめな、傷ついた、寂しい、やる気の無い、無力な
否定的な感情	怖い、気がかり、心配な、心細い、緊張した、ぞっとする、ドキドキする、用心深い
	むかつく、いまいましい、うんざり、ねたましい、苦々しい、不愉快、不快
	つらい、悩む、困惑、わけがわからない、うろたえる、途方にくれている、狼狽する、行き詰まる

<つらい気分> <背景にある思い>

心配系	心配だ 不安だ 焦る	■自分にとって不利な / 危険なことが起こりそうで、それをコントロールする自信がない
悲しい系	悲しい 寂しい がっかりした	■自分にとって価値があるものを失った ■あると思っていたものがないことに気づいた
怒り系	イライラする 腹が立つ ムカつく	■自分の権利が侵された ■不当だ ■納得がいかない



自分を思いやる気持ちを持ち続けながら自分の気分に気づく、という習慣をつけるとそこから、「思い」にたどり着く。

これらの作業を通して自分の気分や思いと距離を取ることが出来るので


- 少し落ち着ける
(気分巻き込まれて悪化していかない)
- 場合によっては、
対応を検討することもできる

自分を思いやる気持ちを持ち続けながら自分の気分に気づく、という習慣をつけるとそこから、「思い」にたどり着く。


これらの作業を通して自分の気分や思いと距離を取ることが出来るので

- 少し落ち着ける(感情に巻き込まれない)
- 場合によっては、
対応を検討することもできる
- 治療者が患者を「思いやる」立場にすることで患者は素直に
自分の気分や思いに気づきやすくなる

これがCBTの流れを利用した
相談活動です



ここを整理する図




つらい感情、いやな気分	カラダも反応している
心配、不安	ドキドキする 冷や汗が出る 手が震える 胃が痛くなる
悲しい、がっかり 寂しい	カラダが重くなる 胃が重くなる 動きが遅くなる 涙が出る
腹が立つ イライラする	顔が紅潮する カラダに力が入る 目を見開く 声が大きくなる


ここを整理する図




ここを整理する図



ここを整理する図





ここを整理する図を活用しましょう

- 「図」を使って自分の体験を整理をすることで、自分の気分や思いから距離を取ることができる
- つらい気分を強く感じた具体的な瞬間に焦点を当てる
- つらい気分を強く感じた時、その人の思い(考え)がリンクしている
- つらい気分を強く感じた時、カラダの反応もリンクしている

