

皮膚科講義

蕁麻疹・薬疹・紅斑症・紅皮症を理解する
皮膚免疫と炎症反応の関係

令和8(2026)年4月13日

豊川市民病院 皮膚科 西尾栄一


はじめに: 本日の内容

- 皮膚免疫
- 蕁麻疹
- 薬疹
- 紅斑症と紅皮症

皮膚免疫

皮膚免疫

アトピー性皮膚炎における皮膚での病態




皮膚免疫:経皮感作によるアレルギー発症

- 皮膚:外界との接点→免疫機構が発達
- 経皮感作:乳児期に湿疹が持続すると湿疹部のバリア機能は低下しており発達した免疫機構が過剰に働き、口囲などの湿疹部に付着した食物に反応してアレルギーを獲得してしまう。つまり感作が消化管を通してではなく皮膚経由で起こる。この経路が最近重要視されており、この観点から乳児期の湿疹治療や保湿の重要性が言われている。
- 上記よりAllergic marchの一部は説明できる。

アレルギーマーチ (Allergic march)

アレルギーマーチは、アレルギーになりやすい子どもが成長するにつれて、いろいろなアレルギー疾患に順番にかかっていく様子をたとえたものです。最近では、ぜん息や花粉症を先に発症したり、もっと低年齢から発症する傾向があります。

すこやかライフNo.43 2014年3月発行
小児ぜん息 その他のアレルギー特集 子ども
の成長とアレルギー「アレルギーマーチ」から
学ぶアレルギー疾患の予防と管理より



蕁麻疹

蕁麻疹

- 急性と慢性 6週が境界（以前は4週）
- 肥満細胞→ヒスタミン→真皮の血管浮腫
- 膨疹の持続：24時間以内（多くは数時間）

蕁麻疹の病型（ガイドラインより）

- 特発性75%—大部分が原因不明
- 特殊なもの（原因がある）
 - アレルギー性
 - 食物依存性運動誘発アナフィラキシー：＊
 - 非アレルギー性
 - コリン性（汗のアセチルコリンに反応）
 - 物理性（機械性、温熱、寒冷、日光など）
 - 接触じんましん

* 食物依存性運動誘発アナフィラキシー (Food-dependent exercise-induced anaphylaxis:FDEIA)

- 原因として小麦、甲殻類など
- 摂取後数時間以内に運動して発症
- 抗原:小麦の ω -5グリアジン、茶のしずく石鹼の加水分解小麦中のグルパール19sなど
- 携帯用アドレナリン注射薬(エピペン®)の適応

蕁麻疹の類症

- 血管性浮腫：限局性
 1. 特発性：Quincke浮腫など
 2. 外来物質起因性
 3. C1-esterase inhibitor (C1-INH)の低下もしくは欠損による血管性浮腫：遺伝性血管性浮腫（HAE:hereditary angioedema）
- 蕁麻疹様血管炎
 - 膨疹が24時間以上持続
 - 基礎疾患（SLE、RA、B型肝炎など）のあるものも

蕁麻疹の治療：ガイドラインより

- 特発性—抗ヒスタミン剤が第一選択
第1世代：ケトチフェンなど 鎮静性—眠気
第2世代：フェキソフェナジンなど 非鎮静性
- 無効例には
ロイコトリエン拮抗薬
H2受容体拮抗薬
ステロイド内服（低用量、外用は無効）
生物学的製剤：抗IgE抗体（オマリズマブ）など
- 原因のあるもの
可能なら原因の除去、回避：困難な場合も多い
特発性に準ずる治療も行われる
- 遺伝性血管性浮腫はINH投与など（特発性の治療無効）

蕁麻疹：症例

多型滲出性紅斑(後述)
との鑑別が難しいものも



藥疹

薬疹とは

- 薬疹とは：薬剤または代謝産物により誘発される皮膚・粘膜の発疹。
- あらゆる種類の皮疹型がある。
- ほとんどすべての薬剤が原因となりうる。

薬疹の皮疹型

- 紅斑丘疹型
- 多形紅斑型
- 固定薬疹（内服すると同じところに出る）
- 湿疹型
- 扁平苔癬型
- 光線過敏型
- 水疱（症）型
- 蕁麻疹型
- 紫斑型
- 他

重症型薬疹

- 中毒性表皮壊死症
(TEN: toxic epidermal necrolysis)
びらんなどの表皮壊死の面積が10%以上
ときに致命的となる
- Stevens-Johnson syndrome
びらんなどの表皮壊死の面積が10%未満
粘膜障害が強い
- 薬剤性過敏症症候群
(DIHS: drug-induced hypersensitive syndrome)
特定の薬剤、肝機能障害

症例(不全型TEN)

患者:30歳男性

既往歴・家族歴:特記事項なし



現病歴:2012年4月、イブクイック[®]内服数時間後に陰部と左大腿に水疱・びらん出現したが拡大なく、程なく軽快した。11月初旬、イブA[®]内服2-3時間後より全身の紅斑と陰囊・左大腿の水疱・びらん出現。翌日大阪府の病院を受診し、点滴(ポララミン[®] 5mg、ファモチジン20mg、ソルコーテフ[®] 100mg)を受けた。その翌日近医皮膚科受診、プレドニゾロン10mg/日内服処方され、重症薬疹疑いにて紹介となりさらにその翌日(第4病日)当科初診。

初診時臨床像



初診時全身の紅斑と左大腿内側の水疱を認めた

症例：ロキソプロフェン(ロキソニン®)による薬疹 (Stevens-Johnson症候群、初診時)




初診時体幹四肢の多数の紅斑や丘疹、口唇および口腔内のびらんと口唇の腫脹および痂皮を認めた。腹部の紅斑より皮膚生検を行った。

入院1週後




口唇のびらんは残存し、体幹四肢の紅斑・びらんは痂皮化している。

病理組織像



弱拡大像



強拡大像

拡大像では表皮の空胞変性と真皮浅層の血管周囲のリンパ球浸潤がみられる。

表皮の強拡大像では有棘細胞の壊死、膨化、好酸性変性、アポトーシス様の核濃縮などの像を呈していた。

症例

Acute generalized exanthematous pustulosis(AGEP)
(原因薬セフメタゾン)



発熱を伴い、紅斑、小膿疱を生じる

症例：サリチルアミドによる固定薬疹



症例：ゲフィチニブ(イレッサ®) による皮膚障害



- ・脂漏性皮膚炎、ざ瘡様発疹、爪囲炎などが多い
- ・分子標的薬の中には、副作用としての発疹が出ているほど予後のよいものもある。(ゲフィチニブについてはevidenceはない)

薬疹の治療

- 原因薬中止(すべてに共通)
- 軽症：抗ヒスタミン剤、ステロイド外用剤
- 中等症：ステロイド内服
- 重症：ステロイド・パルス、血漿交換など

重症薬疹の治療例：前述の不全型TEN

ヒドロコルチゾンコハク酸
エステルナトリウム100mg


塩酸フェキソフェナジン120mg/日



mPSL
250mg/日



PSL
(mg/日)



紅斑
びらん

病日 1 2 3 4 6 7 11 14 15 18 21 28 33

イブA®
内服

初診
入院

退院


参考：経皮吸収量とステロイド軟膏の選択

- 使用するステロイド外用剤のランクの選択には紅斑など皮疹・症状の強さとともに外用する部位も重要となる。
- 皮膚は部位により角層の厚さや毛孔、汗孔の数が異なり、それにより薬剤の吸収率も異なる。吸収のよいところに強い薬を使えば、効果だけでなく副作用も出やすい、逆に吸収の悪いところでは軽い症状でも強い薬を必要とすることもある。

ヒトにおけるヒドロコルチゾンの 部位別経皮吸収率

● ヒトにおけるヒドロコルチゾンの部位別経皮吸収率

ステロイド外用薬の経皮吸収率は、部位によって異なります。



特に顔面や陰部など角層の薄い部位は、一般的にステロイド外用薬が吸収されやすい部位です。

特に手のひらや足底など角層の厚い部位は、一般的にステロイド外用薬が吸収されにくい部位です。

原因薬の検索

- プリックテスト、スクラッチテスト、皮内テスト：即時型アレルギー
- パッチテスト：遅延型アレルギー
- DLST (drug lymphocyte stimulation test)
パッチテストとDLSTでは陰性の結果は意味がない
- 再投与：ごく少量から皮疹を誘発するまで徐々に増量、結果の信ぴょう性は最も高いが...

薬疹情報

薬剤別に分類した薬疹のデータブック

薬疹情報

Collected Report of Drug Eruptions in Japan

第15版

1980 - 2012



医療法人 FDC

編集: 福田皮ふ科クリニック

院長 福田 英三

協力者: 中央調剤薬局長
福田 文明

年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	備考	(1) 投与薬剤: ニューカイトキZ (2) 反応の見られた他の薬剤: アリルイソプロピルアセチル尿素 日皮会誌 119: 962, 2009 (鎌谷)
39: 固定薬疹 (多発)	年齢・性	22歳・女	検査	陽性: P.T	
40: 固定薬疹 (多発)	年齢・性	18歳・女	検査	陽性: P.T. 内服誘発試験	投与薬剤: 新セデス, 新コルゲンコーワかぜ薬 日皮会誌 122: 98, 2012 (倉持)
● サリチルアミド Salicylamide	年齢・性	45歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
【製】 同名	年齢・性	68歳・男	検査	陽性: P.T	
1: 蕁麻疹型	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験/陰性: prick test, scratch test	
2: 固定薬疹 (多発)	年齢・性	55歳・女	検査	陽性: P.T	
3: 固定薬疹 (多発)	年齢・性	1カ月 (注射)	検査	陽性: P.T	
4: 紅斑 (顔面)	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
5: 渗出性紅斑型	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
6: 播種状紅斑丘疹型	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
7: 固定薬疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
8: 固定薬疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
9: 蕁麻疹型	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
10: アナフィラキシー	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
11: nonpruritic	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
12: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
13: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
14: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
15: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
16: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
17: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
18: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
19: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
20: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
21: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
22: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
23: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
24: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
25: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
26: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
27: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
28: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
29: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
30: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
31: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
32: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
33: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
34: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
35: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
36: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
37: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
38: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
39: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
40: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
41: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
42: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
43: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
44: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
45: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
46: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
47: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
48: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
49: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
50: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
51: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
52: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
53: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
54: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
55: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
56: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
57: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
58: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
59: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
60: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
61: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
62: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
63: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
64: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
65: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
66: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
67: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
68: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
69: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
70: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
71: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
72: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
73: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
74: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
75: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
76: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
77: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
78: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
79: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
80: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
81: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
82: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
83: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
84: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
85: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
86: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
87: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
88: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
89: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
90: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
91: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
92: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
93: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
94: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
95: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
96: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
97: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
98: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
99: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	
100: 蕁麻疹	年齢・性	19歳・女	検査	陽性: 内服誘発試験	

プリックテスト、皮内テスト



プリックテスト陽性例： メシマコブエキスによるアナフィラキシー



初診時現症
体幹・上肢の膨疹




プリックテスト15分後
上部がメシマコブエキス

プリックテスト陽性例



茶のしずく石鹼によるアナフィラキシー
加水分解小麦成分グルパール19S



筋弛緩剤エスラックス®
によるアナフィラキシー

プリックテスト陽性例



15分後：アニサキス粗抗原
(上段中央)がヒスタミン(上段
右)とほぼ同サイズとなり陽性

翌朝：他は消退しているがア
ニサキス粗抗原のみ遅発反
応を起こしている

パッチテスト



パッチテスト陽性例



紅斑消退後にセルベックス®(10%pet)、セレコックス®(10%pet)、白色ワセリン(陰性対照)のパッチテストを行った。結果はセレコックスで48時間後+?、72時間後+(ICDRG基準)であった(図3)が、他はいずれも陰性であった。

72時間後

紅斑症・紅皮症

多形(滲出性)紅斑

- 典型的なもの：四肢伸側の関節部に好発
- Target lesion (標的様の紅斑)
- ヘルペスウイルス群などに対する感染アレルギー
- 薬疹の多くはこのタイプを呈する

多形(滲出性)紅斑：症例

- 何らかの感染によるものが考えられ、発熱とともに紅斑出現
- 全身に紅斑が出現
- Target lesionもみられる



結節性紅斑

- 下腿に好発（特に伸側、単発、多発）
- 皮下脂肪織炎
- 発熱、倦怠感などを伴うことが多い
- ベーチェット病、サルコイドーシス、潰瘍性大腸炎、クローン病などで出現することもある。
- 多いのは病巣感染アレルギー（細菌、ウイルス）
- 鑑別疾患：白血病、悪性リンパ腫、蜂窩織炎、丹毒など
- ステロイド全身投与が有効、NSAIDも使用される

結節性紅斑：症例

- 発熱を伴い下腿に硬結のある紅斑が出現
- たびたび四肢に同様の症状を繰り返しているが、この時は骨折治療のためボルトを入れた術創部に出現した。



その他の紅斑症

- 硬結性紅斑

下腿

皮下脂肪織炎

結核菌アレルギー

潰瘍化することもある

- 環状紅斑

遠心性環状紅斑、慢性遊走性紅斑など

内臓悪性腫瘍に随伴するタイプもあり

紅皮症

全身があかくなる、原因別に下記のような分類となる

- ・湿疹続発性
- ・乾癬性
- ・薬剤性
- ・皮膚T細胞リンパ腫(CTCL: cutaneous T cell lymphoma): 菌状息肉症、セザリー症候群など