




皮膚リンパ腫と間葉系腫瘍見分け方 臨床と病理診断のポイント



2026年4月27日

名古屋市立大学医学部医学科

M4 講義

坂井田高志

目次

- ▶ 皮膚リンパ腫総論
- ▶ 皮膚リンパ腫各論
- ▶ 間葉系腫瘍（繊維組織系）
- ▶ 間葉系腫瘍（脂肪組織系）
- ▶ 間葉系腫瘍（筋組織系）
- ▶ 間葉系腫瘍（骨組織系）
- ▶ 間葉系腫瘍（脈管系）
- ▶ 間葉系腫瘍（組織球・肥満細胞系・形質細胞系）

皮膚リンパ腫（総論）

～皮膚に現れる「血液腫瘍」をどう捉えるか～

皮膚リンパ腫 総論

1. 病型と疫学

1.1 皮膚リンパ腫の病型

1.2 皮膚リンパ腫の疫学

2. 皮膚リンパ腫診断に必要な知識

2.1 皮膚リンパ腫の診断

2.2 免疫染色

皮膚リンパ腫とは何か？

→ “皮膚に原発する”リンパ腫

▶ 問いかけ「皮膚に“血液腫瘍”ができるって知っていましたか？」



基本のキ

リンパ球にはT細胞とB細胞がある！！

● T細胞性リンパ腫

- ・菌状息肉症（MF）
- ・セザリー症候群（SS）
- ・成人T細胞リンパ腫・白血病（ATL）

などなど・・・たくさん！

● B細胞性リンパ腫

- ・原発性皮膚辺縁帯B細胞リンパ腫
- ・原発性皮膚濾胞中心リンパ腫

などなど・・・こちらもたくさん！

皮膚リンパ腫の大半はT細胞性。講義ではT細胞リンパ腫を中心に説明します！

1.1 皮膚リンパ腫の病型

・最新の分子遺伝学的知見を
背景に2022年にWHO分類
改訂第5版が発表

・2024年に刊行された

皮膚T細胞・NK細胞リンパ腫

菌状息肉症 (Mycosis fungoides: MF)

菌状息肉症のバリエーション

毛包向性菌状息肉症 (Folliculotropic MF)

パジェット様細網症 (Pagetoid reticulosis)

肉芽腫様弛緩皮膚 (Granulomatous slack skin)

セザリー症候群 (Sézary syndrome)

成人T細胞白血病・リンパ腫 (Adult T-cell leukemia-lymphoma)

原発性皮膚CD30陽性リンパ増殖異常症

(Primary cutaneous CD30-positive T-cell lymphoproliferative disorder)

・ 原発性皮膚未分化大細胞型リンパ腫 (Primary cutaneous anaplastic large cell lymphoma)

・ リンパ腫様丘疹症 (Lymphomatoid papulosis)

皮下脂肪織炎様T細胞リンパ腫 (Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma)

節外性NK/T細胞リンパ腫 (Extranodal NK/T-cell lymphoma)

種痘様水疱症リンパ増殖異常症 (Hydroa vacciniforme lymphoproliferative disorder)

重症蚊刺アレルギー (Severe mosquito bite allergy)

原発性皮膚 $\gamma\delta$ T細胞リンパ腫 (Primary cutaneous $\gamma\delta$ T-cell lymphoma)

原発性皮膚CD8陽性進行性表皮向性細胞傷害性T細胞リンパ腫

(Primary cutaneous CD8-positive aggressive epidermotropic cytotoxic T-cell lymphoma)

原発性皮膚CD4陽性小型・中型T細胞リンパ増殖異常症

(Primary cutaneous CD4-positive small/medium T-cell lymphoproliferative disorder)

原発性皮膚末梢性T細胞リンパ腫, 非特定型

(Primary cutaneous peripheral T-cell lymphoma, NOS)

原発性皮膚末端型CD8陽性T細胞リンパ増殖異常症

(Primary cutaneous acral CD8-positive T-cell lymphoproliferative disorder)

皮膚B細胞リンパ腫

原発性皮膚辺縁帯リンパ腫 (Primary cutaneous marginal zone lymphoma)

原発性皮膚濾胞中心リンパ腫 (Primary cutaneous follicle center lymphoma)

原発性皮膚びまん性大細胞型B細胞リンパ腫, 下肢型

(Primary cutaneous diffuse large B-cell lymphoma, leg type)

EBV陽性粘膜皮膚潰瘍 (EBV-positive mucocutaneous ulcer)

血管内大細胞型B細胞リンパ腫 (Intravascular large B-cell lymphoma)

下線：WHO分類改訂第5版で追加，名称変更された病型

1.2 皮膚リンパ腫の疫学 珍しい？

❖ 罹患率（稀！）

- ・日本：0.4人以上/10万人・年

どんな人に多い？

❖ 発症頻度と分布

- ・日本では**九州・沖縄地方**にATLの流行地域がある.

❖ 性差・年齢

- ・皮膚リンパ腫の男女比（男性/女性）は1.39と男性にやや優位
- ・高齢者に好発




2.1 皮膚リンパ腫の診断

これはリンパ腫だろうか、湿疹だろうか




- ・リンパ節の腫脹はある？
- ・採血→異形リンパ球出ている？
sIL-2R（リンパ腫のマーカー）は？
- ・リンパ腫だから骨髄検査？



残念！！
皮膚リンパ腫の初期は
こういった明らかな所見は乏しい

診断は簡単じゃない！！

2.1 皮膚リンパ腫の診断 生検してみた



・紫のクリクリがリンパ球??




必要なのは免疫染色！！

❖ **重要ポイント**


- ・H&E染色や核形との比較で判断する
→腫瘍細胞か, 炎症のリンパ球か

2.2 免疫染色


CD3 (T細胞)




CD20 (B細胞)



CD4



CD8



今回はCD4陽性タイプのT細胞性リンパ腫

皮膚T細胞リンパ腫 各論

1. 菌状息肉症/セザリー症候群

1.1 治療：PUVAバス療法

1.2 治療：ベキサロテン

1.3 治療：全身療法の流れ

2. 成人T細胞白血病・リンパ腫

3. 原発性皮膚CD30陽性T細胞リンパ増殖異常症


3.1 原発性皮膚未分化大細胞型リンパ腫

3.2 リンパ腫様丘疹症

4. 皮下脂肪織炎様T細胞リンパ腫

1. 菌状息肉症 (Mycosis fungoides: MF)

- ・最も頻度の高い原発性皮膚リンパ腫
- ・CD4陽性タイプのT細胞リンパ腫の代表例
- ・経過：patch → plaque → tumor
- ・慢性的な進行（数年～数十年）
- ・高齢者に多い
- ・稀に小児・青年にも発症




❖ 菌状息肉症 における皮膚病変

皮膚病変	定義
斑 (patch)	隆起や浸潤を伴わない皮膚病変で大きさは問わない
局面 (plaque)	隆起または浸潤を伴う皮膚病変で大きさは問わない
腫瘤 (tumor)	径が ≥ 1 cmで深達性の浸潤または垂直方向への増殖を示す (潰瘍のみでは皮膚腫瘤とはしない)
紅皮症 (erythroderma)	体表面積の $\geq 80\%$ を占める融合性紅斑

菌状息肉症 臨床




菌状息肉症 病理 (HE)




菌状息肉症/病理（免疫染色と一緒に）


CD3




CD4




CD8




CD20



CD30



HE



MFの亜型（代表的3亜型）

- folliculotropic MF
- pagetoid reticulosis（稀）
- granulomatous slack skin（稀）

Folliculotropic mycosis fungoides



Folliculotropic mycosis fungoides presenting with an indurated plaque and follicular papules involving the eyebrow.

From: Ahn CS, ALSayyah A, Sangüeza OP. Mycosis fungoides: an updated review of clinicopathologic variants. *Am J Dermatopathol* 2014; 36:933. DOI: [10.1097/DAD.0000000000000207](https://doi.org/10.1097/DAD.0000000000000207). Copyright © 2014 International Society of Dermatopathology. Reproduced with permission from Wolters Kluwer Health. Unauthorized reproduction of this material is prohibited.

1. セザリー症候群 (Sézary syndrome)

- ・三徴候：

- ①紅皮症（掻痒を伴う）

- ②リンパ節腫脹

- ③セザリー細胞（皮膚・血液・リンパ節）

- ・組織像はMFと類似するが、表皮向性に乏しいことがある

- ・1/3の皮膚生検では非特異的組織像

- 血液中の異常T細胞の証明が重要

Sezary細胞




表 4 菌状息肉症・セザリー症候群の TNM 分類およびそれに基づく病期. (文献 26) より引用)

T ₁ : 体表面積の<10% T1a (紅斑のみ), T1b (局面±紅斑)	
T ₂ : 体表面積の≥10% T2a (紅斑のみ), T2b (局面±紅斑)	
T ₃ : 腫瘤形成 1 病変またはそれ以上	
T ₄ : 紅皮症 体表面積の 80% 以上	
No: 臨床的に異常リンパ節なし. 生検不要	
N ₁ : 臨床的に異常リンパ節あり. 組織学的に Dutch Gr1 または NCI LN ₀₋₂ に相当*	
N _{1a} : クローン性増殖なし N _{1b} : クローン性増殖あり	
N ₂ : 臨床的に異常リンパ節あり. 組織学的に Dutch Gr 2 または NCI LN ₃ に相当*	
N _{2a} : クローン性増殖なし N _{2b} : クローン性増殖あり	
N ₃ : 臨床的に異常リンパ節あり. 組織学的に Dutch Gr 3-4 または NCI LN ₄ に相当*	
Nx: 臨床的に異常リンパ節あるが, 組織学的確認なし.	
M ₀ : 内臓病変なし M ₁ : 内臓病変あり	
B ₀ : 異型リンパ球が末梢血リンパ球の 5% 以下	
B ₁ : 異型リンパ球が末梢血リンパ球の 5% を超えるが, B2 基準を満たさない	
B ₂ : クローン陽性で下記の 1 つを満たす: 1) セザリー細胞≥1000 個/uL, 2) CD4/CD8≥10, 3) CD4+CD7-≥40% または CD4+CD26-≥30%	

Stage	T	N	M	B
I A	1	0	0	0,1
I B	2	0	0	0,1
II A	1-2	1,2	0	0,1
II B	3	0-2	0	0,1
III A	4	0-2	0	0
III B	4	0-2	0	1
IV A1	1-4	0-2	0	2
IV A2	1-4	3	0	0-2
IV B	1-4	0-3	1	0-2

*リンパ節の NCI 分類

NCI LN₀: リンパ節に異型リンパ球なし.


NCI LN₁: 所々, 孤立性異型リンパ球 (集塊を作らない)

NCI LN₂: 多数の異型リンパ球または 3-6 細胞の小集塊

NCI LN₃: 異型リンパ球の大きな集塊あるが, リンパ節の基本構造は保たれる.

NCI LN₄: リンパ節構造が異型リンパ球または腫瘍細胞によって部分的あるいは完全に置換される.

生存率



本邦における菌状息肉症/セザリー症候群の病期別全生存期間（n = 105, 1976-2011年）

Tobisawa S, Honma M, Ishida-Yamamoto A, et al: Prognostic factors in 105 Japanese cases of mycosis fungoides and Sézary syndrome: clusterin expression as a novel prognostic factor. *J Dermatol Sci*, 2013; 71: 160-166.

1.1 PUVAバス療法 (skin direct therapy)

PUVA (ソラレン+ 紫外線A) バス療法の手順

1.薬浴

37度のお湯に0.0001%濃度のソラレンを入れ, 15分間薬浴を行う
※ソラレンは皮膚を光に敏感にする物質

2.紫外線A (UVA) を照射

※治療中はサングラスを着用し, 陰部などの過敏な部位は遮光

3.帰室後の処置

照射後は病室に戻り, 必要に応じて軟膏を塗布

4.遮光

治療後2時間は直射日光を避けて過ごす



1.2 ベキサロテン

❖皮膚T細胞リンパ腫に使われるRXR選択的レチノイド（ビタミンA）

→腫瘍性T細胞の分化・増殖を抑える

❖ 有効性

早期MF：病期IA～IIA	奏効率54%, CR率7%, 再発率13% ¹
進行期MF/SS：病期IIB～IVB	奏効率45%, CR率2%, 再発率36% ²

❖ 主な有害事象

・高TG血症：71～100%, 高コレステロール血症：36～80%, 甲状腺機能低下症：29～53%

・本邦³Grade 3以上の副作用50%

1) Duvic M, Martin AG, Kim Y, et al: Phase 2 and 3 clinical trial of oral bexarotene (Targretin capsules) for the treatment of refractory or persistent early-stage cutaneous T-cell lymphoma. Arch Dermatol, 2001; 137: 581-593

2) Duvic M, Hymes K, Heald P, et al: Bexarotene is effective and safe for treatment of refractory advanced-stage cutaneous T-cell lymphoma: multinational phase II-III trial results. J Clin Oncol, 2001; 19: 2456-2471.

3) Hamada T, Sugaya M, Tokura Y, et al: Phase I/II study of the oral retinoid X receptor agonist bexarotene in Japanese patients with cutaneous T-cell lymphomas. J Dermatol, 2017; 44: 135-142.

1.3 全身療法の流れ

Printed by akatsuka shigenori on 8/8/2022 2:05:42 AM. For personal use only. Not approved for distribution. Copyright © 2022 National Comprehensive Cancer Network, Inc., All Rights Reserved.



National
Comprehensive
Cancer
Network®

NCCN Guidelines Version 2.2022 Mycosis Fungoides/Sezary Syndrome

[NCCN Guidelines Index](#)
[Table of Contents](#)
[Discussion](#)

TABLE 6: STAGE IV MF (Non-Sézary/Visceral organ disease) AND MF WITH LARGE CELL TRANSFORMATION (MF-LCT)^{c,d,e}

SUGGESTED REGIMENS		TREATMENT CONSIDERATIONS (SEE ALSO GENERAL CONSIDERATIONS ON MFSS-A [1 of 12])
Non-Sézary (stage IVA2) or Visceral/Solid Organ (stage IVB) Disease (MFSS-11)	MF-LCT (MFSS-12)	
• Systemic therapy ± RT for local control <u>Preferred Regimens (alphabetical order)</u> • Brentuximab vedotin • Gemcitabine • Liposomal doxorubicin • Pralatrexate • Romidepsin <u>Other Recommended Regimens</u> • Mogamulizumab • Multiagent chemotherapy regimens (See TCEL-B 3 of 7 for regimens listed for PTCL- NOS)	• TSEBT - OR • Systemic therapy + skin directed therapy <u>Preferred Regimens (alphabetical order)</u> • Brentuximab vedotin • Gemcitabine • Liposomal doxorubicin • Pralatrexate • Romidepsin • Multiagent chemotherapy regimens (See TCEL-B 3 of 7 for regimens listed for PTCL-NOS) <u>Other Recommended Regimens</u> • Pembrolizumab	1. In the MAVORIC trial (Lancet Oncol 2018;19:1192-1204), mogamulizumab was more effective than vorinostat in patients with previously treated MF and SS. Response rates were higher in the blood compartment than in lymph nodes or viscera. Patients with MF-LCT were excluded from the MAVORIC trial. 2. There is limited safety data for the use of TSEBT in combination with systemic retinoids, HDAC inhibitors (such as vorinostat or romidepsin), or mogamulizumab, or combining phototherapy with vorinostat or romidepsin. 3. In patients requiring chemotherapy, single agents are preferred over combination chemotherapy, due to the higher toxicity profiles associated with multi-agent regimens and the short-lived responses seen with time-limited combination chemotherapy. 4. Multiagent chemotherapy regimens are generally reserved for patients with relapsed/refractory or extracutaneous disease. Most patients are treated with multiple single-agent systemic therapies before receiving multiagent chemotherapy.

TABLE 7: RELAPSED OR REFRACTORY DISEASE TO MULTIPLE PRIOR THERAPIES

SUGGESTED REGIMENS
<u>Useful in Certain Circumstances (alphabetical order by category)</u> • Alemtuzumab • Chlorambucil • Cyclophosphamide • Etoposide • Pembrolizumab • Pentostatin • Temozolomide for CNS involvement at some NCCN Member Institutions • Bortezomib (category 2B) • Multiagent chemotherapy regimens (See TCEL-B 3 of 7 for regimens listed for PTCL-NOS)



Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.
Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any patient with cancer is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

MFSS-A

NCCNガイドラインでは他にも
数多くの薬剤が掲載されている

1.3 全身療法の流れ

皮膚リンパ腫診療ガイドライン 2025



局所治療 ⇒ 全身治療 ⇒ 多剤併用療法

患者さんの状態, ステージ, 必要な治療を考慮したうえでの「連携」が重要となる


2. 成人T細胞白血病・リンパ腫 疫学

- ❖ 原因ウイルス：HTLV-1（ヒトTリンパ指向性ウイルスI型）
 - ・感染経路：母乳による母子感染, 性交渉による水平感染
- ❖ 本邦の疫学状況
 - ・HTLV-1キャリア：約110万人
 - ・流行地域：九州・沖縄など西南日本
 - ・キャリアからのATL発症率：約5%, 年間推定発症数：約1,000人
- ❖ 新規感染の動向（2013～2021年調査）
 - ・男性：1.54人/10万人・年, 女性：4.21人/10万人・年
 - ・若年層での感染増加が観察されている



成人T細胞白血病・リンパ腫 症状と診断

flower cell



https://www.beckmancoulter.co.jp/dx/quiz/hematology_morphology04/05/#anc01


❖ 主な症状・所見

- ・flower cellを含む異常リンパ球（末梢血）
- ・リンパ節腫脹, 皮膚病変, 肝脾腫, 高LDH, 高Ca, 日和見感染
- ・皮膚病変：紅斑, 丘疹, 結節, 紅皮症, 紫斑など多彩
- ・90%以上のATLでCCR4陽性

❖ 診断基準（主な4要素）


- 1) 血清抗HTLV-1抗体陽性
- 2) 分葉核を持つ異常リンパ球の存在 or リンパ節・消化管・皮膚の組織学的なATLの所見
- 3) 腫瘍細胞が成熟CD4 + 形質を示す
- 4) サザンプロット法により, 腫瘍細胞にHTLV-1プロウイルスDNAのモノクローナルな組み込みがある

生存率



Katsuya H, Ishitsuka K, Utsunomiya A, et al: Treatment and survival among 1594 patients with ATL. *Blood*, 2015; 126: 2570-2577.

生存率



Katsuya H, Ishitsuka K, Utsunomiya A, et al: Treatment and survival among 1594 patients with ATL. *Blood*, 2015; 126: 2570-2577.

❖ 慢性型：予後不良因子（LDH高値, BUN高値, 低アルブミン血症）の有無により予後が異なる

成人T細胞白血病・リンパ腫 病型分類

	くすぶり型	慢性型	リンパ腫型	急性型
リンパ球数 (／μl)	< 4,000	≥ 4,000	< 4,000	
異常リンパ球数*1	≥ 5%*2	あり *3	≤ 1%	あり *3
Flower cell	*4	*4	なし	あり
LDH	≤ 1.5N	≤ 2.0N		
補正Ca値 (mg/dl)	< 11.0	< 11.0		
腫瘍病変				
リンパ節腫大	なし		あり	
皮膚病変	*2			
肺病変	*2			
肝腫大	なし			
脾腫大	なし			
中枢神経	なし	なし		
骨	なし	なし		
胸水	なし	なし		
腹水	なし	なし		
消化管	なし	なし		

空欄は他の病型で規定される条件以外の制約はないことを示す。N：正常値上限
*1：形態的に明らかなATL細胞，*2：末梢血中の異常リンパ球が5%未満でくすぶり型と診断されるには，皮膚あるいは肺に組織学的に腫瘍病変が確認されることが必要である。
*3：末梢血中の異常リンパ球が5%未満で慢性型または急性型と診断されるには，組織学的に腫瘍病変が確認されることが必要である．*4：ATLに特徴的なflower cellが認められてもよい。

Shimoyama M: Diagnostic criteria and classification of clinical subtypes of adult T-cell leukaemia-lymphoma. A report from the Lymphoma Study Group (1984–1987). *Br J Haematol*, 1991; 79: 428–437.

3. 原発性皮膚CD30陽性T細胞リンパ増殖異常症

❖ 定義

- ・原発性皮膚未分化大細胞型リンパ腫（pcALCL）
 - ・リンパ腫様丘疹症（LyP）
- これらを包括した概念「CD30陽性T細胞リンパ増殖異常症」

❖ 共通点

- ・CD30陽性の大型異型リンパ球が真皮内に浸潤
- ・組織学的に類似しており, 鑑別困難なこともある


❖ 相違点

- ・臨床症状や経過は大きく異なる
- 正確な臨床評価が診断に重要

3.1 原発性皮膚未分化大細胞型リンパ腫



- ・紅色結節, 腫瘤, 浸潤局面, 潰瘍を伴うことも
- ・自然消褪する症例, 新生・消褪を繰り返す例あり
- ・CD30+, CD4+, CD8-, ALK-
- ・比較的予後良好, 多発型5年生存率66~77%
- ・孤発/限局型は局所療法が中心
- ・初期に多剤併用化学療法を行うと予後悪化の報告あり



3.2 リンパ腫様丘疹症



❖ 疫学・臨床像


- ・中年に多く, pcALCLより若年発症傾向あり (小児例もあり)
- ・四肢優位の紅色丘疹 (長径1 cm程度)
- ・びらんや痂皮を伴うこともあり
- ・新旧の皮疹が混在, 経過は数週～数ヶ月
- ・基本的に自然消退を繰り返す
 - 生命予後に直接の影響は少ない

4. 皮下脂肪織炎様T細胞リンパ腫

❖ 疫学・臨床像

- ・**結節性紅斑**に似た臨床像
- ・CD8陽性 $\alpha\beta$ 型細胞傷害性T細胞由来と定義
(予後の悪い $\gamma\delta$ 型は原発性皮膚 $\gamma\delta$ T細胞リンパ腫に再分類された)
- ・10～19%で**自己免疫疾患** (全身性エリテマトーデス, シェーグレン症候群, 関節リウマチ等) 合併
- ・20～30%の**血球貪食症候群** (hemophagocytic syndrome: HPS) 合併
- ・脂肪小葉に小～中型異型リンパ球浸潤 (**rimming**/lace-like pattern)

Rimming pattern



補足：木村病

項目

特徴

発症年齢・性別

若年～中年の**男性**に好発

好発部位


耳下腺・顎下部の皮下

症状

緩徐に増大する無痛性腫瘍, **末梢血好酸球増加・IgE高値**

病理所見

著明な**リンパ濾胞形成**, **好酸球浸潤**




補足:好酸球性血管リンパ球増殖症

(angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia)

項目	特徴
発症年齢	若年～中年
好発部位	耳介・顔面・頭頸部の皮膚・皮下
症状	小結節～紅色ドーム状隆起, 出血しやすく圧痛あり
病理所見	血管増生（豊富な胞体をもつ内皮細胞）, リンパ球と好酸球の混在



Kumar N et al., *Indian J Med Res.* 2020;152(Suppl 1):S92-S93. Licensed under CC BY-NC-SA 4.0.



Akay BN et al., *Dermatol Pract Concept.* 2021;11(2):e2021003. Licensed under CC BY-NC-SA 4.0.

Break Time

間葉系腫瘍（繊維組織）

良性

- ▶ 皮膚線維腫
- ▶ 軟線維腫
- ▶ ケロイド
- ▶ 巨細胞性腱腫瘍
- ▶ 手掌線維腫瘍症
- ▶ 小児指線維腫症
- ▶ 後天性（指）被角線維腫
- ▶ 背部弾力線維腫
- ▶ fibrous papula of the face(nose)
- ▶ knuckle pads
- ▶ 尾骨部胼胝腫様皮疹
- ▶ 口粘膜粘液囊腫
- ▶ 指趾粘液囊腫
- ▶ 耳介偽囊腫
- ▶ 皮膚粘液腫

悪性

- ▶ 隆起性皮膚線維肉腫
- ▶ 未分化多型肉腫（悪性線維性組織球腫）
- ▶ 類上皮肉腫
- ▶ 滑膜肉腫
- ▶ 異型繊維黄色腫

代表的な物だけピックアップします

皮膚線維腫

【概要】


- 真皮に生じる良性の線維性腫瘍
- 通常, 境界明瞭で硬い結節として現れる
- 好発部位：下腿など, 四肢によく見られる

【臨床所見】

- 通常, 径1cm前後の皮膚色～褐色の結節
- 横から圧を加えらると中央がへこむ
(dimple sign) が陽性



皮膚線維腫



【病理所見】

- 真皮内に紡錘形の線維芽細胞様細胞が増殖
- CD34陰性, Factor XIIIa陽性

ケロイド

【概要】

- ・ 創傷治癒過程の異常により発生する線維性病変
- ・ 創部を超えて発育するのが特徴
(⇔ 肥厚性瘢痕は創部内に限局)


【臨床所見】

- ・ 皮膚面より隆起した, 赤～暗紅色の硬い腫瘤
- ・ 触ると硬い
- ・ 多くはかゆみや痛みを伴い, 徐々に拡大する



画像出典：DermNet (<https://dermnetnz.org/topics/keloid-and-hypertrophic-scar>)
ライセンス：教育目的での使用を許可（非営利）

ケロイド



【病理所見】

- 真皮に**太く, 無秩序に走行する膠原線維**
- 線維芽細胞の増生, 軽度のリンパ球浸潤

隆起性皮膚線維肉腫 (DFSP: Dermatofibrosarcoma Protuberans)

【概要】

- **COL1A1-PDGFB融合遺伝子**が病因に関与 (t(17;22))
- **局所浸潤性が強く再発しやすいが, 遠隔転移はまれ (<5%)**
- 成人の胴体や四肢に好発し, 進行は緩徐



Lesion in 2014



Same lesion in 2015


【臨床所見】

- **平坦～軽度隆起した褐色斑・硬結**

画像出典: DermNet
(<https://dermnetnz.org/topics/dermatofibrosarcoma-protuberans>)
ライセンス: 教育目的での使用を許可 (非営利)

隆起性皮膚線維肉腫 (DFSP: Dermatofibrosarcoma Protuberans)

花むしろ状 (storiform pattern)



【病理所見】

- 真皮～皮下にわたる**紡錘形細胞の密な増殖**
- 配列は典型的に**花むしろ状 (storiform pattern)**
- **CD34陽性・Factor XIIIa陰性**

未分化多型肉腫 (Undifferentiated Pleomorphic Sarcoma: UPS)



【概要】


- 線維芽細胞様・組織球様の多形細胞が無秩序に増殖する高悪性度腫瘍
- 高頻度に局所再発し, 遠隔転移（肺転移など）も10～40%にみられる

【臨床所見】

- 急速に増大する無痛性の腫瘍
- 表面皮膚が伸展・発赤し, 潰瘍形成や出血を伴うこともある

未分化多型肉腫

(Undifferentiated Pleomorphic Sarcoma: UPS)



【病理所見】

- 著明な細胞異型と核分裂像を伴う紡錘形・多形細胞の混在
- 組織構築は乱雑で、密な充実性増殖を示す
- 免疫染色：vimentin陽性、CD68陽性（いずれも非特異的）
- 特異的なマーカーがないため、他の肉腫・腫瘍を除外したうえで診断

→ そのため、かつては「**ごみ箱診断**
(diagnosis of exclusion)」

とも呼ばれた

間葉系腫瘍（脂肪組織）

良性

- ▶ 脂肪腫
- ▶ 良性對側性脂肪腫症
- ▶ 血管脂肪腫
- ▶ 紡錘細胞脂肪腫, 多形脂肪腫
- ▶ 冬眠腫（越冬腫）
- ▶ mobile encapsulated lipoma

惡性

- ▶ 脂肪肉腫

脂肪腫

【概要】


- 成熟脂肪細胞からなる良性腫瘍
- 軟部腫瘍の中で最も頻度が高い
- 通常は皮下脂肪に発生し, ゆっくりと増大

【臨床所見】

- 皮下に柔らかい可動性良好な結節として触知

【病理所見】

- 成熟脂肪細胞が均一に増殖



Lipoma

血管脂肪腫

【概要】


- ・ **脂肪組織 + 血管成分**からなる**良性腫瘍**
- ・ 脂肪腫と比べて**疼痛を伴うことが多い**
- ・ 若年成人に好発し, **多発することもある**

【臨床所見】

- ・ 皮下に柔らかく, 小型で可動性のある結節
- ・ 圧痛または自発痛あり
- ・ 多発例では**家族性の報告**もある.

【病理所見】

- ・ 成熟脂肪細胞に加え, 毛細血管が豊富に増生
- ・ 血管内に**フィブリン血栓**を伴うこともある



Angiolipoma

間葉系腫瘍（筋・骨組織）

良性

- ▶ 皮膚平滑筋腫
- ▶ 横紋筋腫
- ▶ 皮膚骨腫
- ▶ 爪下外骨腫
- ▶ 皮膚軟骨腫

悪性

- ▶ 平滑筋肉腫
- ▶ 横紋筋肉腫
- ▶ 骨肉腫

皮膚平滑筋腫

【概要】

- 立毛筋や血管平滑筋由来の良性腫瘍
- 単発または多発性に出現
- 多発例は遺伝性（常染色体優性）の可能性あり（Reed症候群）


【臨床所見】

- 皮膚色～紅色の小結節（数mm～1cm）
- 冷感や機械的刺激で痛みを感じることもある（有痛性腫瘍の1つ）

画像出典：DermNet
(<https://librepathology.org/wiki/Leiomyoma>)
ライセンス：教育目的での使用を許可（非営利）




皮膚平滑筋腫



【病理所見】

- 真皮内に束状配列する平滑筋様の紡錘形細胞
- 免疫染色：SMA・Desmin陽性, S100陰性

名古屋市立大学大学院医学研究科 加齢・環境皮膚科学



常勤関連病院
+みどり市民・みらい光生 = 20カ所



名古屋大学大学院医学研究科
加齢・環境皮膚科学

若い人がより大きく育ち、
自分の力を最大限伸ばせる
活気ある発展的な教室

名古屋大学大学院医学研究科
加齢・環境皮膚科学
医局の詳細は、右のQRコード
よりご覧ください。

日本皮膚科学会・はたらく職場

間葉系腫瘍（脈管系）

良性

（A）血管系反応性増殖

- ▶ 毛細血管拡張性肉芽腫
- ▶ 血管内乳頭状内皮細胞増殖症

（B）血管系形成異常・良性腫瘍

- ▶ 単純性血管腫
- ▶ 莓状血管腫
- ▶ 被角血管腫
- ▶ くも状血管腫
- ▶ 海綿状血管腫
- ▶ 血管芽細胞腫
- ▶ グロームス腫瘍
- ▶ 蛇行状血管腫
- ▶ Venous Lake
- ▶ 老人性血管腫
- ▶ 血管周皮細胞腫
- ▶ arteriovenous hemangioma
- ▶ 糸球体様血管腫
- ▶ 好酸球性血管リンパ球増殖症

（C）リンパ管腫

- ▶ 限局性リンパ管腫
- ▶ 海綿状（ひまん性）リンパ管腫
- ▶ 囊腫状リンパ管腫
- ▶ 後天性リンパ管腫（リンパ管拡張症）
- ▶ リンパ管腫腫

悪性

- ▶ 血管肉腫, 脈管肉腫
- ▶ カポジ肉腫
- ▶ リンパ管肉腫

単純性血管腫



【概要】

- 先天性の毛細血管奇形（capillary malformation）
- 増殖性ではなく、血管構造の形成異常に由来

【臨床所見】

- 出生時から存在する赤色～ピンク色の平坦な斑状病変
- 増大せず、身体の成長とともに拡大するように見える

画像出典：DermNet
(<https://dermnetnz.org/topics/capillary-vascular-malformation>)
ライセンス：教育目的での使用を許可（非営利）

名称	好発部位	経過
サーモンパッチ	額, 眉間, 上眼瞼など	通常は 自然に消退 （1～2年以内）
ポートワイン母斑	顔面（三叉神経領域）, 体幹など	持続性, 自然消退しない. 色が濃くなることも

補足 : Sturge-Weber症候群

【概要】

- 毛細血管奇形を主体とする神経皮膚症候群
- 主な特徴は3つの奇形（トリアス）


【診断のポイント】

- 顔面のポートワイン母斑が三叉神経V1領域にある場合, 強く疑う
- MRIで脳の石灰化 ("tram-track sign") や血管腫を認める
- 眼科的スクリーニング（眼圧・眼底検査）も必須

【臨床三徴（Sturge-Weberトリアス）】

所見	説明
① 皮膚の血管奇形	顔面（三叉神経第1枝領域）に一致する ポートワイン母斑 (capillary malformation)
② 中枢神経の血管奇形	軟膜血管腫（leptomeningeal angioma） → てんかん, 片麻痺, 精神発達遅滞などを引き起こす
③ 眼の血管奇形	脈絡膜血管腫や緑内障 を伴うことがある

【tram-track sign】



画像出典 : Wikimedia Commons
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sturge-Weber_CT.jpg) ,
ライセンス : CC BY-SA 4.0

補足：Klippel-Trénaunay-Weber症候群

【概要】

- ・ **先天性の血管奇形症候群**
- ・ 原因は明確ではないが, **PIK3CA遺伝子変異**との関連が示唆されている
- ・ **皮膚・血管・骨・軟部組織の形成異常**を特徴とする

所見	説明
① 毛細血管奇形	いわゆる ポートワイン母斑 (capillary malformation)
② 静脈奇形・静脈瘤	表在・深部の拡張静脈, 側副循環など
③ 肢の過成長	骨や軟部組織の 肥大・片側肥大 (limb hypertrophy)



【鑑別疾患】

- ・ **Parkes Weber症候群** (動静脈瘻が主体)
→ Klippel-Trénaunay-Weber症候群は**動静脈瘻を伴わない**のが基本

画像出典：DermNet
(<https://dermnetnz.org/imagetail/15310-klippel-trenaunay-syndrome>)
ライセンス：教育目的での使用を許可 (非営利)

乳児血管腫



画像出典：DermNet
(<https://dermnetnz.org/topics/infantile-haemangioma>)
ライセンス：教育目的での使用を許可（非営利）

【概要】

- 乳児期に最も多い良性の血管性腫瘍
- 出生直後～生後数週で出現し、数ヶ月かけて急速に増大
→ その後自然退縮する

【臨床所見】

- 生後1～4週で赤色隆起性病変として出現
- 増大期（生後6か月まで）にサイズ・色調が増し、その後退縮（7歳頃まで）

📌 補足ポイント

- 治療は従来Wait and Seeで経過観察となっていたが、自然消退後も瘢痕を残すことから整容的に治療介入していくことも多い。
- レーザー治療、経口プロプラノロール（ β 遮断薬）が効果的

プロプラノールと乳児血管腫治療への応用

【偶然の発見から始まった】

- 2008年, 心疾患でプロプラノール内服中の乳児が, 偶然に血管腫が縮小していることが判明
- Léauté-Labrèzeらが報告
 - ✓ この症例報告が大規模研究のきっかけに！

【その後の検証】

- 前向き観察研究や無作為化比較試験（RCT）が行われ有効性が確認
- 現在では**第一選択薬**として国際的ガイドラインに組み込まれている



血管芽細胞腫（中川） Tufted angioma

【概要】

- ・ 小児（特に乳幼児）に好発する良性血管性腫瘍
- ・ Kasabach-Merritt症候群の原因となることがある

【臨床所見】

- ・ 出生時から1歳までの間に発症することが多いが、一部は遅れて出現
- ・ 境界不明瞭な紅～暗赤色の浸潤性局面を形成
- ・ 圧痛を伴い、時に多汗や多毛を伴う



Prasuna A, Rao PN. A tufted angioma.
Indian Dermatol Online J. 2015;6(4):266-
268. Licensed under CC BY-NC-SA 3.0.

補足：カサバツハ・メリット症候群

【概要】

- 大型血管腫に伴う播種性血管内凝固（DIC）の合併症
- 幼少期の「巨大血管腫」（Kaposiform hemangioendothelioma, tufted angioma 等）で腫瘍内に出血が起こり、病変は暗赤紫色で緊張性に腫脹を伴うことが多い。

【病態】

- 血管腫内で**血小板の異常な消費・捕捉** → **血小板減少症（消費性）**
- **線溶活性の亢進** → フィブリノーゲン低下, Dダイマー上昇
- 結果として, **DIC**



グロムス腫瘍

【概要】


- ・ グロムス小体（血管の平滑筋性構造, 温度調節に関与）由来の**良性腫瘍**
- ・ 腫瘍自体は小さいが, **著明な疼痛症状を呈することが特徴**

【臨床所見】

- ・ 小型（5mm程度）, **青紫色の皮下結節**
- ・ 病変が爪下にある場合は, **爪変形**を伴うことも




グロムス腫瘍



【病理所見】

- 均一な小型円形核を有するグロムス細胞が血管周囲に配列
- 腫瘍は血管腔とそれを取り囲む腫瘍細胞から構成される



補足：有痛性皮膚腫瘍の鑑別 ～“ANGEL”

項目	疾患名	特徴・好発部位
A	Angiolipoma （血管脂肪腫）	若年成人に多い.前腕や体幹に好発
N	Neuroma （神経腫）	神経走行に沿った圧痛性結節 足底・手指など
G	Glomus tumor （グロムス腫瘍）	手指（特に爪下）に好発
E	Eccrine spiradenoma （エクリン汗腺螺旋腺腫）	若年成人に多く, 体幹・上肢に好発
L	Leiomyoma （平滑筋腫）	単発または多発

血管肉腫

【概要】

- 血管内皮細胞由来の悪性腫瘍
- 高齢者の頭皮・顔面に好発
(リスク因子：慢性リンパ浮腫, 放射線照射後)
- 進行が速く, 転移もしやすい → 予後不良

【臨床所見】

- 紫斑様・結節・潰瘍・びらんなど多彩な表現
- 急速に拡大
- 肺・肝・骨などへの遠隔転移をきたしやすい




画像出典：DermNet
(<https://dermnetnz.org/topics/angiosarcoma>)
ライセンス：教育目的での使用を許可（非営利）

Stewart-Treves Syndrome

Berebichez-Fridman
R et al., Case Rep
Oncol. 2016;9(1):205-
211. Licensed under
CC BY-NC-SA 4.0.



血管肉腫



【病理所見】

- 異型内皮細胞による不規則な血管腔形成
- 大小不同・不整形核が混在
- 免疫染色：
CD31
UEA-1,
第Ⅷ因子関連抗原
(von Willebrand因子) 陽性
 - CD34も陽性となるが, 特異性はやや劣る

カポジ肉腫




【概要】

- **HHV-8（ヒトヘルペスウイルス8型）感染により発症する血管内皮由来の腫瘍**
- 古典型・HIV関連型・免疫抑制関連型・アフリカ型など**4つの臨床型**に分類
- **免疫低下状態**（HIV感染・臓器移植後など）で発症しやすい

【臨床所見】


- **皮膚病変：赤紫色～黒紫色の斑状・結節状病変**（多発性）
- **好発部位：下肢, 顔面（鼻・口唇）, 口腔内など**
- HIV陽性例では, 急速に進行・多臓器病変を呈することがある

カポジ肉腫



【病理所見】

- 裂隙状に不規則な血管腔形成 (slit-like vascular spaces)
- 紡錘形の腫瘍細胞
- 免疫染色：
HHV-8陽性（核陽性）
CD31・CD34陽性



間葉系腫瘍

(組織球系・肥満細胞系・形質細胞系)

良性

- ▶ 黄色腫
- ▶ 若年性黄色肉芽腫
- ▶ 播種状黄色腫
- ▶ benign cephalic histiocytosis
- ▶ 多中心性細網組織球症
- ▶ Rosai-Dorfman病
- ▶ congenital self-healing reticulohistio-cytosis
- ▶ 肥満細胞腫
- ▶ 形質細胞増多症

悪性

- ▶ ランゲルハンス細胞組織球症
- ▶ 血球貪食性リンパ組織球症

若年性黄色肉芽腫 (Juvenile xanthogranuloma)



【概要】

- ・乳幼児（生後1歳まで）に好発し、自然退縮することが多い


【臨床所見】

- ・直径数mm～数cmの黄褐色～橙色の半球状または扁平な結節
- ・単発～多発性
- ・神経線維症1型の随伴皮膚症状のこともある

📌 ポイント

- ・後述のランゲルハンス組織球症の皮疹と類似する.

若年性黄色肉芽腫 (Juvenile xanthogranuloma)



Touton型巨細胞

【病理所見】

- ・特に**Touton型巨細胞**（輪状の核と泡沫状の細胞質）が特徴的

- ・免疫染色：

CD68陽性, S100・CD1a陰性

（→ランゲルハンス細胞と鑑別）

ランゲルハンス細胞組織球症

Langerhans cell histiocytosis (LCH)



【概要】


- **ランゲルハンス細胞**による腫瘍
- **小児に多く**（特に0～10歳），単一臓器～多臓器病変まで多様
- 多臓器型は予後不良の症例も

【臨床所見】

- 皮膚（丘疹、紅斑）
- 多臓器型：肝脾腫，肺，骨髓，**中枢神経**病変も
- Diabetes insipidus（中枢性尿崩症）の合併は重要なサイン

ランゲルハンス細胞組織球症

Langerhans cell histiocytosis (LCH)



【病理所見】

- 異型ランゲルハンス細胞の浸潤
- (核溝が特徴)
- 免疫染色：
 - CD1a+, S100+, Langerin (CD207) +
 - Birbeck顆粒 (ラケット状構造) が電子顕微鏡で観察

Birbeck顆粒



【LCHの古典的病型分類】

【Letterer-Siwe病】

- ・乳幼児に好発（2歳未満）
- ・急性進行性（発熱・肝脾腫・皮疹・リンパ節腫脹・骨病変）
- ・全身性に多臓器障害を来し、最も予後不良
- ・治療なしでは数か月以内に致命的

【Hand-Schüller-Christian病】

- ・小児（主に学童期）に好発
- ・三徴候：頭蓋骨病変・眼球突出・尿崩症
- ・慢性経過で、リスク臓器浸潤のない多臓器型LCHに相当

【好酸球性肉芽腫（eosinophilic granuloma）】

- ・学童～青年に多い
- ・単発または多発の骨病変（頭蓋・長管骨・肋骨など）
- ・自然退縮することがある

BRAFやMAP2K1変異など、共通した腫瘍性遺伝子異常が報告

↓
WHO分類で
LCHまとめられた

病気・予後を理解するうえで
大切な概念

LCHのリスク分類（現在の考え方）

分類	定義	リスク臓器	予後
単一臓器型 (SS-LCH)	1つの臓器・組織に限局 単発群と多発群にさらに分けられる	含まない	良好 (自然退縮もあり)
多臓器型 (MS-LCH)・低リスク群	2臓器以上に病変があるが, リスク臓器を 含まない	含まない	化学療法反応性あり
多臓器型 (MS-LCH)・高リスク群	2臓器以上 + リスク臓器のいずれかを含む	肝・脾・骨髄 のいずれか	予後不良

▼ リスク臓器（Risk organs）

- 肝臓**：肝腫大, 胆道障害, 肝機能低下など
- 脾臓**：脾腫, 血小板や赤血球の減少など
- 骨髄**：汎血球減少など（白血球・赤血球・血小板低下）

肥満細胞症




【概念】

- ・**肥満細胞の増殖**により生じる疾患群
- ・皮膚型と全身型に分類される
- ・皮膚型は小児に多く, 自然軽快も期待できる
- ・全身型は成人に多く, 骨髄・肝脾・消化管などの浸潤を伴う

【臨床所見】

- ・皮膚型の主徴は**色素性蕁麻疹**
 - └ 褐色～赤褐色の丘疹・斑状病変
 - └ **Darier徴候**（こすると膨疹が出現）陽性

肥満細胞症



【病理所見】

- ・肥満細胞が密集
- ・Toluidine blue や Giemsa染色で異染性を示す
- ・免疫染色：Tryptase陽性
- ・c-KIT遺伝子変異がしばしば検出される