

DOSIS PEDIATRICAS

ANALGESIA

Dipirona:

Fiebre: 10 mg/kg /dosis

Dolor: 20 – 30 mg/kg /dosis

Suspensión: 1 cc = 80 mg // **peso/8** fiebre o peso/4 dolor (5cc= 400mg)

Ampolla: 1 ampolla ----- 2 cc

1 ampolla ---- 1 gr

Ibuprofeno:

10 mg/kg/ dosis (max 40 mg/kg/dia)

Suspensión 2% **peso/2 (10 cc = 200mg)**

Suspensión 4% peso/4 (10 cc = 400mg)

gotas (ibusol) 2g/kg (1ml = 50 mg)

Paracetamol:

10-15 mg/k (max 60-90mg/kg/dia)

Zolben comp 500 mg

jarabe 120mg ___ 5ml (zolben infantil y paracetamol Szabo)

jarabe 240mg___ 5ml (dolex)

Ketoprofeno:

0.5 - 1 mg/k/dosis (max 2mg/kg/dia)

1mg___1ml suspensión

comprimidos: 1comp = 100mg sin ranurar

ampolla =100mg

Diclofenac Sódico:

1 – 12 años 0,5 – 3 mg /kg/dia vo

>14 años 25mg cada 6 hs

1 ampolla= 75 mg

OPIOIDES

Tramadol

0,5 - 2 mg/kg/dosis cada 6 hs

VIA ORAL:

100mg___1ml

1ml = 28 gotas (Ion) // 1 gota=3,5mg

1ml = 36 gotas (Dalgion – Gramon bago)

1ml = 22 gotas //1comp = 50 mg (Profundol -Lazar)

1 AMPOLLA = 100mg

ampolla pasar IV lento 20 -30 min diluido en 100cc SG 5%

MAX 400mg/día

I

Morfina:

ampolla : 10mg = 1 ml , diluir 1 ampolla en 9 cc SF : 1ml/10 kg IV

Licor de Brompton : 300 – 3mg/ml // 600 – 6 mg /ml

Dosis de inicio en niños virgines de opioides:

<1 mes :

0,025- 0.05/kg/6hs SC o IV inyección ó dosis inicial IV infusion luego

0,005 – 0,01 mg/kg/hs o 0,1 mg/kg/ 4 a 6 hs

1-12 meses :

VO : 0.08 -0,2 mg/kg /4hs

SC / IV inyección: < 6meses 0.1 mg/kg /6hs // >6meses 0,1mg/kg/4hs

IV infusión:

<6meses dosis inicial: 0,05 mg/kg luego 0.01 – 0.05 mg/kg/hs

>6 meses dosis inicial 0,1 – 0,2 mg/kg luego 0,02- 0,03 mg/kg/hs

1-12 años:

VO: < 2 años 0,2 – 0,4 ,mg/kg/4hs // <2 años 0,2-0,5 mg/kg/4 hs max 5mg

VO liberacion retard : 0,2-0,8 mg/kg/12hs

SC /IV inyección <2 años 0,1mg/kg/4hs // >2 años 0,1 -0,2 mg/kg/4hs
(max 2,5mg)
IV infusión. Dosis inicial 0,1 -0,2 mg/kg luego 0,2- 0,3 mg/kg/hs

SEDOANALGESIA

Ketamina :

0.5 -2 mg /kg/dosis IV max 2 mg /kg
ef adversos inhibidos por atropina 0,02mg/kg Iv

Midazolam :

1 ampolla = 15mg/3ml
VO :0.2 – 0,5 mg/kg max 10 mg (diluir 1 amp en 3 ml de jugo = 1ml soluc
tiene 2,5 mg de midazolam)
intranasal 0,5 mg /kg sin diluir (max 10mg = 2 cc)
IV / IM 0,1 – 0,2 mg/kg (max 5mg)

Fentanil :

1 ampolla 0,1mg = 100 gammas =2 ml (50 gammas /ml)
intranasal 1,5 – 2 gamma/kilo max 100 gammas

ANTICOMICIALES

Diazepam:

1 ampolla 10mg/2 ml
IR 0,5 mg/kg por sonda
IV 0,3 – 0,5 mg/kg max 10 mg en 1min
(a 0.3mg/kg <10 kg 1/2 amp // 30 kg 1 amp)

Midazolam

1 ampolla = 15mg/3ml
si se diluye 1 ampolla + 4ml de agua destilada/SF queda 2mg =1ml

IV / IM 0,1 – 0,2 mg/kg (max 10mg = 2ml)
 (0,5 ml = 2 mg /cada 10 kg, aprox:10 kg = 0.4 ml //20 kg =1ml // 30 kg=
 1,5 ml // 40 kg =2 ml)

Peso	EDAD	DOSIS
6 kg - 12 kg	3 meses - 1 año	2,5 mg
13 kg - 25 kg	1 año - < 5 años	5 mg
26 kg - 35 kg	5 años - < 10 años	7,5 mg
>35 kg	≥10 años	10 mg

Difenilhidantoina :

dosis carga 15-20mg/kg diluida en SF a Veloc de infusión < 1 mg/kg/min
 (max 1 g) MONITORIZAR RITMO Y PA

Dosis mantenimiento : 5 - 10mg /kg/día IV cada 12 hs (RT 10-20mg/l)

Acido valproico DPA:

Tto 10 mg/kg/ día VO cada 8 o 12 hs , ajumentar a la
 semana a 15 mg/kg/día y luego a 20mg/kg, Dosificar a los 10
 dias (5 T1/2) Max 800mg/día

1 ampolla = 400mg en 1 ml

1 ampolla + 3 cc SF = dilucion 100mg/1ml

RN: 0,25 mg/kg/hora, 1 a 9 años: 1 mg/kg/hora, > 9 años: 0,5
 mg/kg/hora, 30 min después de la carga.

Carbamacepina

10-20mg/kg cada 6-12 hs ó <4años 20-60 mg/día se aumenta cada 2 días // >4 años 100mg/día Aumentando cada 1 sem max 1g/día.

Max dosis <1año 200mg/día // 1-5 años hasta 400mg/día // 5-10años hasta 600mg/día// 10-15 años hasta 1 g/día

RT 5-10mcg/ml

Vigabatrina – Sd West:

50mg/kg/día hasta 150mg/kg/día max 3 g/día

Clobazam

Coadyuvante en >6 años 0,3-1 mg/kg /día 1comp = 10 mg

Levetiracetam

10mg/kg/día en 2 dosis

PLAN TTO CONVULSIÓN:

5min :

Midazolam nasal/im 0,2 mg/kg

Diazepam IV 0,3 -0,5 mg/kg // IR 0.5 mg/kg

Lorazepam 0.05 – 0,01 mg/kg IV lento (max 4mg = 1 ampolla)

diluir 1 ml en 3 cc de agua destilada 1mg=1ml

10 min:

Diazepam IV 0,3-0,5 mg/kg (max 10 mg) en 1 min

midazolam IV 0,1 mg/kg (max 5mg)

Lorazepam IV 0,1 mg/kg max 5 mg en 1 min

15 min:

Fenitoina si menor a dos años 20 mg/kg pasar lento 1 mg/kg/min max 50 mg/min

Ac Valproico: Carga 20-30mg/kg en 5 min (1 ampolla =400mg diluir en 4 cc SF queda dilucion 100mg/ml)

dosis de mantenimiento a lo 20 min 30mg/kg/dia en 2-3 dosis IV o VO.

Levetiracetam 30 mg/kg en 10 min mantenimiento 15-25 mg/kg cada 12 hs

25 min:

Diazepam IV 0,3-0,5 mg/kg (max 10 mg) en 1 min

midazolam IV 0,1 mg/kg (max 5mg)

Lorazepam IV 0,1 mg/kg max 5 mg diluido en Sg 5% en 1 min

30 min:

Fenitoina si menor a dos años 20 mg/kg pasar lento 1 mg/kg/min max 50 mg/min

Ac Valproico 10-20 mg /kg si responde dejar perfusión 30mg/kg/hs

Levetiracetam 30 mg/kg en 10 min mantenimiento 15-25 mg/kg cada 12 hs

ESTATUS REFRACTARIO = IOT

(midazolam bolo 0,2mg/kg tiopental bolo 1 – 5 mg /kg propofol bolo 1 – 3 mg/kg)

Fenobarbital de elección en RN

Carga: 10-20 mg/kg max 300mg(alcanza Cmax pl en 10-20min)

Mantenimiento: 5mg/kg/dia cada 12 o 24 hs VO o IV

Nivel terapeutico 15-40mcg/ml

1 ampolla 200mg/1 ml

Calculo rápido: 3kg = 0,25 ml// 6 kg = 0.5ml // 9 kg = 0,75ml // 12kg =1ml

ANTIPSICOTICOS

Haloperidol

iniciar con 0.25-0,5 mg/dia en 2-3 dosis y se aumenta paulatinamente <13 años max 6mg/dia // >13años max 10mg/dia

Risperidona:

(goval : 1ml/ml/20gotas)

<20kg 0,25 mg aumentando cada 7 dias maximo 1,5mg/dia

>20 kg 0,5mg aumentando cada 7 dias maximo 2,5mg/dia

>45kg 0,5 mg/dia maximo 3,5mg/dia

Clonidina >6 años

0.05mg/kg/dia Aumentando hasta 0,4mg/dia

Clorpromazina >1 año preferible > 6 años

0,5mg/kg cada 6 hs max 500 mg/dia

CEPM:

Via oral

Levomepromazina 25 mg / 1 comp VO

Risperidona 30 gotas (goval : 1ml/ml/20gotas)

Sedación:

Levomepromazina 12,5 mg 1/2 amp IM se puede repetir a los 30 min

Haloperidol: 3-12 años 0,5-1 mg IM // > 12 años 1-5 mg IM

Midazolam 1/2 amp IM asociado a haloperidol en adolescentes grandes

ADRENALINA:

1 ampolla = 1 mg= 1ml

Anafilaxia: adrenalina 1:1000 sin diluir im : 0,01 mg/kg (max 0.3mg) cada 15 min + salbutamol nebulizado

PCR: adrenalina 1:10.000 (diluir 1cc + 9 cc SF) 0,1mg/kg IV (max 1 mg= 10 cc)cada 3 – 5 min

ANTIBIOTICOS

Amoxicilina:

100 mg/k/d maximo 1,5g/dia

250 mg ----- 5 cc

500 mg ----- 5 cc

Ampicilina:

200-400mg/kg/día IV maximo 12g/dia en 4 dosis (Cada 6 hs)
1 ampolla = 500mg o 1 g

Amoxicilina clavulanico:

45 – 100mg/k/d maximo 1,5g/ dia
5 cc ----- 400 mg amoxicilina
Hasta 5 cc c/8 hs

Ampicilina sulbactam:

100 -200 mg/k/dia IV maximo 12g/dia c/ 6 hs
1 ampolla = 500g o 1 g

Penicilina G benzatinica

<27kg 600.000 UI Monodosis
>27kg 1.200.000 UI Monodosis (max)

Penicilina G

IV 100-400.000 ui/kg/dia cada 4 a 6 hs max 24.000.000

Cefradina/ Cefalexina :

50 - 100 mg/kg/dia en 4 dosis maximo 4g/dia
250 mg ----- 5 cc
1 comp = 500mg
Ampolla =1 g

Cefotaxime :

100-200mg/kg/día IV en 4 dosis max 12g/dia

Cefuroxime:

100-150mg/kg/día IV cada 8hs maximo 6g/dia
1 ampolla = 250, 750, 1500 mg

Cefuroxime axetil

20-30mg/kg/día vo cada 12hs maximo 1g/dia

-125mg___5ml // 250mg___ 5ml

-Comp 250 y 50 mg

Ceftriaxona:

50-100mg/kg/dia cada 12 o 24 hs max 4g

profilaxis MEAS <15 años 125mg IM / >15 años 250mg IM

Ceftazidime

100 -150mg/kg/dia IV cada 8 hs Max 6g/dia

500mg, 1 y 2 g /ampolla

Trimetoprim—sulfametoxazol:

8-12mg/kg/día de trimetoprim ó 40-60mg/kg/dia de sulfametoxazol
cada 12hs VO

suspensión : 200mg S + 40mg T ___5ml

parenteral 20mg/kg/dia Trimetoprim cada 6hs.

1 ampolla___ 400mg S+ 80mg T

Clindamicina:

40 mg/kg/dia IV c/8hs max 2,7g

Ampolla = 600mg

VO 10-30mg/kg/dia cada 6 a 8 hs

1 Comprimido = 300mg

Ciprofloxacina

20-30 mg/kg/dia max VO 1,5 max IV 0,8-1,2g

1 ampolla 200mg,400mg

1comp 250, 500mg y 1 g

Gentamicina:

3- 7,5 mg/k/dia IV

Azitromicina:

10 mg/k/dia max 50mg /dia

suspension: 200 mg ----- 5 cc

Comp 250 y 500mg

Claritromicina

15mg/k/dia cada 12 hs max 1 g/dia

Ampolla 500mg

Suspensión 250mg/5ml

Eritromicina:

30-50mg/kg/dia VO cada 6 a 8 hs max 2g

Meropenem:

60mg/kg/ dia cada 8 hs max 1g

Vancomicina:

40-60mg /kg/dia IV cada 6 hs max 4 g

Nitrofurantoina:

5-7 mg/kg/dia VO cada 6 hs max 40mg

Cremas atb:

Mupax (mupirocina): crema 3 veces por dia

Acido fusidico 2 veces por dia crema

Efetracina 2 veces por dia crema

Tobramicina:

Conjuntivitis 1 gota en c/ ojo segun intensidad sint cada
4hs/6hs/8hs/12hs

TBC:

Rifampicina:

10mg/kg/día cada 12 o 24 hs max 600mg

Isoniacida 10mg/kg/día

Piranzinamida 20-30mg/kg/día por día

Administrar juntas en una sola toma, alejado de lácteos y alimentos grasos.

Rifampicina Profilaxis MEAS :

>1 mes 10mg/kg/dosis VO cada 12 hs max 60mg por 2 días

<1 mes 5mg/kg/día cada 12 hs VO

Adultos 60mg cada 12 hs por 2 días (no embarazadas)

ANTIVIRALES:

Aciclovir

Crema 5% /unguento para mayores de 12 años

Varicela:

Lactantes y niños (<40 kg) 20 mg/kg/dosis cada 6 horas por 7 días (dosis máxima 3.2 g/día) , en RN por 14 días IV ,en inmunodeprimidos 10 mg/kg/dosis IV.

>40kg Aciclovir 800 mg 5 veces al día por 5-7 días VO

En pacientes graves e inmunodeprimidos :aciclovir 10-15 mg/kg cada 8 horas por 7- 10 días IV

En embarazadas usar vía intravenosa si existen complicaciones graves.

Las dosis deben ajustarse en pacientes portadores de insuficiencia renal.

Oseltamivir (tamiflu)

1ml suspension = 12mg

1comp 75mg

<3 meses 12 mg/12 hs No hacer quimioprofilaxis

3-5 meses 20mg /12hs por 5 días

6-11 meses 25mg/12hs

<15kg 30mg/12h

15-23 kg 45 mg/12 hs

24-40kg 60mg/12hs

>40kg dosis de adulto 75mg/12hs

quimioprofilaxis es la mitad de la dosis por 7-10 días

ANTIMICOTICOS:

Ketoconazol:

Crema 2% (etrux) 2 veces por día por 15 días

shampoo (micoralex) 2 veces por semana dejar 3 a 5 min

Miconazol:

Gel (daktarin) 3 veces por día

ANTIPARASITARIOS:

Mebendazol

Enterobius vermicularis 100mg dosis única VO y repetir 14 días tto de grupo fliar

Ascaris/ T Trichura: 100 mg cada 12 hs por 3 días repetir a los 20 días Max 200mg/día

Suspension: 100mg / 5ml

Comp 100mg

Prazicuantel:

Teniasis 5-10mg/kg dosis única

H. Nana 25mg/kg dosis única repetir a los 10 días

comp = 200mg

Albendazol

400mg/día en 2 tomas por 5 días (Toxocara Canis)

Tiabendazol

Strongiloides Stercoralis, 20-30mg/kg/día cada 12 hs por 5 días vo

ANTIPROTOZOARIOS:

Metronidazol

Giardia L. 10-15 mg/kg/día VO en 2 dosis por 5 max 4g/día

a misma dosis para protozoarios de patogenicidad discutida solo si hay sintomas.

Entamoeba Histolytica 30-45 mg/kg/día VO en 3 dosis por 10 días
30mg/kg IV cada 6 hs

PEDICULICIDAS

Permetrina 1% loción/shampoo dejar por 2 hs (permetrin, xanasecto, picantex)

Malation 0,5% loción en mayores de 6 años (Piojisar)

ESCABICIDA

Vaselina con azufre 6% // azufre 5-10% en petrolato // azufre precipitado 2% en lactantes: del cuello para abajo por 3 noches seguidas bañar en la mañana repetir tto en 7 días

Permetrina 5 % crema :colocar 1 vez en la noche y baño en la mañana repetir 7 días, menores de 5 años y embarazadas

Ivermectina >5 años : 200mcg/kg dosis unica repetir a los 7 días
1 comp =6mg 1 comp cada 30 kg

GCC

Dexametasona:

0,6 cc /Kg laringitis // 0,15 – 0.3 mg/kg

VO: 1 cc ----- 1mg (corodex gotas) MAXIMO 8 cc = 8mg

ampolla: 4mg/8mg

Prednisolona:

2 mg/kg/día

suspensión: kg x 2/ 3= cc "FANTIL"

comprimidos 5mg y 20 mg

Prednisona: 1 comprimido = 20 mg

GCC Tópicos:

Betametasona 0,1 % :Cortifar

Desonida :Segucort, dermatitis atopica, prurigo

Clobetasol : Dermovate , efacort

CREMA ESTRÓGENOS/ ESTRIOL (colpoestriol): 2 veces / día por 2-6 sem

ANTIALERGICOS

Clorfeniramina

0,2- 0,4 mg/kg/día en 3 a 4 dosis = 0,1 mg/kg/dosis

Kalitron susp 4mg /5ml = 1ml/0,8mg (1ml/10kg/8hs)

< 1 año = 1 cc// 1 – 3 años = 2 cc //> 5 años = 5 cc

Kaliron comp 4mg y 8 mg

Fexofenadina

suspensión: 30mg/5ml (allegra, alerfedine)

<5 años 15 mg =2,5 cc/ 12 hs

> 5 años 30 mg = 5 cc/12 hs

Comprimidos: 120mg y 180 mg

Loratadina

suspensión : 5mg/5ml (alerfast, loratil)

<30kg 5mg /5ml por día

> 30 kg o > 6 años 10 mg/ 10 ml / día

Comprimidos. 10 mg

Desloratadina

suspensión: Mailen deslorat, dislen 2,5 / 5ml

6-11 meses: 1mg = 2cc / día

1- 5 años: 1,25 mg = 2,5 cc/ día

6 – 11 años: 2,5 mg= 5cc/día

>12 años 1 comp 5mg /día

Jarabes mucolítico expectorantes

Bromhexina (Bisolvon, Ambroxon, Mucosolvan)

2- 6 años 2,5 ml/8hs

6- 12 años 5ml/8hs

Hedera Helix (abrililar , Hedelix)

4mg/5ml

2-7 años 1,25 cc/8hs // > 7 años 2,5 cc/8hs

ANTIHEMETICOS

Ondasetron:

IV: 0,15mg/kg/dosis 1 ampola= 4mg/2ml ó 8mg/4ml

VO: 2mg en niños de 8-15 kg/ 4 mg en niños ≥ 15 / 8mg en ≥ 30 kg.

Domperidona:

0,3 - 0,6 mg/kg

VO: 5 mg en 1 cc (1 gota/kg) // 10 mg en 1 cc (1/2 gota /kg)

IV /IM: 1 ampolla = 10 mg =2cc

Metroclorpramida Adolescentes en adelante:

0,15 mg /kg/dosis (max 10 mg cada 8 hs)

IV o IM: 1 amp ---- 10 mg

VO : 1 comp = 10 mg

gotas 2,6 mg/ml // 5mg/ml // 10 mg/ml

Buscapina adolescentes en adelante:

20 gotas / 1comp cada 8 hs VO

IV 20mg = 1 ampolla

Sertal/ propinoxato

10 mg/ml // 1 comp= 10mg

>10 años 20 gotas o 1 comp cada 8hs

LAXANTES

Lactulosa (lactulax, constilon, Constilac)

1- 1,5ml/kg/día en 2 a 3 dosis

3,25 g/ 5 ml(65g/ 100ml)

Polietilenglicol >6 meses (polilax 1 sobre= 17g)

desimpactación 0,5 – 1,5 g/kg/día repartido en 2 tomas (max 100 g/día = 5 sobres)

Uso crónico hasta por 3 meses

Diluir 1 sobre en 250 cc de agua

ANTIGAS : Simeticona (Factor AG Silan, Meteofar)

Gotas 40mg/ml:

<2 años 20 mg/10 gotas

>2 años 40mg /20 gotas

Suspensión 750mg/5ml

Comp 40, 120, 200 mg

ANTIULCEROSOS:

Ranitidina:

2-4 mg/kg/día en 2 dosis (max 150mg/dosis)

Jarabe Zantac: 75mg/5 ml // Taural 150mg /2 ml

comprimidos 150 o 300 mg

IV: 1,5 mg/kg/dosis cada 6 a 8 hs(max 50mg/dosis =1 ampolla = 50mg/5ml)

Omeprazol :

0,8 – 1 mg/kg/día en 1 – 3 dosis

Comprimidos 10 o 20 mg

IV 1 ampolla = 40mg

HIERRO

Profilaxis de anemia 2mg/kg max 15 mg

Tto anemia 3-5 mg/kg sin dosis maxima

Sulfato ferroso: "ibofer, ferrosterol"

1 ml ----- 25 mg Fe⁺⁺

20 gotas ----- 25 mg Fe ++

Hierro Polimaltosado (maltofer)

20 gotas ----- 50 mg

Hierro bisglicinato

20 gotas -----6 mg

1 gota ----- 0,3mg

Vitamina D gotas :400UI = 8 gotas vo /dia (Viosterol)

Nuctis 2gotas = 400ui

DIURETICOS:

Furosemide

1-3 mg/kg /dosis en 2 a 3 dosis VO

IV ampolla = 20 mg = 2 ml

SUEROS

REGLA DE HOLLIDAY -SEGAR

primeros 10 kg ----- 100 ml/kg

mas de 10 kg 100mg/kg por los primeros 10kg y 50 ml/kg por cada kg por encima de 10kg.(si pesa 20 kg = 1500ml)

1500cc + 20 ml/k/dia Por encima de 20 kg

SG 5% a lactantes,>1 año 1/2 salino,sino SF

KCl: 2 meq/kg/dia

Peso x 2 / 1,34 = total ml Kcl por dia

1 ampolla 10 % =13,4 Meq en 10 ml

1 ml ----- 1,34 meq

1 ampolla ----- 10 cc

Maximo por IV 40mEq/L (max 3 ampollas) o 60mEq/l si hiponatremia

Gluconato de Ca+ en menores de 1-2 años:

200 mg/kg/dia Max 1g

1ampolla = 1 gr ----- 10 cc

en >5kg Max = 3,3 cc c/ 8 hs (10cc total)

NaCl:

No hay que agregarle NaCl al SF ni al Suero medio salino

1 ampolla Na Cl 10% = 17,7 mEq/l de Na en 10 ml

Agregar a SG 5% :

Para llevarlo a SF:

1000cc SF _____ 154 mEq Na

cant suero calc por H Segar _____ "X" mEq Na

"X" / 1,77 = "xx" cc de Na Cl 10 %

Para llevarlo a medio salino:

1000cc SF _____ 77 mEq Na

cant suero calc por H Segar _____ "X" mEq Na

"X" / 1,77 = "xx" cc de Na Cl 10%

BIC:

sumar total de cc/ dia: suero + KCl + Nacl + gluconato de Calcio
dividido 24hs = a pasar por BIC a razon de cc/hs

SUTURAS

1º = ANESTESIA Lidocaína 2 %: 0,5 /kg

Lidocaína + adrenalina = cara y manos Adrenalina: 0,2 cc x lido

