

- ജ്യോതി ആണെങ്കിൽ നട്ടു 35 ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ്, ഓലകരിച്ചിൽ രോഗം തടയുന്നതിനായി 20gm സ്യൂഡോമോണാസ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലക്കി തളിക്കുക. കഴായിയിൽ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കിഴി കെട്ടി വിതറാം .
- രണ്ടാം മേൽവളം ആയി ഒരു ഏക്കറിന് 15 കിലോഗ്രാം യൂറിയ, 15 കിലോഗ്രാം പൊട്ടാഷ് 4 കിലോഗ്രാം ബോറോൺ എന്നിവ കലർത്തി വിതറാം.
- ഹമ ആണെങ്കിൽ നട്ടു 35 ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ്, ഒരു ഏക്കറിന് 2 സിസി ട്രൈക്കോക്കാർഡുകൾ 20 കഷ്ണങ്ങൾ ആക്കി ഓലകാലിൽ പാടത്തു നാട്ടുക.
- രണ്ടാം മേൽവളം ആയി ഒരു ഏക്കറിന് 25 കിലോഗ്രാം യൂറിയ, 15 കിലോഗ്രാം പൊട്ടാഷ്, 4 കിലോഗ്രാം ബോറോൺ എന്നിവ കലർത്തി വിതറാം.