

2018학년도 2학기

수학 및 연습 2

중간고사 채점 기준

1. (a)

$$\begin{aligned} |f(x,y) - f(0,0)| &= |f(x,y)| = \frac{|x^2y|}{x^2+y^2} \\ &= |x| \cdot \frac{|xy|}{x^2+y^2} \leq |x| \cdot \frac{1}{x^2+y^2} \cdot \frac{1}{2}(x^2+y^2) \\ &= \frac{1}{2}|x| \end{aligned}$$

$$\therefore 0 \leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |f(x,y) - f(0,0)| \leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{2}|x| = 0$$

$$\therefore \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0 = f(0,0) \quad \text{이므로}$$

f 는 원점에서 연속.

* 부등식에 절댓값을 안 쓸 경우 혹은

분자가 0이 되는 경우를 고려하지 않은 경우 (-2)

* 고이 부등식 오류 0점

$$\begin{aligned} 1. (b): D_v f(0,0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} (f(vt) - f(0,0)) \\ (v=(a,b)) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} f(at, bt) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \cdot \frac{a^2 b t^3}{a^2 t^2 + b^2 t^2} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{a^2 b}{a^2 + b^2} = \frac{a^2 b}{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

$$\cdot \frac{d}{dt} (f(vt) - f(0,0)) = \frac{d}{dt} \left(\frac{a^2 b}{a^2 + b^2} t \right) = \frac{a^2 b}{a^2 + b^2}$$

* 단순 계산 실수 2점 (정답을 맞춘 경우)

* 정답이 틀린 경우 0점

1. cc)

① 첫 번째 풀이

$$D_1 f(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} (f(t,0) - f(0,0)) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \cdot \frac{0}{t^2} = 0$$

$$D_2 f(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} (f(0,t) - f(0,0)) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \cdot \frac{0}{t^2} = 0$$

$$\therefore \text{grad} f(0,0) = (0,0)$$

(혹은 (b) 에러 $\vec{v} = (1,0), (0,1)$ 에러 $D_1 f = D_2 f = 0$)

그러나 $a \neq 0, b \neq 0$ 인 경우

$$D_1 f(0,0) = \frac{a^2 b}{a^2 + b^2} \neq 0 = \text{grad} f(0,0) \cdot (a,b) \quad \text{이므로}$$

f 는 $(0,0)$ 에러 미분 가능하지 않다.

② 두 번째 풀이.

$$f \text{가 } P \text{에러 미분 가능} \Leftrightarrow \lim_{|\vec{v}| \rightarrow 0} \frac{|f(P+\vec{v}) - f(P) - \vec{a} \cdot \vec{v}|}{|\vec{v}|} = 0 \text{ 인 벡터 } \vec{a} \text{가 존재,}$$

$$\vec{a} = \text{grad} f(P)$$

$\vec{v} = (a,b)$ 라 하자.

$P = (0,0), \text{grad} f(P) = (0,0)$ (0의 라절).

$$\frac{|f(P+\vec{v}) - f(P) - \text{grad} f(P) \cdot (a,b)|}{|\vec{v}|} = \frac{|f(\vec{v})|}{|\vec{v}|} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cdot \frac{|a^2 b|}{a^2 + b^2}$$

$$b=a \text{ 이면, 원식} = \frac{1}{\sqrt{2} |a|} \cdot \frac{|a|^3}{2a^2} = \frac{|a|^2}{\sqrt{2} \cdot 2a^2} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

$$\therefore \lim_{(a,b) \rightarrow 0} \frac{|f(\vec{v})|}{|\vec{v}|} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \neq 0.$$

$\therefore f$ 는 원점에서 미분 불가능.

* 라절이 들어갔지만 (b)가 들어간 그 결과를 이용한 경우 포함.

②의 정의를 올바르게 쓰거나, $D_1 f(0,0) \neq \text{grad} f(0,0) \cdot \vec{v}$ 를 잘못 썼다면 2점

2. $xy f(x, y) = \cos(x + y + f(x, y))$ 양변을 y 로 편미분

$$\Rightarrow x f(x, y) + xy \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -\sin(x + y + f(x, y)) \cdot (1 + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)) \quad \text{5점}$$

$$\Rightarrow (0, 0) \text{ 대입} \Rightarrow 0 = -\sin(f(0, 0)) \cdot (1 + \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)) \dots \textcircled{1}$$

그런데, 원래 식에서 $(0, 0)$ 을 양변에 대입하면,

$$0 = \cos(f(0, 0)) \text{ 따라서, } 0 \neq \sin(f(0, 0)) \quad \text{5점}$$

$$\text{따라서, } \textcircled{1} \text{ 식으로 부터 } \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = -1 \quad \text{5점}$$

* 다른 풀이

$$\text{준 식에 } (0, t) \text{ 대입} \Rightarrow 0 = \cos(t + f(0, t)) \dots \textcircled{1}$$

$$\text{또 } (0, 0) \text{ " } \Rightarrow 0 = \cos(f(0, 0))$$

$$\Rightarrow \textcircled{1} \text{ 에서 } t + f(0, t) = \frac{2n(t)+1}{2} \pi \quad (n(t) \text{ 는 정수})$$

② 이므로 $n(t)$ 는 정수값을 갖는 연속 함수이고, 그러기 위해서는, (충분히 작은 t 에 대해)
 $n(t)$ 는 t 에 대해 상수함수야. $n(t) = n$ 이라고 두면.

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0, t) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \left(\frac{2n+1}{2} \pi - t - \frac{2n+1}{2} \pi \right) = -1 \quad \text{③}$$

* ① : 편미분정의를 정확히 서술 \rightarrow 5점

② : $f(0, t) = -t + \frac{2n+1}{2} \pi$ 꼴이 됨을 설명하면 \rightarrow 5점

③ : 답 5점

3. $f(x, y, z) = xyz - 2018$.

$\text{grad } f(x, y, z) = (yz, xz, xy)$.

$\text{grad } f(a, b, c) = (bc, ac, ab)$ ($f(a, b, c) = abc - 2018 = 0$).

• 접평면의 방정식

$\text{grad } f(a, b, c) \cdot (x-a, y-b, z-c) = 0$

$bcx + acy + abz = 3abc$



z축과의 교점

$(3a, 0, 0)$

y축과의 교점

$(0, 3b, 0)$

x축과의 교점

$(0, 0, 3c)$

• 사면체의 부피

$\frac{1}{6} \cdot |3a \cdot 3b \cdot 3c| = \frac{a}{2} |abc| = \underline{9081}$

채점기준

• $\text{grad } f$ 를 구하면 5점

• 접평면의 방정식을 구하면 5점.

• 사면체의 부피를 구하면 5점.

($abc = 2018$ 대입 안하면 -2점).

(교점을 잘못 구하면 부피가 맞어도 점수 없음).

$$4. F'_n(x) = \int_2^{2x} n(x-t)^{n-1} e^{t^2} dt + 2 \cdot (-x)^n \cdot e^{4x^2} \quad (\text{by 라이프니츠 정리})$$

└ +10

$$F'_n(1) = (-1)^n \cdot 2e^4$$

└ +5

※ 라이프니츠 정리를 적용할 때 문제가 있으면 5점 (정답점수 X)

라이프니츠 정리 적용시, 적분 안의 미분이 그냥 들어가면 0점
($F'_n(x) = \int_2^{2x} n(x-t)^{n-1} e^{t^2} dt$ 라 한 경우)

다른 풀이 " $\binom{n}{k} = nC_k$ "

$$F_n(x) = \int_2^{2x} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (-t)^{n-k} e^{t^2} dt$$

$$= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k \int_2^{2x} (-t)^{n-k} e^{t^2} dt$$

$$\therefore F'_n(x) = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} k x^{k-1} \int_2^{2x} (-t)^{n-k} e^{t^2} dt + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k \cdot 2 \cdot (-2x)^{n-k} e^{4x^2}$$

$$= \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} k x^{k-1} \int_2^{2x} (-t)^{n-k} e^{t^2} dt + 2x \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-2)^{n-k} e^{4x^2}$$

└ +5

$$= \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} k x^{k-1} \int_2^{2x} (-t)^{n-k} e^{t^2} dt + 2x^n e^{4x^2} \cdot (1+(-2))^n$$

└ +5

$$F'_n(1) = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} k 1^{k-1} \underbrace{\int_2^2 (-t)^{n-k} e^{t^2} dt}_{=0} + 2e^4 (-1)^n$$

$$= 2(-1)^n e^4$$

└ +5

5. $f(x, y)$ 의 그레디언트를 구하면

$$\nabla f(x, y) = \left(1 + \frac{x-y}{x^2+y^2}, -2 + \frac{x+y}{x^2+y^2} \right) \text{ 이다. } \quad (3\text{점})$$

$\{(x, y) \mid x > 0\}$ 에서 $\nabla f(x, y) = (0, 0)$ 을 만족하는 점을
구하면 $(x, y) = \left(\frac{1}{5}, \frac{3}{5}\right)$ 뿐이고, 이것이 유일한 임계점이다. (5점)

$f(x, y)$ 의 헤세 행렬을 구하면

$$f''(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{-x^2+y^2+2xy}{(x^2+y^2)^2} & \frac{-x^2+y^2-2xy}{(x^2+y^2)^2} \\ \frac{-x^2+y^2-2xy}{(x^2+y^2)^2} & \frac{x^2-y^2-2xy}{(x^2+y^2)^2} \end{pmatrix} \text{ 이고, } \quad (5\text{점})$$

$$\det f''\left(\frac{1}{5}, \frac{3}{5}\right) = \det \begin{pmatrix} \frac{7}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{7}{2} \end{pmatrix} = -\frac{25}{2} < 0 \text{ 이다.}$$

따라서, 헤세 판정법에 의해 $\left(\frac{1}{5}, \frac{3}{5}\right)$ 은 안장점이다. (2점)

극좌표 치환을 통해 f 를 (r, θ) 의 함수로 바꾸어 $D_r f$, $D_\theta f$,

그리고 헤세 행렬을 구해 둔 경우에도 단계별로 점수를 부여함.

단, 이 경우 임계점을 정확히 구하고 그 점에서 헤세 행렬의

행렬식이 음수임을 잘 논증한 경우에만 최종 결론 점수가 주어짐.

(a) $f(x,y) = e^{x+y} \sin(xy)$ 의 3차 근사다항식

$$e^{x+y} \sin(xy) = \left(1 + (x+y) + \frac{1}{2!} (x+y)^2 + o((x^2+y^2)^{\frac{2}{2}}) \right) \left(xy + o((x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}) \right)$$

$$= xy + x^2y + xy^2 + o((x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}) \quad \text{이므로}$$

테일러 전개의 유일성에 의해서 $T_3 f(x,y) = xy + x^2y + xy^2$.

채점기준 * 답이 틀리면 0점.

* 테일러 전개의 유일성 언급하지 않을시 (-2) 점.

* 직접 미분하여 구한 경우 { 답까지 정확히 맞으면 1점

($D_i = \partial_i$)

테일러 전개식도 언급시 2점.

계수를 모두 잘 구한 경우 5점

$$(b) T_3 f(x,y) = f(0,0) + (\partial_1 f(0,0)x + \partial_2 f(0,0)y) + \frac{1}{2!} (\partial_1^2 f(0,0)x^2 + 2\partial_1 \partial_2 f(0,0)xy + \partial_2^2 f(0,0)y^2) + \frac{1}{3!} (\partial_1^3 f(0,0)x^3 + 3\partial_1^2 \partial_2 f(0,0)x^2y + 3\partial_1 \partial_2^2 f(0,0)xy^2 + \partial_2^3 f(0,0)y^3)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{3!} \partial_1^3 f(0,0) = \frac{1}{3!} \partial_2^3 f(0,0) = 0 \Rightarrow 0 = \partial_1^3 f(0,0) = \partial_2^3 f(0,0)$$

$$\frac{1}{3!} \cdot 3\partial_1^2 \partial_2 f(0,0) = \frac{1}{3!} 3\partial_1 \partial_2^2 f(0,0) = 1 \Rightarrow 2 = \partial_1^2 \partial_2 f(0,0) = \partial_1 \partial_2^2 f(0,0)$$

$$\therefore D_{(1,2)}^3 f(0,0) = (1 \cdot \partial_1 + 2 \cdot \partial_2)^3 f(x,y)|_{(0,0)}$$

$$= \partial_1^3 f(0,0) + 3 \cdot 2 \partial_1^2 \partial_2 f(0,0) + 3 \cdot 2^2 \partial_1 \partial_2^2 f(0,0) + 2^3 \partial_2^3 f(0,0)$$

$$= 0 + 6 \cdot 2 + 12 \cdot 2 + 0 = 36.$$

채점기준 * 답이 맞고 풀이가 타당하면 8점

* 3계 미분계수에 대한 식을 잘 적었으면 4점 ($\vec{v} = (a,b)$)

$$(D_{\vec{v}}^3 f = a^3 D_1^3 f + 3a^2 b D_1^2 D_2 f + 3ab^2 D_1 D_2^2 f + b^3 D_2^3 f)$$

17. (모범답안)

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 + 4x \leq 0, x \geq -2\}.$$

$$f(x, y, z) = xyz.$$

- 집합 S 는 유계, 닫힌 집합이므로, 연속함수 f 는 S 에서 최대값과 최소값을 가진다. ... (3점)

* 유계라는 단어가 없으면 무조건 점수 없음.

* S 가 아닌 다른 집합의 유계를 해당 없음.

- S 의 내부 $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 + 4x < 0, x > -2\}$ 에서는

$\text{grad } f = (y, x, z) \neq 0$ 이므로 임계점을 가지지 않는다.

따라서 이 영역에서는 최대, 최소를 가지지 않는다. --- (4점)

* $\text{grad } f$ 를 구하지 않^{아도}, 그 점을 통해 f 의 최대, 최소가

S 의 경계에만 존재한다는 언급이 있으면 4점.

- 반구각 영역 $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 + 4x = 0, x \geq -2\}$ 에서

라그랑주 승수법을 사용하면,

$$(2x+4, 2y, 2z) = \lambda(1, 1, 1) \quad (\text{적당한 } \lambda \text{에 대해}).$$

$$\frac{3}{4}\lambda^2 = 4. \quad \lambda = \pm \frac{4}{3}\sqrt{3}.$$

영역을 고려하면 $\lambda = \frac{4}{3}\sqrt{3}$, 임계점은 $(\frac{2\sqrt{3}}{3}-2, \frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{2\sqrt{3}}{3})$

이때 함수값은 $f(\frac{2\sqrt{3}}{3}-2, \frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{2\sqrt{3}}{3}) = 2\sqrt{3}-2$ (4점)

* 임계점이 없다면 점수 없음.

임계점이 맞고 함수값이 틀리면 3점.

* 반구각 영역을 살피지 않고 라그랑주 승수법을 쓰면 점수 없음.

다만 각 $k < 0$ 에 대해 반구각들 $\{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 + 4x = k, x \geq -2\}$ 각각에 대해 라그랑주 승수법을 쓰는 경우는 인정.

• 원판 영역 $\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 y^2 + z^2 + 4x \leq 0, x = -2 \}$.
 에서, 원판 내부 $\{ (-2, y, z) : y^2 + z^2 < 4 \}$ 에서는
 $\text{grad } f(y, z) = (1, 1) \neq 0$ 이므로 경계점을 갖지 않는다.

원 영역 $\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 y^2 + z^2 + 4x = 0, x = -2 \}$
 $= \{ (-2, y, z) : y^2 + z^2 = 4 \}$ 에서 라그랑주 승수법을 쓰면

$$(2y, 2z) = \lambda (1, 1), \quad \lambda = \pm 2\sqrt{2},$$

경계점을 고려하면 경계점들 $(-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$, 함수값은

$$f(-2, -\sqrt{2}, -\sqrt{2}) = -2 - 2\sqrt{2}.$$

... (4점)

* 경계점이 없다면 함수 값은 원시점이 맞고 함수값이 물리적 3점.

* 원판 내부를 고려 하지 않으면 0점.

다만 그 값을 통해 최대, 최소가 원판 경계에서만 존재한다고 생각된
 경우는 인정.

* 피-스바르츠 정리를 이용한 경우, 승수법으로 얻으면 -1점.

최대값 $2\sqrt{3} - 2$

최소값 $-2\sqrt{2} - 2$

8. (a) $G'(1,0) = \begin{pmatrix} D_1 g_1(1,0) & D_2 g_1(1,0) \\ D_1 g_2(1,0) & D_2 g_2(1,0) \end{pmatrix}$ 이다.

문제에서 $D_1 g_1(1,0)=2$, $D_2 g_1(1,0)=1$ 임이 주어져 있으므로

$D_1 g_2(1,0) = \frac{\partial g_2}{\partial x}(1,0)$, $D_2 g_2(1,0) = \frac{\partial g_2}{\partial y}(1,0)$ 을 구하면 된다.

연쇄법칙 (chain rule)에 의하여, $u=x^3-xy^2$, $v=x^2y-y^3$ 로 두면

$$\frac{\partial g_2}{\partial x}(x,y) = \frac{\partial g_1}{\partial u}(u,v) \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial g_1}{\partial v}(u,v) \cdot \frac{\partial v}{\partial x}$$

$$= (3x^2-y^2) \cdot \frac{\partial g_1}{\partial u}(u,v) + 2xy \cdot \frac{\partial g_1}{\partial v}(u,v)$$

$$= (3x^2-y^2) \cdot D_1 g_1(x^3-xy^2, x^2y-y^3) + 2xy \cdot D_2 g_1(x^3-xy^2, x^2y-y^3)$$

따라서 $\frac{\partial g_2}{\partial x}(1,0) = 3 \cdot D_1 g_1(1,0) + 0 \cdot D_2 g_1(1,0) = 6$ 이다.

$$\frac{\partial g_2}{\partial y}(x,y) = \frac{\partial g_1}{\partial u}(u,v) \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial g_1}{\partial v}(u,v) \cdot \frac{\partial v}{\partial y}$$

$$= -2xy \cdot D_1 g_1(x^3-xy^2, x^2y-y^3) + (x^2-3y^2) \cdot D_2 g_1(x^3-xy^2, x^2y-y^3)$$

따라서 $\frac{\partial g_2}{\partial y}(1,0) = 0 \cdot D_1 g_1(1,0) + 1 \cdot D_2 g_1(1,0) = 1$ 이다.

$\therefore G'(1,0) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}$.

해점기준 과정과 답이 모두 맞았을 시 +6점.

* (답이 맞더라도 연쇄법칙 적용이 잘못되는 등 과정상의 실수가 있으면
답이 틀린 경우(아래)의 부분점수만 받음.) *

답이 틀렸을 시 부분점수 : 야코비 행렬의 정의를 썼다면 +2점.

연쇄법칙에 해당하는 식을 올바르게 썼다면 +2점.

8.(b) 연쇄법칙(chain rule)에 의하여

$$(F \circ G)'(1,0) = F'(G(1,0)) \cdot G'(1,0) \text{ 이다.}$$

$$G(1,0) = (g_1(1,0), g_2(1,0)) = (1,1) \text{ 이므로 } F'(1,1) \text{ 을 구한다.}$$

$$F'(1,1) = \begin{pmatrix} D_1 f_1(1,1) & D_2 f_1(1,1) \\ D_1 f_2(1,1) & D_2 f_2(1,1) \end{pmatrix} \text{ 이고, } t = x^2 + y^2, s = xy \text{ 로 두면}$$

$$D_1 f_2(x,y) = \frac{\partial f_2}{\partial x}(x,y) = \frac{\partial f_1}{\partial x}(t,s) = \frac{\partial f_1}{\partial t} \cdot \frac{\partial t}{\partial x} + \frac{\partial f_1}{\partial s} \cdot \frac{\partial s}{\partial x} \quad \left. \begin{array}{l} \frac{\partial t}{\partial x} = 2x, \frac{\partial s}{\partial x} = y \end{array} \right\}$$

$$= 2x \cdot D_1 f_1(t,s) + y \cdot D_2 f_1(t,s)$$

$$= 2x \cdot D_1 f_1(x^2+y^2, xy) + y \cdot D_2 f_1(x^2+y^2, xy)$$

$$\text{따라서 } D_1 f_2(1,1) = 2 \cdot D_1 f_1(2,1) + 1 \cdot D_2 f_1(2,1) = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 3 = 5 \text{ 이다.}$$

$$D_2 f_2(x,y) = \frac{\partial f_2}{\partial y}(x,y) = \frac{\partial f_1}{\partial t} \cdot \frac{\partial t}{\partial y} + \frac{\partial f_1}{\partial s} \cdot \frac{\partial s}{\partial y} \quad \left. \begin{array}{l} \frac{\partial t}{\partial y} = 2y, \frac{\partial s}{\partial y} = x \end{array} \right\}$$

$$= 2y \cdot D_1 f_1(x^2+y^2, xy) + x \cdot D_2 f_1(x^2+y^2, xy)$$

$$\text{따라서 } D_2 f_2(1,1) = 2 \cdot D_1 f_1(2,1) + 1 \cdot D_2 f_1(2,1) = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 3 = 5 \text{ 이다.}$$

$$\text{이제 } F'(1,1) = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 5 & 5 \end{pmatrix} \text{ 임을 알았고, 따라서}$$

$$\det (F \circ G)'(1,0) = \det (F'(1,1) \cdot G'(1,0))$$

$$= \det F'(1,1) \cdot \det G'(1,0).$$

$$= \det \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 5 & 5 \end{pmatrix} \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 1 \end{pmatrix} = 10 \cdot (-4) = -40 \text{ 이다.}$$

채점기준 과정과 답이 모두 맞았을 시 +9점. (*는 (a)와 동일)

답이 틀렸을 시 부분점수 : $(F \circ G)'(1,0) = F'(G(1,0)) \cdot G'(1,0)$ 에

해당하는 식 (연쇄법칙)을 올바르게 썼다면 +3점.

$D_1 f_2, D_2 f_2$ 를 계산하는 데에 필요한 연쇄법칙을 올바르게

썼다면 +3점. (대입 과정의 계산실수는 고려하지 않음).

#9 (질량) = $\int \mu ds = \int \mu(x(t)) \cdot |x'(t)| dt$ 를 이용하여

$$\mu(x(t)) = t + 2 \left(\frac{1-t^2}{1+t^2} \right)$$

$$x'(t) = \left(\frac{2}{1+t^2}, \frac{-4t}{(1+t^2)(1-t^2)} \right)$$

$$|x'(t)| = \frac{1}{1+t^2} \sqrt{\frac{4(1-t^2)^2 + 16t^2}{(1-t^2)^2}} = \frac{1}{1+t^2} \sqrt{\frac{4(1+t^2)^2}{(1-t^2)^2}} = \frac{2}{1-t^2}$$

(\because 주어진 범위 $-\frac{1}{\sqrt{3}} < t < \frac{1}{\sqrt{3}}$ 에서 $1-t^2 > 0$ 이므로)

대입하면

$$(\text{질량}) = \int_{-1/\sqrt{3}}^{1/\sqrt{3}} \left(t + 2 \left(\frac{1-t^2}{1+t^2} \right) \right) \cdot \frac{2}{1-t^2} dt$$

$$= \int_{-1/\sqrt{3}}^{1/\sqrt{3}} \left(\frac{2t}{1-t^2} + \frac{4}{1+t^2} \right) dt$$

$$\frac{2t}{1-t^2} \text{ 는 기함수 이므로 } \int_{-1/\sqrt{3}}^{1/\sqrt{3}} \frac{2t}{1-t^2} dt = 0.$$

$$\int_{-1/\sqrt{3}}^{1/\sqrt{3}} \frac{4}{1+t^2} dt = \left[4 \cdot \arctan t \right]_{-1/\sqrt{3}}^{1/\sqrt{3}} = \frac{4}{3} \pi.$$

• $\int \mu ds = \int \mu(x(t)) \cdot |x'(t)| dt$ 를 제대로 언급 했을 시 +5

• $\mu(x(t)), |x'(t)|$ 를 ^{모두} 제대로 계산 했을 시 +5

• 마지막 $\frac{4}{3}\pi$ 까지 정답분을 제대로 계산 했을 시 +5.

문제 10.

곡선 $r = e^\theta$ 의 매개화 : $X(t) = \begin{pmatrix} r(t) \cos t \\ r(t) \sin t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^t \cdot \cos t \\ e^t \cdot \sin t \end{pmatrix}$
 $(0 \leq t \leq 2\pi)$

방법 1

일의 양 : $\int_X \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_0^{2\pi} \vec{F}(X(t)) \cdot \vec{X}'(t) dt$ ① 이 선적분의 정리에 +5점

$$= \int_0^{2\pi} \frac{1}{e^{2t}} \begin{pmatrix} 2e^t \cos t - e^t \sin t \\ e^t \cos t + 3e^t \sin t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} e^t (\cos t - \sin t) \\ e^t (\sin t + \cos t) \end{pmatrix} dt$$

$$= \int_0^{2\pi} (3 \cos^2 t + 4 \sin^2 t + \cos t \sin t) dt$$

$$= \underline{7\pi} \text{ ② } \rightarrow \text{바른 답 계산에 +10점}$$

방법 2

일의 양 : $\int_X \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_X \vec{a} \cdot d\vec{s} + \int_X (\vec{F} - \vec{a}) \cdot d\vec{s}$

① 각 원소 벡터장의 선적분이 2π 일지 설명하는데에 +5점

② 이 선적분의 정리에 +5점

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{e^{2t}} \begin{pmatrix} 2e^t \cos t \\ 3e^t \sin t \end{pmatrix} \cdot \vec{X}'(t) dt$$

↓

$$5\pi$$

③ 바른 계산에 +5점

답 : 7π