

2018학년도 2학기 수학과 연습 2 기말고사

채점기준

1. $\varphi(x, y, z) = x^2 \cos y + z^3 \sin(xy)$

—+10

$$\nabla \varphi = F, \Rightarrow \int_X F \cdot ds = \int_X \nabla \varphi$$

$$= \varphi(X(\pi)) - \varphi(X(0))$$

$$= \varphi(-e^\pi, 0, \pi^2) - \varphi(1, 0, 0)$$

$$= e^{2\pi} - 1$$

—+10

* $\nabla \varphi$ 를 명기하지 않거나 틀렸을 경우 0점

(다른 풀이) $\text{curl} F = 0$, $Y(t) = (t, 0, \frac{-\pi^2}{1+e^\pi}(t-1))$, $-e^\pi \leq t \leq 1$

by Stokes' thm, $\int_D \text{curl} F \cdot dS = \int_X F \cdot ds + \int_Y F \cdot ds$

where D satisfies $\partial D = X \cup Y$

Since $\text{curl} F = 0$,

$$\Rightarrow \int_X F \cdot ds = - \int_Y F \cdot ds$$

—+10

$$= - \int_{-e^\pi}^1 (2t, t \cdot (\frac{-\pi^2}{1+e^\pi}(t-1)), 0) \cdot (1, 0, \frac{-\pi^2}{1+e^\pi}) dt$$

$$= - \int_{-e^\pi}^1 2t dt$$


$$= - [t^2]_{-e^\pi}^1 = e^{2\pi} - 1$$

—+10

* Stokes' thm 을 올바르게 사용하지 않을 경우 0점

문제 2

적분 영역이 다음과 같다.



$$0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$$


$$0 \leq y \leq \sin x$$

따라서 푸비니 정리에 의해

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + \cos^2 x} dx dy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\sin x} \frac{1}{1 + \cos^2 x} dy dx \quad \underline{\hspace{1cm}} 10 \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx \\ &= \int_0^1 \frac{du}{1 + u^2} = \arctan(1) - \arctan(0) \\ &\quad \left(= \frac{\pi}{4} \right) \quad \underline{\hspace{1cm}} 10 \end{aligned}$$

푸비니 정리를 올바르게 적용한 경우 — 10점

정답인 경우 — 10점

3. (a) D_1 :  $= \begin{cases} 0 \leq r \leq \cos \theta \\ 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \end{cases}$ \Rightarrow $\frac{\pi}{4}$ 인 영역.

$$\iint_{D_1} \frac{32x^2}{x^2+y^2} dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\cos \theta} \frac{32r^2 \cos^2 \theta}{r^2} r dr d\theta \quad \text{5점}$$

$$= 32 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{1}{2} r^2 \right]_0^{\cos \theta} \cos^2 \theta d\theta = 16 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta d\theta = 16 \cdot \frac{3\pi}{16} = 3\pi \quad \text{5점}$$

비교해: $\iint_{D_1} \frac{32x^2}{x^2+y^2} dx dy = \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \frac{32x^2}{x^2+y^2} dy dx = \int_0^1 32 \left[x \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \right]_0^{\sqrt{1-x^2}} dx$

$$= \int_0^1 32x \arctan \sqrt{\frac{1-x}{x}} dx \quad \theta = \arctan \sqrt{\frac{1-x}{x}} \text{ 치환} \Rightarrow x = \frac{1}{1+\tan^2 \theta} = \cos^2 \theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 32 \cos^2 \theta \cdot \theta \cdot (2 \cos \theta \sin \theta) d\theta \quad (\because dx = -2 \cos \theta \sin \theta d\theta) \quad \text{5점}$$

$$= \left[-16 \cos^4 \theta \cdot \theta \right]_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} 16 \cos^4 \theta d\theta = 3\pi \quad (\because \text{부분적분}) \quad \text{5점}$$

* 적분영역 잘못 구한 경우 0점.

$$\iint_{D_1} \frac{32x^2}{x^2+y^2} dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\cos \theta} \frac{32r^2 \cos^2 \theta}{r^2} r dr d\theta \quad \text{에서 우변이 조금이라도}$$

틀리면 0점. ($\cos^2 \theta$ 를 $\cos \theta$ 라 쓴 경우, 상수곱 32 빼먹은 경우 포함)

(b) $D_2' = \{(u,v) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq u < \infty, -1 \leq v \leq 1\}$, Define $G: D_2' \rightarrow D_2$ s.t. $G(u,v) = \left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2} \right)$.


Then, denoting $(x,y) = G(u,v)$, $\begin{cases} x+y=u \\ x-y=v \end{cases} \Rightarrow G$ 는 일대일 가역 & $G^{-1}(x,y) = (x+y, x-y)$

$$\text{cf, } \left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right| = \left| \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \right| = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \iint_{D_2} e^{\frac{1-x-y}{\sqrt{2}}} dx dy = \iint_{D_2'} e^{\frac{1-u}{\sqrt{2}}} \left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right| du dv = \int_1^\infty \int_{-1}^1 e^{\frac{1-u}{\sqrt{2}}} \frac{1}{2} dv du \quad \text{5점}$$

$$= \left[-\sqrt{2} e^{\frac{1-u}{\sqrt{2}}} \right]_1^\infty = \sqrt{2} \quad \text{5점}$$

뒷장 계속.

$\frac{H}{2} \frac{\partial H}{\partial x} :$

 $D_2 = A \cup B$ 영역을 관 2.

$$\begin{aligned}
 \iint_{D_2} e^{\frac{1-x-y}{\sqrt{2}}} dx dy &= \left(\iint_A + \iint_B \right) e^{\frac{1-x-y}{\sqrt{2}}} dx dy = \int_0^1 \int_{1-x}^{1+x} e^{\frac{1-x-y}{\sqrt{2}}} dy dx + \int_1^\infty \int_{x-1}^{x+1} e^{\frac{1-x-y}{\sqrt{2}}} dy dx \\
 &= \int_0^1 e^{\frac{1-x}{\sqrt{2}}} \left[-\sqrt{2} e^{-\frac{y}{\sqrt{2}}} \right]_{1-x}^{1+x} dx + \int_1^\infty e^{\frac{1-x}{\sqrt{2}}} \left[-\sqrt{2} e^{-\frac{y}{\sqrt{2}}} \right]_{x-1}^{x+1} dx \\
 &= \int_0^1 \left(e^{-\sqrt{2}x} - 1 \right) dx + \int_1^\infty -\sqrt{2} \left(e^{-\sqrt{2}x} - e^{\sqrt{2}-\sqrt{2}x} \right) dx \\
 &= \sqrt{2} \quad \text{5점}
 \end{aligned}$$

* 적분 영역 틀리면 0 점. (잘 구했어도 적분 식으로 잘못 옮겨 적은 경우도 포함.)

$\iint_{D_2} e^{\frac{1-x-y}{\sqrt{2}}} dx dy = (\quad)$
 꼴의 등식에서 우변이 조금이라도

틀리면 0 점.

$$\left(\begin{array}{l} \text{야코비 행렬식 } \left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right| = \frac{1}{2} \text{ 대신 } \left| \frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} \right| = 2 \text{ 를 곱한 경우} \\ \text{또, 절댓값을 빼면 } \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = -\frac{1}{2} \text{ 을 곱한 경우 포함.} \end{array} \right)$$

4. 주어진 영역 R 을 원기둥좌표계에 대하여 나타내면:

$$\{(r \cos \theta, r \sin \theta, z): 0 \leq \theta \leq 2\pi, -a \leq z \leq a, \sqrt{b^2 - a^2} \leq r \leq \sqrt{b^2 - z^2}\}.$$

따라서, 치환적분을 사용하면

$$\begin{aligned} \text{Vol}(R) &= \iiint_R 1 \, dV_3 = \int_0^{2\pi} \int_{-a}^a \int_{\sqrt{b^2 - a^2}}^{\sqrt{b^2 - z^2}} r \, dr \, dz \, d\theta \quad \dots (*) \\ &= \int_0^{2\pi} \int_{-a}^a \frac{1}{2} (a^2 - z^2) \, dz \, d\theta = \int_0^{2\pi} \left(a^3 - \frac{1}{3} a^3 \right) d\theta = \frac{2}{3} a^3 \cdot 2\pi = \frac{4}{3} \pi a^3 \end{aligned}$$

채점 기준.

① 영역을 적절한 좌표계에 대해 표현한 후, 구체적인 (다중)적분 식을 옳게 얻어낸 경우 10점. (Ex) 위의 (*)에 해당하는 식)

• $\int_0^{2\pi} \int_{\sqrt{b^2 - a^2}}^b \int_{-\sqrt{b^2 - r^2}}^{\sqrt{b^2 - r^2}} r \, dz \, dr \, d\theta$ 도 유효함.

• $\int_0^{2\pi} \int_{\frac{\pi}{2} - \alpha}^{\frac{\pi}{2} + \alpha} \int_{\sqrt{b^2 - a^2} \csc \varphi}^b \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta \quad (\alpha = \arcsin(\frac{a}{b}))$ 혹은

$2 \int_0^{2\pi} \int_{\sqrt{b^2 - a^2}}^b \int_{\arcsin(\frac{\sqrt{b^2 - a^2}}{\rho})}^{\frac{\pi}{2}} \rho^2 \sin \varphi \, d\varphi \, d\rho \, d\theta$ 등 구면좌표계를 이용한 식도 인정함.

• 단, 적분 범위가 틀린 경우는 점수를 부여하지 않음.

② 식을 잘 계산하여 정답 $\frac{4}{3} \pi a^3$ 을 얻어낸 경우 10점.

비고: 자주 등장한 오답

• 영역의 절반에 해당하는 적분을 구한 경우 적분 범위 설정이 잘못된 것으로 0점 처리

• 구에서 영역 R 을 뺀 나머지 영역의 부피를 구한 경우에도 0점 처리.

(단, 전체 구의 부피 $\frac{4}{3} \pi b^3$ 에서 그것을 빼다는 언급이 있으면 ①의 점수를 부여.)

#5 A를 곡선 $x^2 = 2y$ 및 직선 $y=1$ 의 영역이라 하자. 이 때 그린 정리 에 의하여

$$\int_X (\arctan(1+x^2) - y) dx + (e^{y^2-y} + 3xy) dy$$

$$= \iint_A \left(\frac{\partial}{\partial x} (e^{y^2-y} + 3xy) - \frac{\partial}{\partial y} (\arctan(1+x^2) - y) \right) dV_2 \dots (*)$$

$$= \iint_A 3 - (-1) dV_2 = 5 \text{ area}(A) \quad \text{---} +5$$

이 때 $\text{area}(A) = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \int_0^{\sqrt{\cos 2\theta}} r dr d\theta = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{1}{2} \cos 2\theta d\theta = \frac{1}{2} \quad \text{---} +10$

$$\therefore \int_X (\arctan(1+x^2) - y) dx + (e^{y^2-y} + 3xy) dy = \frac{5}{2} \quad \text{---} +5$$

. 그린 정리를 사용하지 않았어도 식 ()와 유사한 식을 유도했으면 5점 인정

(풀이 #6.

$x^2 + y^2 = 1$ ($yz0$)을 x 축으로 회전하면 다음과 같이 매개화할 수 있다.

$$X(\theta, \varphi) = (\cos\theta, \sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi) \quad \begin{pmatrix} 0 \leq \theta \leq \pi \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \end{pmatrix} \quad \text{--- 5점. (매개화)}$$

$$\Rightarrow X_\theta = (-\sin\theta\sin\varphi, \cos\theta\cos\varphi, \cos\theta\sin\varphi)$$

$$X_\varphi = (0, -\sin\theta\sin\varphi, \sin\theta\cos\varphi)$$

$$\Rightarrow X_\theta \times X_\varphi = (\sin^2\theta\cos\theta, \sin^2\theta\cos\theta\cos\varphi, \sin^2\theta\cos\theta\sin\varphi)$$

$$\Rightarrow |X_\theta \times X_\varphi| = \sin^2\theta |\cos\theta| \quad \text{--- 5점.}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{회전체의 넓이} &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi |X_\theta \times X_\varphi| d\theta d\varphi \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin^2\theta |\cos\theta| d\theta d\varphi = \frac{12}{5} \pi \quad \text{--- 10점.} \end{aligned}$$

단, $x=0$ 인 영역만 구하면 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 가 되고 이의 경우 넓이는

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \sin^2\theta |\cos\theta| d\theta d\varphi = \frac{6}{5} \pi \text{ 가 되는데,}$$

이 경우, 정확히 영역을 명시해야 답을 인정.

그 외, 다양한 매개화가 가능한데, 매개화가 합당하고 계산이 모두 맞으면 인정.

※ x 축이 아닌 y 축으로 회전시킨 경우, 대칭성으로 인해 회전축이 y 축이어도 상관 없다는 언급이 있으면 인정, 그러한 언급이 없으면 0점.

※ 파푸스 정리 ($\text{Area} = 2\pi d \cdot l$), 회전체 넓이 공식 ($\text{Area} = 2\pi \int_a^b y(t) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$) 등을 이용시, 공식을 옳게 적용시 10점, 답까지 맞으면 10점 + 총 20점

7.

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 1 \Rightarrow u^2 + \cos^2 v \leq 1 \Rightarrow 0 \leq u \leq \sin v$$

$$\therefore \text{곡면} : 0 \leq v \leq \pi, \quad 0 \leq u \leq \sin v.$$

$$X(u, v) = u (\cos v, \sin v, 0) + \cos v (0, 0, 1)$$

$$X_u = (\cos v, \sin v, 0), \quad X_v = u \cdot (-\sin v, \cos v, 0) - \sin v (0, 0, 1)$$

$$\therefore |N| = |X_u \times X_v| = |X_u| \cdot |X_v| = \sqrt{u^2 + \sin^2 v}$$

$$(\because X_u \cdot X_v = 0)$$

$$\iint_S f \, dS = \int_0^\pi \int_0^{\sin v} (u + \cos v) \sqrt{u^2 + \sin^2 v} \, du \, dv \quad \underline{\hspace{10em}} \quad 10 \text{ 점. } \dots \times$$

$$\cdot \int_0^\pi \int_0^{\sin v} u \cdot \sqrt{u^2 + \sin^2 v} \, du \, dv = \int_0^\pi \left[\frac{1}{3} (u^2 + \sin^2 v)^{\frac{3}{2}} \right]_0^{\sin v} dv.$$

$$= \int_0^\pi \frac{1}{3} (2\sqrt{2} - 1) \cdot \sin^3 v \cdot dv = \frac{1}{3} (2\sqrt{2} - 1) \cdot \frac{4}{3} = \frac{4}{9} (2\sqrt{2} - 1) \quad \underline{\hspace{10em}} \quad 5 \text{ 점.}$$

$$\cdot \int_0^\pi \int_0^{\sin v} \cos v \sqrt{u^2 + \sin^2 v} \cdot du \, dv = 0 \quad (\because v \text{ 는 } \frac{\pi}{2} \text{ 에 머침}). \quad \underline{\hspace{10em}} \quad 5 \text{ 점.}$$

$$\therefore \iint_S f \cdot dS = \frac{4}{9} (2\sqrt{2} - 1) + 0 = \frac{4}{9} (2\sqrt{2} - 1)$$

× 적분 영역에 5점, 피적분 함수에 5점.

이 중에 하나라도 틀리면 이후의 계산 점수는 없음.

#8

$$\text{Flux} = \iint_{\partial R} \vec{F} \cdot \vec{n} \, dS \quad \stackrel{\text{발산 정리}}{=} \iiint_R \text{div} \vec{F} \, dV_3 \quad \text{5}$$

$$\text{div} \vec{F} = 2 + 8xy + (10 - 8xy) = 12 \quad \text{5}$$

$$\therefore \text{Flux} = 12 \cdot \text{Vol}(R)$$

$$\text{Vol}(R) = \int_0^\pi \int_0^{\sin \theta} \int_{r^2}^{r \sin \theta} r \, dz \, dr \, d\theta \quad (\text{원통좌표계}) \quad \text{5}$$

「 * 적분범위까지 정확하게 적어야 인정


* 다른 좌표계를 쓰더라도 정확하게 적으면 인정」

$$\text{Vol}(R) = \frac{1}{12} \int_0^\pi \sin^4 \theta \, d\theta = \frac{\pi}{32}$$

$$\therefore \text{Flux} = \frac{3}{8} \pi \quad \text{5}$$

#9. (a) 주어진 곡면 S 의 각점을 원점과 같은
선분들이 단위 구면과 만나는 부분은 제1팔분면체
(즉, $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$)에 해당하므로

$$\text{입체각} = (\text{단위구면 넓이}) \times \frac{1}{8} = 4\pi \times \frac{1}{8} = \boxed{\frac{\pi}{2}} \quad \text{+5}$$



채점기준 (답을 $\frac{\pi}{2}$ 라고 쓰면 5점.
답을 $\frac{\pi}{2}$ 라고 안 쓰면 0점.
* 90°등도 인정x)

(b) \mathbf{n} 을 곡면 S 에서의 원점에서 멀어지는 방향의 법선벡터라고 하면

$$\mathbf{n} = \frac{1}{7} (6, 3, 2)$$

이리, 입체각은 $\iint_S \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} \, dS$ 이다. (\mathbf{A} : 각원소 벡터장)

$$\iint_S \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iint_S \frac{(x, y, z)}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}^3} \cdot \frac{1}{7} (6, 3, 2) \, dS$$

$$= \iint_S \frac{(6x + 3y + 2z)}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}^3} \cdot \frac{1}{7} \, dS \quad \text{+5}$$

$$= \frac{6}{7} \cdot \iint_S \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}^3} \, dS.$$

$$\therefore \iint_S \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}^3} \, dS = \frac{7}{6} \iint_S \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} \, dS = \frac{7}{6} \cdot (\text{입체각}) \quad \text{+10}$$


채점기준 ① $\mathbf{n} = \frac{1}{7} (6, 3, 2)$ 를 잘 구하고, $(x, y, z) \cdot \left(\frac{6}{7}, \frac{3}{7}, \frac{2}{7}\right) = \frac{6}{7} \cdot \frac{7}{12} \pi$ (6x+3y+2z=등은 좌수x)

등을 활용하여 주어진 적분식을 입체각 벡터장과 계산상수 없이 정확히 연관시켜야 +5

② 주어진 적분식이 $\frac{7}{6} \times (\text{입체각})$ 이라는 사실까지 파악하면 15점 인정.

마지막에 계산상수 왔어도

⊗ 10



$S: r = 1 + \cos\theta$ 를 다각형으로 나타내

외곽선 곡면 ($0 \leq \theta \leq \frac{2\pi}{3}$)

(1) S 의 경계 $\frac{\partial S}{\partial z}$ 이라 하면

$$\partial S: y^2 + z^2 = \frac{3}{16}, \quad x = -\frac{1}{4}$$

∂S 를 경계로 가지는 원판을 D 라고 하면,

$$D: y^2 + z^2 \leq \frac{3}{16}, \quad x = -\frac{1}{4}$$

(S 의 경계선, 원판 D 를 잘 언급하면 +5점)

(2) 스토크스 정리를 잘 서술하면 +5점

$$\iint_S \text{curl } F \cdot d\vec{S} = \pm \iint_D \text{curl } F \cdot d\vec{S} \quad \dots (a)$$

$$\text{or, } \iint_S \text{curl } F \cdot d\vec{S} = \pm \int_{\partial S} F \cdot d\vec{r} \quad \dots (b)$$

(3-a) $\text{Curl } F = (-x, \star, \Delta)$

$\vec{n} = (\pm 1, 0, 0) \Rightarrow$ 부호는 (a)에 따라 바뀐다

$$\Rightarrow \pm \iint_D \text{curl } F \cdot d\vec{S} = \iint_D -x \, dS \Big|_{x=-\frac{1}{4}} = \iint_D \frac{1}{4} \, dS = \frac{1}{4} \cdot \text{area}(D) = \frac{3}{64} \pi \Big|_{5\text{점}}$$

(3-b) 선적분을 이용한 경우, DS 를 (b)의 방향과 맞게 매개변수를
잘 대입하여 올바른 식을 적으면, +5점
계산이 맞으면 +5점.