

2019 - 여름 수학 1

1. (a) $\sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{n-1}{4n}\right)^n \left(\frac{n-1}{n-2}\right)^{n^2}$

sol) $a_n = \left(\frac{n-1}{4n}\right)^n \left(\frac{n-1}{n-2}\right)^{n^2}$ 이라 하면, $a_n > 0$ ($n \geq 3$)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{4n}\right) \left(\frac{n-1}{n-2}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{4n}\right) \left(1 - \frac{1}{n-2}\right)^{n-2} \cdot \left(1 - \frac{1}{n-2}\right)^2$$

$$= \frac{1}{4} \cdot e \cdot 1 = \frac{e}{4} < 1.$$

근판정법에 의해 수렴 $\sum_{n=3}^{\infty} +5$

(b) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\tanh \frac{1}{n}}{(\log n)^{1.2}}$

sol) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{\frac{\tanh \frac{1}{n}}{(\log n)^{1.2}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{\tanh \frac{1}{n}} = 1$ 이므로

그 한비교판정법에 의해 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\tanh \frac{1}{n}}{(\log n)^{1.2}}$ 와 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\log n)^{1.2}}$ 의 수렴성이 같다.

$f(x) = \frac{1}{x(\log x)^{1.2}}$ 라 하면 $f(x) > 0$, f : 연속함수, 감소함수이므로 ($x \geq 2$ 에서)

적분판정법 사용가능.

$$\int_2^{\infty} f(x) dx = \int_2^{\infty} \frac{1}{x(\log x)^{1.2}} dx = \left[\frac{1}{-0.2} (\log x)^{-0.2} \right]_2^{\infty} < \infty \text{ 이므로.}$$

$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\log n)^{1.2}}$ 수렴. 따라서 주어진 급수 수렴 $\sum_{n=2}^{\infty} +5$

(c) $\sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{n \log(n! - 2^{n-1})}$

sol) $n \gg 1$ 이면 $n! > 2^n$ 따라서, $\log(n! - 2^{n-1}) > \log(2^n - 2^{n-1}) = \log 2^{n-1}$.

$$a_n = \frac{1}{n \log(n! - 2^{n-1})} \text{ 이라 하면, } a_n < \frac{1}{n \log 2^{n-1}} = \frac{1}{n(n-1) \log 2}.$$

$\sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{n(n-1) \log 2}$ 수렴하고 $a_n > 0$ 이므로 비교판정법에 의해 수렴 $\sum_{n=4}^{\infty} +5$

$$(d) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n \cdot n!}{n^n}$$

$$\text{sol) } a_n = \frac{3^n \cdot n!}{n^n} \text{ 이라 하면, } a_n > 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{3^{n+1} (n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{3^n \cdot n!}{n^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 \cdot (n+1) \cdot n^n}{(n+1)^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{3}{e} > 1$$

비율판정법에 의해 발산

채정기준)

잘못된 논리를 사용하거나 답이 틀린 경우 0점

부분정수 없음.

2.

$$(a) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{n} \sin \frac{1}{n} \right) x^n$$

sol) $a_n = (-1)^n \cdot \frac{1}{n} \sin \frac{1}{n}$ 이라 하자.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|(-1)^{n+1} \frac{1}{n+1} \sin \frac{1}{n+1}|}{|(-1)^n \frac{1}{n} \sin \frac{1}{n}|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \cdot \frac{\sin \frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n+1}} \cdot \frac{\frac{1}{n}}{\sin \frac{1}{n}} \cdot \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}} = 1.$$

따라서 수렴반경 = 1. $\downarrow +4$

$x = -1$ 일 때, $\frac{1}{n} \sin \frac{1}{n} > 0$ 이고 $\frac{1}{n} \sin \frac{1}{n} \leq \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^2}$.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty$ 이므로 비교 판정법에 의해 $x = -1$ 일 때 수렴 $\downarrow +3$

$x = 1$ 일 때 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n} \sin \frac{1}{n}$ 은 절대수렴하므로 수렴 $\downarrow +3$ 답은 $-1 \leq x \leq 1$.

채점기준) 교대급수 정리를 쓸 경우 조건 ($a_n a_{n+1} < 0$, $|a_n| > |a_{n+1}|$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$) 체크 안할시 0점.

$$(b) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-3)^n x^n}{\sqrt{n+1}}$$

sol) $a_n = \frac{(-3)^n}{\sqrt{n+1}}$ 이라 하자.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| \frac{(-3)^{n+1}}{\sqrt{n+2}} \right|}{\left| \frac{(-3)^n}{\sqrt{n+1}} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} 3 \cdot \frac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{n+2}} = 3$$

따라서 수렴반경 = $\frac{1}{3}$ $\downarrow +4$

$x = \frac{1}{3}$ 일 때, 주어진 거듭제곱급수 = $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$.

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$ 은 교대급수이고, $\frac{1}{\sqrt{n+1}} > \frac{1}{\sqrt{n+2}}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}} = 0$ 이므로.

교대급수 정리에 의해 수렴 $\downarrow +3$

$x = -\frac{1}{3}$ 일 때, 주어진 거듭제곱급수 = $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}}$.

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 이고, $\frac{1}{\sqrt{n}} \geq \frac{1}{\sqrt{n+1}} > 0$ 이며 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 은 발산하므로.

비교 판정법에 의해 발산 $\downarrow +3$

답은 $-\frac{1}{3} < x \leq \frac{1}{3}$.

채점기준) 교대급수 정리를 쓸 때 세가지 조건을 체크하지 않을 경우 0점.

$$3. \sum_{n=0}^{\infty} \int_n^{n+1} \frac{1}{1+x^2} dx = ?$$

$$\int_n^{n+1} \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x \Big|_n^{n+1}$$

$$= \arctan(n+1) - \arctan(n) \quad \text{0점}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \int_k^{k+1} \frac{1}{1+x^2} dx &= (\arctan 1 - \arctan 0) \\ &\quad + (\arctan 2 - \arctan 1) \\ &\quad + \dots + (\arctan(n+1) - \arctan(n)) \\ &= \arctan(n+1) \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \arctan(n+1) = \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore \sum_{n=0}^{\infty} \int_n^{n+1} \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2} \quad \text{5점}$$

$$4. f(x) = x \arctan x - \frac{1}{2} \log x$$

$$\Rightarrow f'(x) = \arctan x + \frac{x}{1+x^2} - \frac{1}{2x}$$

$$= \arctan x + \frac{x^2-1}{2x(1+x^2)}$$

$$x \geq 1 \text{ 에서 } \arctan x > 0, \frac{x^2-1}{2x(1+x^2)} \geq 0 \text{ 이므로 } f'(x) > 0 \text{ 이다.}$$

$$\Rightarrow [1, \infty) \text{ 에서 } f'(x) \neq 0 \text{ 이므로 역함수 정리에 의해}$$

$$x = g(y) \text{ 가 } [1, \infty) \text{ 에서 존재한다. } \underline{\hspace{1cm}} +5$$

$$f(1) = \frac{\pi}{4} \text{ 이므로 } g\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1 \text{ 이고,}$$

$$f'(x) = \arctan x + \frac{x}{1+x^2} - \frac{1}{2x},$$

$$f''(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{(1+x^2)-2x^2}{(1+x^2)^2} + \frac{1}{2x^2}$$

$$= \frac{2}{(1+x^2)^2} + \frac{1}{2x^2} \text{ 이므로}$$

$$f'(1) = \frac{\pi}{4}, \quad f''(1) = 1 \text{ 이다.}$$

$$f(g(x)) = x$$

$$\Rightarrow f'(g(x)) g'(x) = 1,$$

$$f''(g(x)) (g'(x))^2 + f'(g(x)) g''(x) = 0$$

$$x = \frac{\pi}{4} \text{ 다할 일}$$

$$\Rightarrow g'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{f'(g(\frac{\pi}{4}))} = \frac{1}{f'(1)} = \frac{4}{\pi} \quad \underline{\hspace{1cm}} +5$$

$$g''\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{f''(g(\frac{\pi}{4}))}{f'(g(\frac{\pi}{4}))} (g'(\frac{\pi}{4}))^2 = -\frac{f''(1)}{f'(1)} \left(\frac{4}{\pi}\right)^2 = -\frac{64}{\pi^3} \quad \underline{\hspace{1cm}} +5$$

채점기준

- 역함수 존재성, $g'(\frac{\pi}{4})$, $g''(\frac{\pi}{4})$ 각 5점.
- 역함수 존재성에서 $f'(x) \geq 0$ 이라고 쓴 경우 점수 없음.

5.

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x)^{\cot x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x)^{\frac{1}{x} \cdot \frac{x}{\tan x}} = e^1 = e \quad \text{---} +5$$

or $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log (1+x)^{\cot x}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} (\cot x) \cdot (\log (1+x))$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log (1+x)}{\tan x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sec^2 x (1+x)} = \frac{1}{1} +2$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x)^{\cot x} = e \cdot 1 +3$$

$$(b). \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \cdot \frac{1 - \cosh x}{\sinh x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\sinh x}{\sinh x + x \cosh x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\cosh x}{2 \cosh x + \sinh x} = -\frac{1}{2} +10$$

* 공식 이용한 경우, 논리적 오류가 없고 답이 맞아야 +10.

* 답이 맞는데 유도과정에 약한 오류가 있다면

-3, 과정이 모두 맞고 답에 부호 등 실수가 있으면 -3.

6. (a).

1st $f(x) = \int_0^x \frac{dt}{1+5t+6t^2} = \int_0^x \frac{3}{3t+1} - \frac{2}{2t+1} dt.$

$$\frac{3}{1+3t} = 3 \sum_{n=0}^{\infty} (-3t)^n \quad (|t| < \frac{1}{3})$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot 3^{n+1} \cdot t^n$$

$$\frac{2}{1+2t} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot 2^{n+1} \cdot t^n \quad (|t| < \frac{1}{2})$$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} [3^{n+1} - 2^{n+1}] x^{n+1} \quad (|x| < \frac{1}{3}) \quad | + (0,$$

$$\therefore T_3 f(x) = x - \frac{5}{2}x^2 + \frac{19}{3}x^3 \quad | + 5.$$

2nd $\frac{1}{1+5x+6x^2} = \frac{1}{1-(-5x-6x^2)}$

$$= 1 + (-5x-6x^2) + (-5x-6x^2)^2 + \dots$$

정제하여

$$T_3 f(x) = x - \frac{5}{2}x^2 + \frac{19}{3}x^3 \quad (\text{계수당 5점, 총 15점})$$

3rd

$$f(x) = (1+5x+6x^2)^{-1}$$

$$f(0) = 0, \\ f'(0) = 1$$

$$f''(x) = -(1+5x+6x^2)^{-2} (5+12x) \quad f''(0) = -5$$

$$f^{(3)}(x) = 2(1+5x+6x^2)^{-3} (5+12x)^2 - (1+5x+6x^2)^{-2} \cdot 12. \\ f^{(3)}(0) = 38$$

$$\therefore T_3 f(x) = x - \frac{5}{2}x^2 + \frac{19}{3}x^3 \quad (\text{계수당 5점})$$

* 미분계수를 모두 구하고 팩토리얼로 나누지 않은 경우 -3.

(b). 1st 여서,

$f(x)$ 는 교대곱이므로 교대곱 정리를 이용하면

$$|R_2(0.1)| \leq \frac{19}{3} \cdot 0.1^3 < 7 \cdot 0.1^3 = \frac{7}{1000}.$$

$$\therefore f(0.1) \approx 0.1 - \frac{5}{2}(0.1)^2. \quad \text{---} \quad \neq 0.$$

* 2nd, 3rd 풀이로 여를 풀 경우,

$f(x)$ 가 교대곱임을 보이지 않으면 0점.

* 테일러 정리를 이용하여 오차에 관한 참인 명제를 리우면 3점.

실제로 Max & Upper bound를 구하여 오차까지 맞게 구하면 +7점.

* 근삿값 쓰지 않은 경우 -2.

* (수경범위) $\ni 0.1$ 이 명시되어 있지 않으면 -2.

$$7. \int_0^x \frac{\sinh t}{t} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)(2n+1)!} \quad (\forall x \in \mathbb{R}).$$

테일러 정리(이) 의해

$$R_{2n}(1) = \frac{f^{(2n+1)}(\xi)}{(2n+1)!}$$

즉 만약 $\xi \in (0, 1)$ 이 존재한다면,

$$f^{(2n+1)}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2n+1+2k)(2k)!}$$

$$\leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2n+1)(2k)!} = \frac{\cosh x}{2n+1} \quad 0 \leq x \leq 1$$

$$R_{2n}(1) \leq \frac{\cosh \xi}{(2n+1)(2n+1)!} < \frac{\cosh 1}{(2n+1)(2n+1)!}$$


$$n=3 \quad 0 \leq \xi \leq 1 \quad \frac{\cosh 1}{5 \cdot 5!} < 10^{-3} \quad 0 \leq \xi \leq 1,$$

$$\int_0^1 \frac{\sinh x}{x} dx \approx 1 + \frac{1^3}{3 \cdot 3!} + \frac{1^5}{5 \cdot 5!}$$


※ 근사값이 맞으면 (6점)

테일러 정리의 적분형 부등식을 이용,


근사값을 논리적으로 구하면 14점.



* 개형 5점, 절편 5점
(하나 틀리면 -2, 두 개 이상 -5)



* $\arctan(-2) = \theta$ 인 경우 제외하면 -2.



두 점 이상 제외하면 0점.

$$9. \quad x = \rho \sin \varphi \cos \theta$$

$$y = \rho \sin \varphi \sin \theta$$

$$z = \rho \cos \varphi, \quad \varphi = \frac{\pi}{6} \text{ 기모로}$$

$$r^2 = x^2 + y^2 = \frac{1}{4} \rho^2,$$

$$z^2 = \frac{3}{4} \rho^2 \quad \therefore 3r^2 = z^2 \quad \dots (1)$$

$$\rho = 4 \cos \varphi$$

$$\Rightarrow \rho^2 = 4 \rho \cos \varphi$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 = 4z$$

$$\therefore r^2 + z^2 = 4z \quad \dots (2)$$


$$\textcircled{2} \text{ 와 } \textcircled{1} \text{ 대입 } \Rightarrow \frac{4}{3} z^2 = 4z$$

$$\Rightarrow z^2 = 3z$$

$$\therefore \begin{cases} z = 0 \\ r = 0 \end{cases} \text{ or } \begin{cases} z = 3 \\ r = \sqrt{3} \end{cases}$$

$$\therefore \text{교점의 집합은 } \{(\sqrt{3}, \theta, 3) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi\} \cup \{(0, \theta, 0)\}$$

* 그림을 이용하여 교점의 집합이 원과 원점을 보이고,
이 원을 $r = \sqrt{3}, z = 3$ 으로 표현해도 안됨



* 원점 언급 없으면 -3.

원점 좌표계로 표현하지 않으면 -3