

Requisitos para el día del estudio.

- Asistir 30 minutos antes de la hora programada.
- Presentar orden médica, historia clínica y los exámenes previos, relacionados con el área a evaluar.
- Presentar documento de identificación y carné, en caso que aplique.
- Deben asistir acompañados de un adulto responsable:
 - Menores de edad.
 - Mayores de 60 años.
 - Personas con discapacidad física y/o cognitiva.
- Si el paciente es menor de 8 años, debe asistir al servicio en compañía de dos adultos responsables.
- Si se encuentra en estado de embarazo o con sospecha de estarlo, informar antes de realizar el estudio.

Instrucciones antes de la realización del estudio

- Si el paciente toma antihipertensivos, no suspenderlos para el procedimiento.
- Si el paciente se aplica insulina, el día del examen no se la debe suministrar.
- No requiere creatinina.
- INR se tolera igual o menor a 1,5.
- TPT para pacientes que reciben heparina no fraccionada intravenosa, se tolera hasta máximo 1,5 veces el valor del control. – preguntar.
- Plaquetas, se tolera igual o superior a 50.000.
- Si el paciente ingiere ASA, ASPIRINA o ASAWIN suspenderlo 5 días antes del procedimiento.
- Si el paciente ingiere Clopidogrel o Ticagrelor, suspenderlo 5 días antes del procedimiento, excepto si está asociado a un Stent vascular 6 meses antes o 5 días después.
- Si se le está aplicando Heparina BPM, se debe suspenderla 24 horas antes del procedimiento, si recibe Heparina no fraccionada suspender 4 horas antes del procedimiento

Instrucciones para el día del estudio

- Si el paciente está tomando warfarina, se debe suspender 5 días antes del procedimiento. Y requiere control de INR hasta 1,5.
- Suspender vía oral de 4 a 6 horas. Si es con anestesia general o sedación debe ser 6 a 8 horas.
- El paciente debe asistir al servicio en ropa cómoda.
- El área de exploración no debe tener vendas, heridas o áreas infectadas.

Instrucciones después del estudio.

- ✓ Reposo absoluto en cama por 2 horas y luego reposo relativo por 6 horas.
- ✓ Tomar medicamentos analgésicos y antiinflamatorios según prescripción médica.
- ✓ En caso de sangrado del sitio de inserción, realizar compresión durante 15 minutos.
- ✓ Reiniciar alimentación según condición del paciente y orden médica.
- ✓ En caso de: palidez, hipotermia, dolor abdominal o en el sitio de la biopsia, alteración del estado de conciencia, abultamiento y dolor, sudoración, mareo, desvanecimiento, fiebre, salida de material purulento, sangrado abundante por la zona intervenida o dificultad respiratoria debe consultar por urgencias.