

Requisitos para el día del estudio.

- Asistir 40 minutos antes de la hora programada.
- Presentar orden médica, historia clínica y los exámenes previos, relacionados con el área a evaluar.
- Presentar documento de identificación y carné, en caso que aplique (Policía).
- Todas las personas deben asistir al servicio en compañía de un adulto responsable.
- Si el paciente es menor de 8 años, debe asistir al servicio en compañía de dos adultos responsables.
- Traer nevera de icopor con gel refrigerante, no hielo seco; con el fin de poder transportar la muestra. Disponer del tiempo que se requiera para llevar la muestra al laboratorio.

Instrucciones antes del estudio.

- Si el paciente toma antihipertensivos no suspenderlos para el procedimiento.
- Si el paciente se aplica insulina, el día del examen no se la debe suministrar.
- Debe suspender todos los medicamentos homeopáticos como Ginkgo biloba, ácidos grasos, omega 3, vitamina E o té verde.
- Debe suspenderse los siguientes medicamentos si los usa: aspirina, asawin, aspirineta, ibuprofeno, diclofenaco o anticoagulantes, por ejemplo warfarina o cumadin, 10 días antes del examen; esta suspensión debe ser guiada y manejada por su médico tratante para determinar si es posible su suspensión.
- Llevar los resultados de los siguientes exámenes: TP, TPT, INR, recuento de plaquetas, con una realización menor a un mes. Si el paciente es anticoagulado debe contar con un INR menor a una semana de realizado. También debe tener reporte de hemoglobina y hematocrito.
- Si se está aplicando Heparina BPM, suspenderlas 24 horas antes del procedimiento.
- Si recibe Heparina no fraccionada suspender 12 horas antes del procedimiento.
-

Instrucciones para el día del estudio.

- Suspender vía oral 6 horas antes si es bajo sedación. Si es con anestesia general debe suspender la vía oral 8 horas antes.
- Asistir al servicio con ropa cómoda.
- El área de exploración no debe tener vendas, heridas o áreas infectadas.

Instrucciones después de la realización del estudio.

- Reposo absoluto en cama por 2 horas y luego reposo relativo por 6 horas.
- Tomar medicamentos analgésicos y antiinflamatorios según prescripción médica.
- En caso de sangrado del sitio de incisión realizar compresión durante 15 minutos.
- Reiniciar alimentación según condición del paciente y orden médica.
- En caso de: palidez, hipotermia, dolor abdominal o en el sitio de la biopsia, alteración del estado de conciencia, abultamiento y dolor, sudoración, mareo, desvanecimiento, fiebre, salida de material purulento, sangrado abundante por la zona intervenida o dificultad respiratoria debe consultar por urgencias.

