

## Requisitos para el día del estudio.

- Asistir 30 minutos antes de la hora programada.
- Presentar orden médica, historia clínica y los exámenes previos, relacionados con el área a evaluar.
- Presentar documento de identificación y carné, en caso que aplique (Policía).
- Todas las personas deben asistir al servicio en compañía de un adulto responsable.
- Si el paciente es menor de 8 años, debe asistir al servicio en compañía de dos adultos responsables.

## Instrucciones antes de la realización del estudio.

- Realizar toma de los medicamentos para hipertensión, epilepsia u otras patologías que así lo requiera.
- No requiere creatinina.
- Debe suspender todos los medicamentos homeopáticos como Ginkgo biloba, ácidos grasos, omega 3, vitamina E o té verde.
- Debe suspenderse los siguientes medicamentos si los usa: aspirina, asawin, aspirineta, ibuprofeno, diclofenaco o anticoagulantes, por ejemplo warfarina o cumadín, 10 días antes del examen; esta suspensión debe ser guiada y manejada por su médico tratante para determinar si es posible su suspensión.
- Llevar los resultados de los siguientes exámenes: TP, TPT, INR, recuento de plaquetas, con una realización menor a un mes. Si el paciente es anticoagulado debe contar con un INR menor a una semana de realizado.

## Instrucciones para el día del estudio.

- Asistir con ayuno de 2 horas.
- El área de exploración no debe tener vendas, heridas o áreas infectadas.

## Instrucciones después de la realización del estudio.

- No masajear el seno.
- Colocar hielo local en forma intermitente.
- Tomar medicamentos analgésicos y antiinflamatorios según prescripción médica.
- Tener reposo relativo.
- Aplicación de vendaje compresivo según indicaciones médicas.
- Retiro del apósito al día siguiente.
- Después del procedimiento continuar con su medicación y alimentación en los horarios habituales.
- En caso de palidez, hipotermia, dolor abdominal o en el sitio de la biopsia, alteración del estado de conciencia, abultamiento y dolor, sudoración, mareo, desvanecimiento, fiebre, salida de material purulento, sangrado abundante por la zona intervenida o dificultad respiratoria debe consultar por urgencias.

