

Requisitos para el día del estudio.

- Asistir 30 minutos antes de la hora programada.
- Presentar orden médica, historia clínica y los exámenes previos, relacionados con el área a evaluar.
- Presentar documento de identificación y carné, en caso que aplique (Policía).
- Todas las personas deben asistir al servicio en compañía de un adulto responsable.
- Si el paciente es menor de 8 años, debe asistir al servicio en compañía de dos adultos responsables.

Instrucciones antes del estudio.

- Si el paciente toma antihipertensivos no suspenderlos para el procedimiento.
- Si el paciente se aplica insulina, el día del examen no se la debe suministrar.
- Llevar los resultados de los siguientes exámenes: TP, TPT, INR, recuento de plaquetas, con una realización menor a un mes. Si el paciente es anticoagulado debe contar con un INR menor a 48 horas de realizado.
- Si el paciente ingiere ASA, Aspirina o Asawin suspenderlo 5 días antes del procedimiento.
- Si se le está aplicando Heparina BPM, Suspenderlas 24 horas antes del procedimiento si recibe Heparina no fraccionada suspender 4 horas antes del procedimiento.
- Si el paciente está tomando warfarina, se debe suspender 5 días antes del procedimiento.

Instrucciones para el día del estudio.

- Asistir con 6 horas de ayuno. Si el paciente es diabético, también debe cumplir con las 6 horas de ayuno.
- Los pacientes hipertensos y/o diabéticos, deben tomar sus medicamentos con poca agua.
- El área de exploración no debe tener vendas, heridas o áreas infectadas.

Instrucciones después de la realización del estudio.

- Reposo absoluto en cama por 2 horas y luego reposo relativo por 6 horas.
- Tomar medicamentos analgésicos y antiinflamatorios según prescripción médica.
- En caso de sangrado del sitio de inserción, realizar compresión durante 15 minutos.
- Reiniciar alimentación según condición del paciente y orden médica.
- En caso de: palidez, hipotermia, dolor abdominal o en el sitio de la biopsia, alteración del estado de conciencia, abultamiento y dolor, sudoración, mareo, desvanecimiento, fiebre, salida de material purulento, sangrado abundante por la zona intervenida o dificultad respiratoria debe consultar por urgencias.