

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105;

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web: www.infectioasecluj.ro



BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **TURI GABOR-PETER**, nascut la data de **30.06.1992**, CNP / cod unic de asigurare **1920630125846**, Adresa: **Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.A VLAICU Nr.4 Ap.94** a fost internat in serviciul nostru in perioada: **13.08.2020 09:56 - 19.08.2020 10:00**, FO: **19634** F.O. / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE V-COPII** si se externeaza: **AMELIORAT**

Diagnostice:

TRAHEOBRONSITA ACUTA INFECTIE SARS-COV-2, FORMA USOARA COVID-19 CU VIRUS IDENTIFICAT

Motivele prezentarii
Anamneza
factori de risc
Examen clinic - general
- local
Examene de laborator:
13.08.2020
Acid Uric - 7.4 [3.4 - 7], APTT - APTT (sec) 24.0 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Calciu
total - 9.63 [8.4 - 10.6], Colesterol Total - 226 [109 - 200], Creatinina - 1.11 [0.7 - 1.2],
D-Dimeri - 0.19 [0 - 0.55], Feritina - 137.3 [23.9 - 336.2], Fibrinogen - 219 [180 - 400],
Fier - 76 [33 - 193], Glicemie - 97 [70 - 105], GOT - 23 [0 - 45], GPT - 47 [0 - 45],
HDL-Colesterol - 35 [35 - 65], Hemoleucograma completa - Leucocite 6.6 [3.7 - 9.5] , -
Hematii 5.05 [4.32 - 5.66] , - Hemoglobina 14.7 [13.3 - 17.6] , - Hematocrit 42.4 [39.0 - 51.0
], - VEM 83.9 [82.0 - 98.0], - HEM 29.1 [25.0 - 33.0], - CHEM 34.6 [31.6 - 35.8], -
RDW-CV% 13.4 [9.9 - 15.5] , - Trombocite 282 [150 - 450] , - MPV 8.5 [6.5 - 14.0] , -
NEUT% 67.16 [40 - 70] , - LYMPH% 24.14 [20 - 40] , - MONO% 6.98 [3.0 - 10.0] , - EO%
0.77 [0 - 5] , - BASO% 0.95 [0 - 2] , - NEUT# 4.435 [1.5 - 6.6] , - LYMPH# 1.595 [1.1 -
3.5], - MONO# 0.461 [0.21 - 0.92], - EO# 0.051 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.063 [0 - 0.13],
K - 4.5 [3.5 - 5.1], LDH - 174 [0 - 250], LDL - Colesterol - 140 [10 - 150], Lipide Totale -
857 [375 - 750], Magneziu - 1.93 [1.7 - 2.6], Na - 140 [136 - 146], Proteina C reactiva -
0.17 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 10.4 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma)
124.6 [70 - 130] , - INR (plasma) 0.89 [0.8 - 1.2], Trigliceride - 258 [0 - 150], Uree - 28 [0
- 50], VSH - 10 [1 - 15]
14.08.2020
Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -], GOT - 21 [0 - 45], GPT - 43 [0 - 45
], Proteina C reactiva - 0.14 [0 - 1]
Examene paraclinice:
EKG
ECO

T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 18.08.2020 RG.PULM. D=5.7 Gym2Radiografie pulmonara PAComparativ cu radiografia anterioara din 13.08 nu se constata aspecte evolutive pulmonare; fara leziuni focale sau infiltrative pulmonare evidente RGR. SCD libere. Cord aorta radiologic in limite normale. || T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 13.08.2020RGR.PULM.D=7.3 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare vizibile rgr.

Altele			

Tratament efectuat

ACETILCISTEINA 200MG LAROPHARM || CLEXANE 6000UI (60MG)/ 0,6ML * 10 SER. PRE. || PARACETAMOL 500MG ZENTIVA*20CPR || VITAMINA C 1000mg*30cpr BERES

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacient in varsta de 28 ani, fara APP semnificative, cu contact intrafamilial COVID-19 (tatal diagnosticat in 07.08.2020), prezinta din 08.08 astenie pronuntata, ulterior anosmie, ageuzie, obstructie nazala, tuse rara, scaune moi. A fost testat PCR SARS-COV-2, prin DSP, in data de 10.08, cu rezultat pozitiv in 11.08. Se temporizeaza internarea datorita lipsei de lcouri in SCBI.

Obiectiv: stare generala usor alterata, apetent, afebril, constient, cooperant, tegumente si mucoase normal colorate, stabil hemodinamic si respirator (TA=127/86 mmHg, AV=83/min, SpO2= 99% aa), stetacustic pulmonar si cardiac fara modificari, abdomen liber, destins de volum, fara sensibiliate la palpare, tranzit intestinal prezent, diureza prezenta, fara semne de iritatie meningeana sau de focar neurologic.

Biologic:fara sindrom inflamator, hipercolesterolemie, hipertrigliceridemie

Radiografia toracica: fara leziuni pleuro-pulmonare vizibile radiologic.

Pe parcursul internarii pacientul a fost izolat, a urmat tratament medicamentos cu expectorant, anticoagulant, vitamina C si simptomatice la nevoie.

La evaluarea din data de 17.08, probele biologice sunt in limite normale.

PCR SARS-COV-2-PROBA 2 (17.08.2020)- DETECTABIL

Radiografia pulmonara de control nu descrie aspecte evolutive pulmonare.

Se externeaza afebril, apetent, stabil hemodinamic si respirator, cu recomandari:

Tratament recomandat

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 se indica izolare la domicliu/locatia declarata pe o perioada de 4 zile de la externare(pana in data de 23.08.2020). In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul/locatia declarata.

Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeasca vizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

in timpul utilizarii, trebuie sa evitati atingerea mastii;

sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;

sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domicliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteana. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii: - □ S-a eliberat prescriptie medicalã, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia - □ Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar - ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicala Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii: - □ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia - □ Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar - ☒ Nu s-a eliberat concediu medical la externare Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii:

- S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu

Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar

Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii:

- S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu
- Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar

(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)

Unitate judeteana de diabet zaharat:	
Nr. inregistrare al asiguratului:	

Data 19.08.2020

Sef sectie:

Medic curant:

Medic rezident:

Dr. IUBU ROXANA Dr. TOMESCU SERBAN

Dr. ROXANA IUBU
medic primar boli infectioase
medic specialist pediatrie
cod D51027



Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;