

Motivele prezentarii

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105; E-mail: infectioasecj@yahoo.com web:

ANMCS
unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca JUDE DANA- CLAUDIA, nascut la data de 19.02.1970, CNP / cod unic de asigurare 2700219240055, Adresa: Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.ARTELOR Nr.32A a fost internat in serviciul nostru in perioada: 12.04.2020 20:22 - 23.04.2020 13:00, FO: 13857 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE II-ADULTI si se externeaza: STATIONAR

Diagnostice:

INFECTIE COVID-19 ASIMPTOMATICA ALERGIE LA AMOXICILINA, CEFORT

Anamneza	
- factori de risc	
Examen clinic	
- general	
- local	
Examene de laborator:	
12.04.2020	
APTT - APTT (sec) 23.4 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 0.76 [0.5 - 0.9],	
Glicemie - 88 [70 - 105], GOT - 21 [0 - 35], GPT - 20 [0 - 35], Hemoleucograma	
completa - Leucocite 5.7 [3.9 - 11.1] , - Hematii 4.45 [3.88 - 4.99] , - Hemoglobina 13.7 [
11.5 - 15.4], - Hematocrit 40.4 [36.0 - 48.0], - VEM 90.9 [81.0 - 99.0], - HEM 30.8 [25.0 -	
33.0], - CHEM 33.9 [31.6 - 35.8], - RDW-CV% 13.6 [9.9 - 15.5], - Trombocite 159 [150 -	
450], - MPV 9.3 [6.5 - 14.0], - NEUT% 53.78 [40 - 70], - LYMPH% 30.22 [20 - 40], -	
MONO% 14.57 [3.0 - 10.0] , - EO% 1.16 [0 - 5] , - BASO% 0.27 [0 - 2] , - NEUT# 3.066 [
1.8 - 7.4] , - LYMPH# 1.722 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.830 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.066 [0.00 -	
0.67], - BASO# 0.015[0-0.13], K -4.0[3.5-5.1], LDH -156[0-250], Na -137[136-	
146], Proteina C reactiva - 0.40 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.2 [8.9	
- 13.1] , - PT (%) (plasma) 95.4 [70 - 130] , - INR (plasma) 1.02 [0.8 - 1.2], Uree - 17 [0 -	
50], VSH - 7[1 - 20]	
14.04.2020	
Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -]	
21.04.2020	
APTT - APTT (sec) 24.0 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 0.64 [0.5 - 0.9],	
Feritina - 157.9 [11.0 - 306.8], Glicemie - 79 [70 - 105], GOT - 16 [0 - 35], GPT - 12 [0 -	
35], Hemoleucograma completa - Leucocite 7.7 [3.9 - 11.1], - Hematii 4.67 [3.88 - 4.99], -	
Hemoglobina 14.6 [11.5 - 15.4] , - Hematocrit 42.4 [36.0 - 48.0] , - VEM 90.8 [81.0 - 99.0] ,	
- HEM 31.2 [25.0 - 33.0] , - CHEM 34.3 [31.6 - 35.8] , - RDW-CV% 13.7 [9.9 - 15.5] , -	
Trombocite 266 [150 - 450] , - MPV 8.8 [6.5 - 14.0] , - NEUT% 51.71 [40 - 70] , -	
LYMPH% 35.62 [20 - 40] , - MONO% 9.81 [3.0 - 10.0] , - EO% 1.92 [0 - 5] , - BASO%	
0.94 [0 - 2] , - NEUT# 4.001 [1.8 - 7.4] , - LYMPH# 2.756 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.759 [
0.21 - 0.92] , - EO# 0.148 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.073 [0 - 0.13], LDH - 171 [0 - 250],	
Proteina C reactiva - 0.10 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 10.5 [8.9 - 13.1	
], - PT (%) (plasma) 109.7 [70 - 130], - INR (plasma) 0.95 [0.8 - 1.2], Uree - 25 [0 - 50],	

VSH - 14 [1 - 20], **Covid-19 (SARS-CoV-2)** - Detectabil [Nedetectabil -] **23.04.2020**

Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG - Incert (index 0.972) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Nonreactiv (index 0.668) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -]

Exame: EKG	ne paraclinice:
ECO	
Rx	T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 13.04.2020RGR PULM D=4 Gym2Fara leziuni focale sau infiltrative pulmonare evidente rgr.Fara colectii pleurale. Cord, aorta radiologic normale.
Altele	
Tratan	nent efectuat

 $ERIDIAROM \parallel Lopinavir/Ritonavir Mylan 200mg/50mg*120cpr.film.(Kaletra) \parallel METOPROLOL 50MG*30CPR \\ TERAPIA \parallel PARACETAMOL 500MG - MAGISTRA \parallel PARACETAMOL POLISANO 500MG*20CPR \parallel PLAQUENIL 200MG*60 compr.film. <math>\parallel$ SPAVERIN40MG 2BLX10CPS \parallel STOP TOXIN forte*30CPS

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacienta in varsta de 50 ani, cunoscuta cu tiroidita autoimuna si hipotiroidism, sub tratament cu Euthyrox, cu alergii cunoscute la Amoxicilina si Cefort, se prezinta pentru tratament corespunzator in urma confirmarii infectiei COVID-19 in data de 10.04.2020 la Regina Maria.

Din ancheta epidemiologica retinem ca a fost vaccinata antigripal, a avut contact apropiat cu persoane cu simptome caracteristice unei infectii respiratorii acute, a lucrat in unitati sanitare, si a avut contact cu cazuri confirmate cu infectie COVID-19 in perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor. Mentionam ca pacienta este cadru medical (medic) la IRGH, si a venit in contact cu bolnav confirmat ulterior cu infectie COVID-19.

Obiectiv la internare: starea generala buna, afebrila, constienta, orientata temporo-spatial, faringe eritematos/congestionat difuz, stabila hemodinamic si respirator (TA = 149/111 mmHg, AV = 91 bpm, SaO2 = 99%), auscultatia cardio-pulmonara fara particularitati, abdomen liber, fara sensibilitate la palpare, fara modificari de tranzit intestinal, mictiuni fiziologice exteriorizate spontan, Giordano negativ bilateral, fara semne de iritatie meningeana, fara semne de focar neurologic.

Biologic : monocitoza, functie renala si hepatica in limite normale, coagulograma fara modificari, fara sindrom inflamator.

PCR COVID-19:DETECTABIL in data de 10.04.2020 PCR COVID-19:DETECTABIL in data de 14.04.2020 PCR COVID-19:DETECTABIL in data de 22.04.2020

Radiografia pulmonara in data de 13.04.2020: Fara leziuni focale sau infiltrative pulmonare evidente rgr.Fara colectii pleurale. Cord, aorta radiologic normale.

Pe parcursul internarii pacienta, a fost izolata, a urmat tratament medicamentos initial cu Plaquenil 2x2/zi, o zi, urmat de Plaquenil 2x1/zi, timp de doua zile. In data de 13.04.2020 s-a introdus Kaletra 2x2/zi, timp de 10 zile. Pe parcursul internarii s-a mentinut afebrila, stabila hemodinamic si respirator. Nu a prezentat reactii adverse la tratament. Se transfera la Clinica de Recuperare, in afebrilitate, fara simptomatologie.

Tratament recomandat

Se elibereaza concediu medical pe perioada internarii pentru persoana asimptomatica, COD:01/64.

Se recomanda testare in data de 26.04.2020. Daca rezultatul este NEDETECTABIL se repeta la 24 de ore (27.04.2020), iar daca si acesta este NEDETECTABIL se externeaza.

Concediul medical 14 zile, izolare la domiciliu.

Recomandari la externare pentru prevenirea transmiterii infectiei in comunitate Dupa externarea din spital este recomandata continuarea izolarii, la domiciliu, timp de inca 14 zile, cu respectarea stricta a urmatoarelor indicatii:

- 1. Izolati-va singur intr-o camera bine aerisita, de preferat cu baie proprie pe care sa nu o folositi in comun cu restul familiei. Daca este posibil, izolati-va intr-o locuinta separata de restul familiei.
- 2. Evitati complet contactul cu ceilalti membri ai familiei, cu alte persoane sau cu animale de companie. In cazul in care contactul nu poate fi sub nicio forma evitat complet, purtati intotdeauna masca atunci cand sunteti in preajma altor persoane (de exemplu, in aceeasi camera, in aceeasi masina, etc.). Daca nu puteti purta masca, vor purta masca persoanele care intra in camera dumneavoastra. Masca de protectie trebuie sa acopere complet nasul si gura persoanei care o poarta. Atentie! Purtarea mastii nu inlocuieste recomandarea de a evita contactul cu alte persoane.
- 3. Nu mergeti la serviciu/scoala sau in spatii publice.
- 4. Nu folositi transportul in comun, taxi, uber sau alte mijloace de transport care se presupune un potential contact cu alte persoane.
- 5. Monitorizati-va starea de sanatate si contactati telefonic medicul in cazul in care este necesar.
- 6. Nu parasiti domiciliul pentru niciun motiv, in afara de motive medicale.
- 7. Daca aveti nevoie de ingrijiri medicale care nu sunt urgente, de exemplu pentru o boala cronica stabila, luati legatura prin telefon cu medicul dumneavoastra de familie, mentionand faptul ca sunteti in izolare 14 zile dupa ce ati fost externat din spital dupa COVID-19.
- 8. Daca stranutati sau tusiti acoperiti-va gura si nasul cu un servetel de unica folosinta, pe care aveti grija sa-l aruncati imediat intr-un cos de gunoi prevazut cu sac de gunoi de unica folosinta si inchis cu capac, apoi igienizati-va mainile.
- 9. Nu atingeti nimic cu mainile neigienizate dupa ce v-ati atins fata sau ati stranutat/tusit.
- 10. Spalati-va pe maini cu apa si sapun minimum 20 de secunde, frecvent, si neaparat dupa orice contact cu ochii, nasul sau gura, dupa stranut, tuse, sau suflarea nasului, precum si dupa utilizarea toaletei, si inainte de pregatirea sau servirea mesei.
- 11. Folositi prosoape de hartie, de preferat, pentru a va sterge mainile si fata.
- 12. Apa si sapunul timp de minimum 20 de secunde reprezinta varianta preferata de igienizare a mainilor. In cazul in care aceasta varianta nu este disponibila, folositi solutii anti-septice pentru maini, pe baza de alcool cu concentratie de minim 60%.
- 13. Dezinfectati frecvent, cel putin o data pe zi, cu solutie pe baza de alcool sau clor, suprafetele cu care intrati in contact, in special: mese, noptiere, blat de bucatarie, clante, obiecte sanitare, telefon, tableta, tastatura, sau alte suprafete. Utilizati solutiile dezinfectante conform instructiunilor producatorului.
- 14. Aerisiti de mai multe ori pe zi incaperea in care desfasurati activitati.
- 15. Serviti masa separat de restul familiei, in camera dumneavoastra, apoi spalati vesela si tacamurile cu detergent si apa din abundenta, sau folosind temperaturi inalte la masina de spalat vase, daca este posibil.
- 16. Nu beti lichide din aceeasi sticla/pahar cu alte persoane, nu mancati din aceeasi farfurie si nu folositi aceleasi tacamuri.
- 17. Nu folositi prosop sau asternut de pat comun cu restul familiei. Acestea, precum si hainele dumneavoastra, vor fi spalate si uscate separat de ale celorlalti membri ai familiei, la temperaturile

cele mai inalte permise conform instructiunilor de pe eticheta.

Indicatie pentru revenire la internare

(cu

18. Puteti obtine detalii despre COVID-19 daca sunati la 0800.800.358, care este un numar de informare, nu este un numar de urgenta.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

•		
X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare		
Se completează obligatoriu una din cele două info -	re se va înscrie seria si numarul acesteice nu a fost necesar ormatii: CCMAM 4169286 caz în care se va înscrie seria si numarare deoarece nu a fost necesar are ormatii: edicale la domiciliu/paliative la domici i medicale la domiciliu/paliative la dor ormatii: pozitive medicale in ambulatoriu dispozitive medicale in ambulatoriu de	rul acestuia iliu niciliu,
Unitate judeteana de diabet zaharat:		
Nr. inregistrare al asiguratului:		
Data 23.04.2020	•	
Sef sectie:	Medic curant:	Medic rezident
Sef Lucrari Dr. MUNTEAN MONICA	Dr. ITU MURESAN CORINA	
Dr. MONICA MUNTEAN medic primar boli injectiouse cod 828242	Medic primar Dr. CORIMA ITU MIRTESAN medic priviles boli infectione	
Calea de transmitere: - prin asigurat - prin posta		
*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exempl	lare, din care un exemplar ramane la medie	cul

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;