

## BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA \*)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **BARCSA IOSIF**, nascut la data de **17.11.2012**, CNP / cod unic de asigurare **5121117125472**, Adresa: **Jud.CLUJ Loc.Dej Str.POMILOR Nr.5** a fost internat in serviciul nostru in perioada: **02.05.2020 03:25 - 20.05.2020 13:30**, FO: **14317 F.O.** / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE VI-COPII** si se externeaza: **VINDECAT**

### Diagnostic:

INFECTIE COVID-19  
PNEUMONIE INTERSTITIALA  
ANGINA ACUTA ERITEMATOASA

### Motivele prezentarii

### Anamneza

#### - factori de risc

### Examen clinic

#### - general

#### - local

### Exame de laborator:

#### 02.05.2020

**APTT** - APTT (sec) 24.1 [ 22.1 - 28.1 ], - **APTT (%)** [ - ], **Creatinina** - 0.4 [ 0.4 - 0.6 ],  
**Feritina** - 41.9 [ 9.0 - 306.8 ], **Fibrinogen** - 305 [ 180 - 400 ], **Glicemie** - 92 [ 60 - 100 ], **GOT** - 25 [ 0 - 45 ], **GPT** - 16 [ 0 - 45 ], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 7.25 [ 4.0 - 10.0 ], - Hematii 4.54 [ 3.9 - 5.7 ], - Hemoglobina 11.9 [ 11.3 - 15.3 ], - Hematocrit 36.0 [ 33.0 - 45.0 ], - VEM 79.3 [ 72.0 - 99.6 ], - HEM 26.2 [ 24.0 - 34.0 ], - CHEM 33.1 [ 31.0 - 35.0 ], - Trombocite 294 [ 150 - 450 ], - NEUT% 38.7 [ 37 - 65 ], - LYMPH% 45.2 [ 27 - 50 ], - MONO% 8.4 [ 3.0 - 10.0 ], - EO% 7.3 [ 0 - 5 ], - BASO% 0.4 [ 0 - 2 ], - NEUT# 2.80 [ 1.5 - 6 ], - LYMPH# 3.28 [ 1.5 - 4.0 ], - MONO# 0.61 [ 0.15 - 1.3 ], - EO# 0.53 [ 0.00 - 0.67 ], - BASO# 0.03 [ 0 - 0.13 ], - RDW-CV 13.0 [ 9.9 - 15.5 ], - PDW\* 13.6 [ 10 - 16.5 ], - MPV 11.4 [ 6.5 - 14.0 ], **K** - 4.4 [ 3.5 - 5.1 ], **LDH** - 231 [ 120 - 300 ], **Na** - 140 [ 136 - 146 ], **Proteina C reactiva** - 0.03 [ 0 - 1 ], **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 11.0 [ 8.9 - 13.1 ], - PT (%) (plasma) 99.2 [ 70 - 130 ], - INR (plasma) 1.00 [ 0.8 - 1.2 ], **Trigliceride** - 69 [ 0 - 150 ], **Uree** - 23.4 [ 0 - 50 ], **VSH** - 9 [ 1 - 15 ], **D-Dimeri** - 0.28 [ 0 - 0.55 ]

#### 13.05.2020

**Covid-19 (SARS-CoV-2)** - Detectabil [ Nedetectabil - ]

#### 18.05.2020

**Covid-19 (SARS-CoV-2)** - Nedetectabil [ Nedetectabil - ]

#### 19.05.2020

**Covid-19 (SARS-CoV-2)** - Nedetectabil [ Nedetectabil - ], **Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG** - Reactiv (Index=10.085) [ Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert >= 1.2 Reactiv - ],

**Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM** - Nonreactiv (Index=0.720) [ Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert >= 1.2 Reactiv - ]

## Examene paraclinice:

### EKG

### ECO

### Rx

T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 2.05.2020RGR PULM D=1.3 Gym2Discreta accentuare difuza a interstiului peribronhovascular in regiunile prihilare si infrahilare bilateral. Fara zone de condensare vizibile rgr. SCD libere || T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: `08.05.2020.RG PULM.-D= 2.4 Gym2Fara zone de condensare vizibile rgr. SCD libere

### Altele

### Tratament efectuat

AZITHROMYCINA 250mg\*6cpr. TEVA PH. || AZITROX 200MG/5ML\*1FL Pulb.susp. || BIXTONIM XYLO 0.5MG/ML pic.naz. || FUCIDIN CREMA 2% TUB 15G || HEPA MERZ GRAN.SOL.ORALA 5GR\*30PL || HEPIFLOR BABY\*10PL || PARACETAMOL 500MG - MAGISTRA || PARACETAMOL SUP. 125MG\*10buc || SUNLYTE 8 PLICURI/CUT || WORMEX SIROP \* 200ML

### Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

#### EPICRIZA

Pacient in varsta de 7 de ani, fara antecedente personale patologice semnificative, afirmativ vaccinat conform BMS, se prezinta datorita unui test COVID-19 pozitiv in data de 01.05.2020 (pacientul face parte din focarul de la Dej). Pacientul este asimptomatic.

Obiectiv, stare generala relativ buna, afebril, G=24 kg, congestie faringo-amigdaliana discreta, adenopatii laterocervicale bilaterale si submandibulare, infracentimetrice, mobile, elastice nedureroase la palpare (d=1/1cm), echilibrat cardio-respirator, MV inasprit bilateral, fara raluri supraadaugate, AV=84 bpm, SaO2=99% aa, abdomen suplu, mobil cu respiratia, fara sensibilitate la palpare, loje renale libere, diureza pastrata, fara semne de iritatie meningeana sau focar neurologic.

Biologic se constata absenta sindromului inflamator, probe renale si hepatice in limite normale, fara diselectrolitemii, D-Dimeri in limite normale, indici ai coagularii in limite normale.

Radiografia toracica descrie aspect de pneumonie interstitiala.

Se interpreteaza cazul ca infectie COVID-19 forma usoara.

S-a testat astfel:

Proba nr.1/01.05.2020/ rtPCR SARS-CoV2 - DETECTABIL

Proba nr.2/14.05.2020/ rtPCR SARS-CoV2 - DETECTABIL

Proba nr.3/19.05.2020/ rtPCR SARS-CoV2 - NEDETECTABIL

Proba nr.4/20.05.2020/ rtPCR SARS-CoV2 - NEDETECTABIL

Sub repaus, tratament simptomatic, antibioterapie cu Azitromicina 250mg/zi per os timp de 5 zile; evolutia este favorabila.

Se externeaza afebril, apetent, fara acuze, stare generala buna, vindecat, cu 2 teste negative; cu recomandarile ulterioare

### Tratament recomandat

- Repaus relativ la domiciliu pentru 14 zile
- Hidratare adecvata si mentinerea unui stil de viata sanatos
- Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune sac de gunoi (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit spital) se vor pastra sac loc separat (balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe maini cu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Ce masuri de igiena individuala trebuie sa respecte persoanele izolate la domiciliu?

- Sa evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze

camera separata, cu baie separata.

- Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (Domestos) sau alcool (min 70 %).
- Sa nu primeasca vizitatori perioada de repaus la domiciliu.
- Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, pregatirii mesei, etc).
- Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).
- Sa acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranut sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.
- Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane.
- Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.
- In timpul utilizarii, trebuie sa evitati atingerea mastii
- Sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci snurile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;
- Sa nu reutilizati mastile de unica folosinta!!!! Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede in caz de umezire.
- In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

**Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate**

#### **Indicatie pentru revenire la internare**

☒ Nu, nu este necesara revenirea pentru internare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia
- ☐ Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicala

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat concediu medical la externare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu
- ☒ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu
- ☒ Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispozitive medicale in ambulatoriu deoarece nu a fost necesar

(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)

Unitate judeteana de diabet zaharat:	
Nr. inregistrare al asiguratului:	

Data 20.05.2020 .....

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

\*conform contractului cadru/2014 - model scrisoare medicala/Bilet de iesire - anexa 43

**Sef sectie:**

**Dr. SABOU MIHAELA**

**Medic primar**

Dr. MIHAELA SABOU  
medic primar  
boli infectioase  
A71379

**Medic curant:**

**Dr. TRIPON RALUCA**

Dr. Tripon Raluca-Elena  
medic specialist  
Boli Infectioase  
cod E67277

**Medic rezident:**

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta .....

-----

\*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;