

Motivele prezentarii

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105; E-mail: infectioasecj@yahoo.com web:

ANMCS
unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

## BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA \*)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca VITAN ELISABETA, nascut la data de 28.03.2000, CNP / cod unic de asigurare 6000328124423, Adresa: Jud.CLUJ Loc.Dej Str.M. VITEAZU Nr.13 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 02.05.2020 22:22 - 15.05.2020 15:00, FO: 14331 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE III-ADULTI si se externeaza: AMELIORAT

## Diagnostice:

INFECTIE CU SARS-COV 2 FORMA USOARA SARCINA IN EVOLUTIE - SAPTAMANA 20 (declarativ)

www.infectioasecluj.ro

Anamneza	
- factori de risc	
T	
Examen clinic	
- general	
- local	
Examene de laborator:	
02.05.2020	
<b>APTT</b> - APTT (sec) 21.6 [ 22.1 - 28.1 ] , - APTT (%) [ - ], <b>Creatinina</b> - 0.5 [ 0.5 - 0.9 ],	
<b>D-Dimeri</b> - 1.07 [ 0 - 0.55 ], <b>Fibrinogen</b> - 389 [ 180 - 400 ], <b>Glicemie</b> - 68 [ 70 - 105 ], <b>GOT</b>	Γ-
18 [ 0 - 35 ], <b>GPT</b> - 17 [ 0 - 35 ], <b>Hemoleucograma completa</b> - Leucocite 5.62 [ 3.9 - 11.1 ]	, -
Hematii 4.56 [ 3.88 - 4.99 ] , - Hemoglobina 12.7 [ 11.5 - 15.4 ] , - Hematocrit 38.0 [ 36.0 - 4	
], - VEM 83.3 [ 81.0 - 99.0 ], - HEM 27.9 [ 25.0 - 33.0 ], - CHEM 33.4 [ 31.6 - 35.8 ], -	
Trombocite 204 [ 150 - 450 ], - NEUT% 54.9 [ 40 - 70 ], - LYMPH% 37.4 [ 20 - 40 ], -	
MONO% 7.5 [ 3.0 - 10.0 ] , - EO% 0.0 [ 0 - 5 ] , - BASO% 0.2 [ 0 - 2 ] , - NEUT# 3.09 [ 1.8	-
7.4], - LYMPH# 2.10 [ 1.1 - 3.5], - MONO# 0.42 [ 0.21 - 0.92], - EO# 0.00 [ 0.00 - 0.67]	],-
BASO# 0.01 [ 0 - 0.13 ] , - RDW-CV 14.0 [ 9.9 - 15.5 ] , - PDW* 11.2 [ 10 - 16.5 ] , - MPV	9.7
[ 6.5 - 14.0 ], <b>LDH</b> - 156 [ 0 - 250 ], <b>Proteina C reactiva</b> - 0.73 [ 0 - 1 ], <b>Timp de</b>	
protrombina - PT (sec) (plasma) 10.9 [ 8.9 - 13.1 ] , - PT (%) (plasma) 101.1 [ 70 - 130 ] , -	
INR (plasma) 0.99 [ 0.8 - 1.2 ], <b>Uree</b> - 15.5 [ 0 - 50 ], <b>VSH</b> - 15 [ 1 - 20 ]	
06.05.2020	
<b>APTT</b> - APTT (sec) 21.5 [ 22.1 - 28.1 ] , - APTT (%) [ - ], <b>D-Dimeri</b> - 1.07 [ 0 - 0.55 ],	
Feritina - 17.5 [ 11.0 - 306.8 ], Hemoleucograma completa - Leucocite 7.7 [ 3.9 - 11.1 ] , -	
Hematii 4.86 [ 3.88 - 4.99 ] , - Hemoglobina 14.1 [ 11.5 - 15.4 ] , - Hematocrit 39.7 [ 36.0 - 4	8.0
], - VEM 81.7 [ 81.0 - 99.0 ], - HEM 29.0 [ 25.0 - 33.0 ], - CHEM 35.4 [ 31.6 - 35.8 ], -	
RDW-CV% 14.7 [ 9.9 - 15.5 ], - Trombocite 204 [ 150 - 450 ], - MPV 8.1 [ 6.5 - 14.0 ], -	
NEUT% 61.16 [ 40 - 70 ] , - LYMPH% 29.64 [ 20 - 40 ] , - MONO% 7.47 [ 3.0 - 10.0 ] , - E0	
0.76 [ 0 - 5 ] , - BASO% 0.97 [ 0 - 2 ] , - NEUT# 4.705 [ 1.8 - 7.4 ] , - LYMPH# 2.281 [ 1.1 -	
3.5 ] , - MONO# 0.575 [ 0.21 - 0.92 ] , - EO# 0.059 [ 0.00 - 0.67 ] , - BASO# 0.075 [ 0 - 0.13	_
<b>LDH</b> - 187 [ 0 - 250 ], <b>Timp de protrombina</b> - PT (sec) (plasma) 11.0 [ 8.9 - 13.1 ] , - PT (9	6)
(plasma) 99.2 [ 70 - 130 ] , - INR (plasma) 1.00 [ 0.8 - 1.2 ]	
09.05.2020	
<b>Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG</b> - Nonreactiv (Index=0.706) [ Index < 0.8 Nonreactiv>= 0	.8 -
< 1.2 Incert > =1.2 Reactiv - ], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Nonreactiv	

	(Nonreactiv=0.466) [ Index $< 0.8$ Nonreactiv $>= 0.8 - < 1.2$ Incert $> =1.2$ Reactiv - ], <b>Covid-19</b>
	(SARS-CoV-2) - Detectabil [ Nedetectabil - ]
	12.05.2020
	Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [ Nedetectabil - ], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG -
	Nonreactiv (Index=0.586) [ Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv - ],
	Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Nonreactiv (Index=0.517) [ Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv - ]
	ene paraclinice:
EKG	
ECO	
Rx	
Altele	
	ment efectuat
	DADACETAMOL 500MC MACISTRA

PARACETAMOL 500MG - MAGISTRA

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: **EPICRIZA** 

Pacienta in varsta de 20 de ani, fara APP semnificative, cu sarcina saptamana a 36 a, se interneaza in serviciul nostru asimptomatica, cu infectie cu SARS-COV 2 confirmata in 02.05.2020.

Din ancheta epidemiologica retinem ca nu a fost vaccinata antigripal, a avut contact direct cu mai multe rude confirmate cu COVID -19. Mentionam ca pacientul nu a vizitat unitati sanitare in perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor. Nu poate preciza contactul cu un caz probabil sau confirmat in perioada 14 zile anterioare debutului simptomelor. Nu a vizitat in perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor vreun targ/piata de animale vii.

Obiectiv la internare: starea generala mediu alterata, afebrila, constienta, orientata temporo-spatial, tegumente si mucoae normal colorate, examen faringian: aspect normal, stabil hemodinamic si respirator (TA =130/80 mmHg, AV =88 b/min, SaO2 =98 % in aa, FR<18 resp/min, auscultatia cardio-pulmonara fara particularitati, abdomen liber, elastic, mobil cu miscarile respiratorii, tesut adipos in exces, sensibil la palapre difuz, predominant in epigastru, fara modificari de tranzit intestinal, mictiuni fiziologice exteriorizate spontan, fara semne de iritatie meningeana, fara semne de focar neurologic.

Biologic: hemoleucograma in limite normale, absenta markerilor inflamatori, transaminaze in limite normale, D-dimerii usor crescuti (1.07 mg/L).

PCR SARS-CoV-2 (02.05 .2020): DETECTABIL.

PCR SARS-CoV-2 (10.05.2020) : DETECTABIL

PCR SARS-CoV2 (13.05.2020): DETECTABIL

Test imunologic SARS CoV2- IgM - nonreactiv; IgG - nonreactiv.

Pe parcursul internarii a urmat tratament simptomatic la nevoie.

Pacienta se transfera la Spitalul de Recuperare cu starea generala buna, in afebrilitate, stabila hemodinamic si respirator.

## **Tratament recomandat**

Pacienta va fi retestata RT-PCR SARS CoV2 pe 20.V.2020 (proba nr 5, cod caz CJ/6263/2020), de asemenea va putea fi repetata evaluarea imunologica (testul 2019 nCoV IgM/IgG) si va putea fi externata dupa obtinerea rezultatului "nedetectabil" la doua teste RT-PCR efectuate la interval de 24 ore.

Dupa externare pacienta se va adresa la ginecologie pentru evaluare si monitorizare.

Repaus la externare cu respectarea normelor de igiena personala dupa cum urmeaza :

- 1. Izolati-va singur(a) intr-o camera bine aerisita, de preferat cu baie proprie pe care sa nu o folositi in comun cu restul familiei. Daca este posibil, izolati-va intr-o locuinta separata de restul familiei.
- 2. Evitati complet contactul cu ceilalti membri ai familiei, cu alte persoane sau cu animale de companie. In cazul in care contactul nu poate fi sub nicio forma evitat complet, purtati intotdeauna masca atunci cand sunteti in preajma altor persoane (de exemplu, in aceeacamera, in aceeasi masina, etc.). Daca nu puteti purta masca, vor purta masca persoanele care intra in camera dumneavoastra. Masca de protectie trebuie sa acopere complet nasul si gura persoanei care o poarta. Atentie! Purtarea mastii nu recomandarea de a evita contactul cu alte persoane.
- 3. Nu mergeti la serviciu.
- 4. Nu folositi transportul in comun, taxi, uber sau alte mijloace de transport care sa presupuna un potential contact cu alte persoane.
- 5. Monitorizati-va starea de sanatate si contactati telefonic medicul in cazul in care este necesar.
- 6. Nu parasiti domiciliul in afara de motive medicale si asigurarea necesitatior alimentare si de igiena. In cazul in care aveti nevoie de ingrijire medicala urgenta, sunati la 112 si mentionati ca sunteti in izolare 14 zile dupa ce ati fost externat vindecat din spital dupa COVID-19, apoi mentionati care este urgenta medicala, astfel incat sa se poata lua masurile necesare, in conditii de siguranta.
- 7. Daca aveti nevoie de ingrijiri medicale care nu sunt urgente, de exemplu pentru o boala cronica stabila, luati legatura prin telefon cu medicul dumneavoastra, mentionand faptul ca sunteti in izolare 14 zile dupa ce ati fost externat din spital dupa COVID-19.
- 8. Daca stranutati sau tusiti acoperiti-va gura si nasul cu un servetel de unica folosinta, pe care aveti grija sa-l aruncati imediat intr-un cos de gunoi prevazut cu sac de gunoi de unica folosinta si inchis cu capac, apoi igienizati-va mainile.
- 9. Nu atingeti nimic cu mainile neigienizate dupa ce v-ati atins fata sau ati stranutat/tusit.
- 10. Spalati-va pe maini cu apa si sapun minimum 20 de secunde, frecvent, si neaparat dupa orice contact cu ochii, nasul sau gura, dupa stranut, tuse, sau suflarea nasului, precum si dupa utilizarea toaletei, si inainte de pregatirea sau servirea mesei.
- 11. Folositi prosoape de hartie, de preferat, pentru a va sterge mainile si fata.
- 12. Apa si sapunul timp de minimum 20 de secunde reprezinta varianta preferata de igienizare a mainilor. In cazul in care aceasta varianta nu este disponibila, folositi solutii anti-septice pentru maini, pe baza de alcool cu concentratie de minim 60%.
- 13. Dezinfectati frecvent, cel putin o data pe zi, cu solutie pe baza de alcool sau clor, suprafetele cu care intrati in contact, in special: mese, noptiere, blat de bucatarie, clante, obiecte sanitare, telefon, tableta, tastatura, sau alte suprafete. Utilizati solutiile dezinfectante conform instructiunilor producatorului.
- 14. Aerisiti de mai multe ori pe zi incaperea an care desfasurati activitati.
- 15. Serviti masa separat de restul familiei, in camera dumneavoastra, apoi spalati vesela si tacamurile cu detergent si apa din abundenta, sau folosind temperaturi inalte la masina de spalat vase, daca este posibil.
- 16. Nu beti lichide din aceeasi sticla/pahar cu alte persoane, nu mancati din aceeasi farfurie si nu folositi aceleasi tacamuri.
- 17. Nu folositi prosop sau asternut de pat comun cu restul familiei. Acestea, precum si hainele dumneavoastra, vor fi spalate si uscate separat de ale celorlalti membri ai familiei, la temperaturile cele mai inalte permise conform instructiunilor de pe eticheta.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii	:			
- S-a eliberat prescriptie medicalã, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia				
- Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar				
- X Nu s-a eliberat prescriptie medicala				
Se completează obligatoriu una din cele două informatii  S-a eliberat concediu medical la externare, caz în  Nu s-a eliberat concediu medical la externare dec  X Nu s-a eliberat concediu medical la externare  Se completează obligatoriu una din cele două informatii  S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medical  X Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medical  deoarece nu a fost necesar  Se completează obligatoriu una din cele două informatii  S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispoziti  Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispoziti	care se va înscrie seria si numarul acestu parece nu a fost necesar  : e la domiciliu/paliative la domiciliu ticale la domiciliu/paliative la domiciliu, : ve medicale in ambulatoriu	ia		
nu a fost necesar				
(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, pentru diabet)				
Unitate judeteana de diabet zaharat:				
Nr. inregistrare al asiguratului:				
Data 15.05.2020		_		
Sef sectie:	Medic curant: <u>N</u>	<u>ledic rezident:</u>		
Conf. Dr. RADULESCU AMANDA	BUTA CODRINA-VERONICA			
Medic primar				
Dr. AMANDA PADULESCU medic primar belienfectionse și epidemfologie cod 048773	Dr. BUTA CODRINA medic primar Boli Infecțioase cod B36194			
Calea de transmitere: - prin asigurat - prin posta				

\*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;

X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare