

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105;

 $\hbox{$E$-mail: infectioasecj @yahoo.com web:} \\$ 

www.infectioasecluj.ro



# BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA \*)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca HOJDA MARIA ANDREEA, nascut la data de 28.02.1995, CNP / cod unic de asigurare 2950228243831, Adresa: Jud.MARAMURES Loc.Moisei Str.. Nr.1682B a fost internat in serviciul nostru in perioada: 25.05.2020 21:25 - 13.06.2020 12:00, FO: 15195 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE I-ADULTI si se externeaza: VINDECAT

### Diagnostice:

INFECTIE COVID-19 FORMATIUNE TUMORALA PAROTIDIANA DREAPTA OBEZITATE

Motivele prezentarii				
Anamneza				
- factori de risc				
Examen clinic - general				
- local				
Examene de laborator:				
03.06.2020				
Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [ Nedetectabil - ]				
07.06.2020				
Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [ Nedetectabil - ], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG -				
Nonreactiv (Index=0.704) [ Index $< 0.8$ Nonreactiv>= $0.8 - < 1.2$ Incert > =1.2 Reactiv - ],				
Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Incert (Index=0.846) [ Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - <				
1.2 Incert $> =1.2$ Reactiv - ]				
09.06.2020				
<b>Creatinina</b> - 0.68 [ 0.5 - 0.9 ], <b>Glicemie</b> - 84 [ 70 - 105 ], <b>GOT</b> - 17 [ 0 - 35 ], <b>GPT</b> - 26 [ 0 - 35	ĺ			
], <b>LDH</b> - 163 [ 0 - 250 ], <b>Proteina C reactiva</b> - 0.51 [ 0 - 1 ], <b>Uree</b> - 21 [ 0 - 50 ],				
<b>Hemoleucograma completa</b> - Leucocite 8.41 [ 3.9 - 11.1 ] , - Hematii 5.06 [ 3.88 - 4.99 ] , -				
Hemoglobina 12.5 [ 11.5 - 15.4 ] , - Hematocrit 38.9 [ 36.0 - 48.0 ] , - VEM 76.9 [ 81.0 - 99.0 ] ,				
- HEM 24.7 [ 25.0 - 33.0 ] , - CHEM 32.1 [ 31.6 - 35.8 ] , - Trombocite 448 [ 150 - 450 ] , -				
NEUT% 62.5 [ 40 - 70 ] , - LYMPH% 27.5 [ 20 - 40 ] , - MONO% 8.4 [ 3.0 - 10.0 ] , - EO% 1.2	,			
[0-5], -BASO% 0.4 [0-2], -NEUT# 5.26 [1.8-7.4], -LYMPH# 2.31 [1.1-3.5], -				
MONO# 0.71 [ 0.21 - 0.92 ] , - EO# 0.10 [ 0.00 - 0.67 ] , - BASO# 0.03 [ 0 - 0.13 ] , - RDW-CV				
15.0 [ 9.9 - 15.5 ] , - PDW* 10.4 [ 10 - 16.5 ] , - MPV 9.7 [ 6.5 - 14.0 ]				
11.06.2020				
Covid-19 (SARS-CoV-2) - Nedetectabil [ Nedetectabil - ]				
12.06.2020				
Covid-19 (SARS-CoV-2) - Nedetectabil [ Nedetectabil - ]				
25.05.2020				
<b>APTT</b> - APTT (sec) 22.4 [ 22.1 - 28.1 ] , - APTT (%) [ - ], <b>Creatinina</b> - 0.59 [ 0.5 - 0.9 ],				
Glicemie - 90 [ 70 - 105 ], GOT - 24 [ 0 - 35 ], GPT - 25 [ 0 - 35 ], Hemoleucograma				
<b>completa</b> - Leucocite 6.45 [ 3.9 - 11.1 ] , - Hematii 5.12 [ 3.88 - 4.99 ] , - Hemoglobina 12.3 [ 11.5 - 15.4 ] , - Hematocrit 38.8 [ 36.0 - 48.0 ] , - VEM 75.8 [ 81.0 - 99.0 ] , - HEM 24.0 [ 25.0 -				

33.0], - CHEM 31.7 [ 31.6 - 35.8 ], - Trombocite 452 [ 150 - 450 ], - NEUT% 55.6 [ 40 - 70 ], - LYMPH% 31.3 [ 20 - 40 ], - MONO% 12.1 [ 3.0 - 10.0 ], - EO% 0.5 [ 0 - 5 ], - BASO% 0.5 [ 0 - 2 ], - NEUT# 3.59 [ 1.8 - 7.4 ], - LYMPH# 2.02 [ 1.1 - 3.5 ], - MONO# 0.78 [ 0.21 - 0.92 ], - EO# 0.03 [ 0.00 - 0.67 ], - BASO# 0.03 [ 0 - 0.13 ], - RDW-CV 14.5 [ 9.9 - 15.5 ], - PDW\* 11.3 [ 10 - 16.5 ], - MPV 10.1 [ 6.5 - 14.0 ], **LDH** - 291 [ 0 - 250 ], **Proteina C reactiva** - 0.30 [ 0 - 1 ], **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 9.9 [ 9.4 - 13.6 ], - PT (%) (plasma) 130.0 [ 70 - 130 ], - INR (plasma) 0.85 [ 0.8 - 1.2 ], **Uree** - 21 [ 0 - 50 ], **VSH** - 13 [ 1 - 20 ]

Exame	ne paraclinice:
EKG	
ECO	
Rx	
	T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 26.05.2020RGR PULM D=7.6 Gym2Cord, aorta radiologic normale.Fara leziuni infiltrative sau focale pulmonare. SCD libere
Altele	

#### Tratament efectuat

ALGOZONE 500MG X 20 CPR LABORMED  $\parallel$  CEFUROXIMA 500MGX10CPR.FILM.(AUROBINDO)  $\parallel$  DICLOFENAC TIS 10MG/G,GEL X50G  $\parallel$  PARACETAMOL 500MG - MAGISTRA  $\parallel$  VITAMINA C 1000mg\*30cpr BERES

## Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

#### **EPICRIZA**

Pacienta in varsta de 25 de ani, cunoscuta cu o formatiune tumorala benigna parotidiana dreapta (diagnosticata in urma cu 1 an), se transfera in serviciul nostru din Compartimentul de Chirurgie BMF I al SCJU-CJ, cu diagnosticul de COVID-19 confirmat prin RT-PCR SARS-COV-2 in 25.05.2020. Mentionam ca pacienta era programata pentru interventie chirurgicala in scop curativ pentru tumora parotidiana, iar in urma testului screening a fost diagnosticata cu COVID-19.

Din ancheta epidemiologica retinem ca pacienta nu a vizitat unitati sanitare, nu a intrat in contact cu persoana cu IACRS sau cu caz confirmat COVID-19 in perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor, nu a calatorit in strainatate cu 14 zile anterior testarii pozitive cu COVID 19.

Este transferata in serviciul nostru pentru investigatii si tratament de specialitate.

Obiectiv la internare: starea generala buna, afebrila, constienta, cooperanta, orientata temporo-spatial, cu obezitate grad 1 (IMC=31kg/m2), stabila hemodinamic si respirator (TA=140/80 mmHg, AV=91/min, SaO2 =99% in aa), tegumente normal colorate,la nivelui unghiului mandibular dreptform tu. dura la palpare de aprox 1cm diametru, auscultatoric pulmonar: murmur vezicular fiziologic

form tu. dura la palpare de aprox 1cm diametru, auscultatoric pulmonar: murmur vezicular fiziologic prezent bilateral, fara raluri supraadaugate, auscultatie cardiaca: zgomote cardiace ritmice, bine batute, fara sufluri patologice, abdomen liber, fara sensibilitate la palpare, tranzit intestinal prezent, Giordano negativ bilateral, mictiuni fiziologice exteriorizate spontan, fara semne de iritatie meningeana, fara semne de focar neurologic.

Biologic: policitemie usoara, trombocitoza usoara, LDH reactionat.

Radiografia pulmonara (26.05.2020) evidentiaza: cord, aorta radiologic normale; fara leziuni infiltrative sau focale pulmonare; SCD libere.

PCR SARS-COV2 (04.06.2020): DETECTABIL PCR SARS-COV2 (08.06.2020): DETECTABIL PCR SARS-COV2 (12.06.2020): NEDETECTABIL PCR SARS-COV2 (13.06.2020): NEDETECTABIL

Pe parcursul internarii pacienta, a fost izolata, a urmat tratament simptomatic cu Paracetamol si Vitamina C.

Se externeaza in afebrilitate, stabila hemodinamic si respirator, cu recomandarile:

### **Tratament recomandat**

#### - RELUARE CONSULT BMF

#### Recomandari la externare:

Dupce ajungeacasse recomandefectuarea duhainele cu care aplecat acasse vor pune sac de gunoi (fa fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-afolosit spital) se vor psac loc separat (balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spla made sphaine (la cea mai mare temperaturpermisde produccu dezinfectant pentru haine culterior. Se vor folosi mpentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate v vesppe mcu apsTelefonul, ceasul alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu impregnate cu alcool.

Ce mde igienindividualtrebuie srespecte persoanele izolate la domiciliu? # Sevite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuindaceste posibil, sse izoleze camerseparatcu baie separat

Dacse foloseaceeabaie, aceasta va fi dezinfectatdupfolosire, se va dezinfecta toaleta toate obiectele atinse (inclusiv clanDezinfectarea se va face cu solupe bazde clor (Domestos) sau alcool (min 70 %).

# Snu primeascvizitatori perioada de autoizolare la domiciliu.

plastic, dupcare se spalpe mcu apstimp de 20 de secunde.

# Sse spele pe mcu apstimp de cel pu20 de secunde, ori de cori este necesar (duputilizarea toaletei, pregmesei, etc).

# Scursdezinfecteze zilnic toate suprafepe care le atinge frecvent (ex: mese, clan obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuvetalte obiecte care pot fi atinse de alte persoane). Sacopere gura nasul cu de unicfolosinsau cu o atunci estr sau tusstrstuplica cotului. Batista se aruncimediat la gunoi, sac de

# Spoarte masccse cu alte persoane.

Purtarea meste una dintre mde prevenire limitare pentru ranumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinatde noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei m nu este suficientpentru a asigura un nivel adecvat de protecar trebui adoptate alte mla fel de relevante. Folosirea mtrebuie combinatcu igiena adecvata mcu alte mde prevenire control a transmiterii noului coronavirus de la om la om. # timpul utiliztrebuie sevitaatingerea m# smasca folosind tehnica adecvat(nu atingepartea din faci din spate), acurmatde sp IMEDIATa mcu aps# snu reutilizamde unicfolosinMasca se schimbla maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

## Indicatie pentru revenire la internare

Χ	Nu, nu este necesara rev	emrea pentru	internare

Nu nu osto nogosoro romaniros nontru internoro Se completează obligatoriu una din cele două informatii: - U S-a eliberat prescriptie medicală, caz în care se va înscrie seria si numarul acesteia - Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu a fost necesar - X Nu s-a eliberat prescriptie medicala Se completează obligatoriu una din cele două informatii: - S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria si numarul acestuia - Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar Nu s-a eliberat concediu medical la externare Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii:

- S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu

X Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar

Un exemplar se constituie scrisoare medicala si se inmaneaza in termen de 72 de ore medicului de familie.

\*conform contractului cadru/2014 - model scrisoare medicala/Bilet de iesire - anexa 43

Se completează obligatoriu una din cele două in  - S-a eliberat prescriptie medicală pentru d  - Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru nu a fost necesar	ispozitive medicale in ambulatoriu	deoarece
(cu viza Unitatii judetene de implementare a prograr	nului, pentru diabet)	
Unitate judeteana de diabet zaharat:		
Nr. inregistrare al asiguratului:		
Data 13.06.2020	•	
Sef sectie:	Medic curant:	Medic rezident:
Conf.Dr. LUPSE MIHAELA	BINDER ASTRID	
MEDIC PRIMAR		
Dr. MIHAELA LUPSE medic primar boli infectioase, competents ecografia cod 531011	Dr. A strid Blade	
Calea de transmitere: - prin asigurat - prin posta	. ,	

\*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;