

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105;

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web:

www.infectioasecluj.ro



BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca MUNTEANU DANIEL FLORIN, nascut la data de 25.02.1985, CNP/ cod unic de asigurare 1850225134149, Adresa: Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.BLD. N. TITULESCU Nr.10 Ap.19 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 31.07.2020 01:43 - 10.08.2020 15:20, FO: 18505 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE V-COPII si se externeaza: AMELIORAT

D:	4.º
Diag	nostice:

PNEUMONIE BILATERALA INFECTIE SARS COV 2 FORMA MEDIE **COVID 19, VIRUS IDENTIFICAT**

Motivele prezentarii
Anamneza
- factori de risc
Examen clinic
- general
- local
Examene de laborator:
05.08.2020
Calciu total - 9.19 [8.4 - 10.6], Creatinina - 0.82 [0.7 - 1.2], D-Dimeri - 0.19 [0 - 0.55],
Feritina - 168.8 [23.9 - 336.2], Glicemie - 79 [70 - 105], GOT - 102 [0 - 45], GPT - 165 [0
- 45], Hemoleucograma completa - Leucocite 4.8 [3.7 - 9.5] , - Hematii 5.21 [4.32 - 5.66] ,
- 43], Hemoeucograma completa - Leucoche 4.8 [3.7 - 9.5] , - Hemath 3.21 [4.32 - 3.00] , - Hemoglobina 16.1 [13.3 - 17.6] , - Hematocrit 46.9 [39.0 - 51.0] , - VEM 90.2 [82.0 - 98.0]
, - HEM 30.9 [25.0 - 33.0] , - CHEM 34.2 [31.6 - 35.8] , - RDW-CV% 12.2 [9.9 - 15.5] , -
Trombocite 222 [150 - 450] , - MPV 8.1 [6.5 - 14.0] , - NEUT% 47.25 [40 - 70] , -
LYMPH% 40.02 [20 - 40] , - MONO% 10.13 [3.0 - 10.0] , - EO% 2.36 [0 - 5] , - BASO%
0.24 [0 - 2] , - NEUT# 2.258 [1.5 - 6.6] , - LYMPH# 1.912 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.484 [
0.21 - 0.92] , - EO# 0.113 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.012 [0 - 0.13], K - 3.9 [3.5 - 5.1], LDH
- 181 [0 - 250], Magneziu - 1.87 [1.7 - 2.6], Na - 141 [136 - 146], Proteina C reactiva -
0.06 [0 - 1], Uree - 22 [0 - 50]
0.08 [0 - 1], Cree - 22 [0 - 30] 06.08.2020
Covid-19 (SARS-CoV-2) - Detectabil [Nedetectabil -], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG -
Nonreactiv (Index=0.558) [Index < 0.8 Nonreactiv>= $0.8 - < 1.2$ Incert $> =1.2$ Reactiv -],
Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Nonreactiv (Index=0.251) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 -
< 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -]
31.07.2020
APTT - APTT (sec) 23.6 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 0.82 [0.7 - 1.2],
D-Dimeri - 0.19 [0 - 0.55], Fibrinogen - 212 [180 - 400], Glicemie - 87 [70 - 105], GOT -
16 [0 - 45], GPT - 15 [0 - 45], Hemoleucograma completa - Leucocite 4.23 [3.7 - 9.5] , -
Hematii 4.80 [4.32 - 5.66], - Hemoglobina 15.2 [13.3 - 17.6], - Hematocrit 42.2 [39.0 - 51.0
], - VEM 87.9 [82.0 - 98.0], - HEM 31.7 [25.0 - 33.0], - CHEM 36.0 [31.6 - 35.8], -
Trombocite 193 [150 - 450] , - NEUT% 44.4 [40 - 70] , - LYMPH% 40.9 [20 - 40] , -

MONO% 12.3 [3.0 - 10.0] , - EO% 1.9 [0 - 5] , - BASO% 0.5 [0 - 2] , - NEUT# 1.88 [1.5 -

6.6], - LYMPH# 1.73 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.52 [0.21 - 0.92], - EO# 0.08 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.02 [0 - 0.13], - RDW-CV 11.3 [9.9 - 15.5], - PDW* 10.3 [10 - 16.5], - MPV 9.4 [6.5 - 14.0], **LDH** - 136 [0 - 250], **Proteina C reactiva** - 0.69 [0 - 1], **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 13.7 [9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 67.3 [70 - 130], - INR (plasma) 1.21 [0.8 - 1.2], **Uree** - 20 [0 - 50], **VSH** - 2 [1 - 15]

Examene paraclinice:				
EKG				
ECO				
Rx				
	T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 10.08.2020RG. PULMD=4.5 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr. T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 03.08.2020RGR.PULM.D=4.1 Gym2Fara leziuni active pleuro-pulmonare decelabile rgr.			
Altele				

Tratament efectuat

ACETILCISTEINA 200MG LAROPHARM \parallel ALGOZONE 500MG X 20 CPR LABORMED \parallel CEFUROXIMA 500MGX10CPR.FILM.(AUROBINDO) \parallel CLEXANE 6000UI (60MG)/ 0,6ML * 10 SER. PRE. \parallel KALETRA 200mg/50mg*120cpr.filmate \parallel PARACETAMOL 500MG ZENTIVA*20CPR \parallel PLAQUENIL 200MG*60 compr.film. \parallel VITAMINA C 1000mg*30cpr BERES

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacient in varsta de 35 de ani, fara antecedente patologice semnficative, se transfera din cadrul Spitalului Militar Cluj Napoca cu diagnosticul de COVID-19 forma medie, cu pneumonie bilaterala, cu rt PCR SARS CoV2 in 30.07 si aspect imagistic pe CT toracic cu o arie de sticla mata de 67/60/40 mm apico-dorsla la nivelul LSD si o arie cu caracteristici asemanatoare in LSS. Mentionam ca pacientul acuza din 28.07 cefalee, febra, , tuse seaca , mioartralgii.

Din ancheta epidemiologica retinem ca pacientul nu poate mentiona contactul cu un caz confirmat COVID-19.

Obiectiv la internare: pacient supraponderal, stare generala moderat influentata, afebril, echilibrat cardio-respirator si hemodinamic TA-114/72 mmHg, Av-14-16 res/min, steatacustic pulmonar fara raluri patologice, abdomen liber, tranzit intestinal si diureza fiziologice.

Biologic:(31.07.20) : limfomonocitoza, fara sindrom inflamator, fara afectare hepatica sau renala. (06.08.20): sindrom de hepatocitoliza,

Serologie Ac Ig M si IgG anti SARS COV 2 -NONREACTIVI

Radiografiile pulmonare de control (03.08.2020 si 10.08.20): fara leziuni patologice pleuro-pulmonare.

RT PCR SARS-COV 2 proba 1 (30.07.2020): DETECTABIL proba 2 (07.08.2020) : DETECTABIL

EKG din data de05.08.20 -fara modificari .

Se instituie conform protocolului national tratament cu Plaquenil 2*400 mg/zi in ziua 1 apoi 2*200 mg/zi inca 9 zile, antiviral cu Kaletra 2*2 tb/zi 10 zile, antibiotic po cu cefuroxim 2*500 mg/zi, anticoagulant profilactic, simptomatice la nevoie.

Evolutia clinica si paraclinica a fost favorabila.

Se externeaza ameliorat, echilibrat hemodinamic si respirator cu recomandari.

Tratament recomandat

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 se indica repaus la domicliu pe o perioada de 5 zile de la externare.

Acestia pot desfasura activitatile curente cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

- -in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii;
- -sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;
- -sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

S-a eliberat concediu medical pe perioada 31.07.20-14.08.20

Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domicliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteana. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

Indicatie pentru revenire la internare

X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare

Se completeazã obligatoriu una din cele douã informatii - S-a eliberat prescriptie medicalã, caz în care se v		
- Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu		
- X Nu s-a eliberat prescriptie medicala	a fost necesar	
Se completează obligatoriu una din cele două informatii	: <i>CCMAM 4945278</i>	
- X S-a eliberat concediu medical la externare, caz în		acestuia
- Nu s-a eliberat concediu medical la externare dec		acostala
- Nu s-a eliberat concediu medical la externare	sarece na a rost necesar	
Se completează obligatoriu una din cele două informatii	:	
- S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medical		u
- Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medi	_	
deoarece nu a fost necesar		•
Se completează obligatoriu una din cele două informatii	:	
- S-a eliberat prescriptie medicală pentru dispoziti	ve medicale in ambulatoriu	
- X Nu s-a eliberat prescriptie medicală pentru dispo		arece
nu a fost necesar		
(cu viza Unitatii judetene de implementare a programului, p	entru diabet)	
Unitate judeteana de diabet zaharat:		
Nr. inregistrare al asiguratului:		
Data 10.08.2020		
Sef sectie:	Medic curant:	Medic rezident:
Dr. IUBU ROXANA	Dr. MARCU CRISTIAN	
Medic primar	Medic primar	
Dr. ROXANA IUBU	Dr. MARCU CRISTIAN	
modic primar holt infectioase	medic primar	
medic specialist pediatrie	boli infectioase	
CDG DSTOC	1	
Calea de transmitere:	-	
- prin asigurat		
- prin posta		

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;