

## BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA \*)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca **CORMOS MARIUS-CLAUDIU**, nascut la data de **10.09.1988**, CNP / cod unic de asigurare **1880910125814**, Adresa: **Jud.CLUJ Loc.Cluj Napoca Str.BARSEI Nr.4 Ap.53** a fost internat in serviciul nostru in perioada: **10.07.2020 11:58 - 17.07.2020 15:07**, FO: **17313 F.O.** / nr. din Registrul de consultatii **BOLI INFECTIOASE V-COPII** si se externeaza: **VINDECAT**

### Diagnostic:

INFECTIE SARS COV-2, FORMA ASIMPTOMATICA  
COVID 19 VIRUS IDENTIFICAT  
APENDICITA FLEGMONOASA PERFORATA CU PERITONITA, OPERATA

### Motivale prezentarii

#### Anamneza

#### - factori de risc

#### Examen clinic

##### - general

##### - local

### Examen de laborator:

#### 10.07.2020

**APTT** - APTT (sec) 21.7 [ 22.1 - 28.1 ], - **APTT (%)** [ - ], **Calciu total** - 9.33 [ 8.4 - 10.6 ],  
**Creatinina** - 0.63 [ 0.7 - 1.2 ], **Feritina** - 263.5 [ 23.9 - 336.2 ], **Fibrinogen** - 673 [ 180 - 400 ],  
**Fier** - 31 [ 33 - 193 ], **Glicemie** - 101 [ 70 - 105 ], **GOT** - 15 [ 0 - 45 ], **GPT** - 18 [ 0 - 45 ],  
**Hemoleucograma completa** - Leucocite 6.2 [ 3.7 - 9.5 ], - Hematii 4.32 [ 4.32 - 5.66 ], -  
Hemoglobina 12.9 [ 13.3 - 17.6 ], - Hematocrit 37.3 [ 39.0 - 51.0 ], - VEM 86.3 [ 82.0 - 98.0 ],  
- HEM 29.8 [ 25.0 - 33.0 ], - CHEM 34.5 [ 31.6 - 35.8 ], - RDW-CV% 13.3 [ 9.9 - 15.5 ], -  
Trombocite 223 [ 150 - 450 ], - MPV 7.3 [ 6.5 - 14.0 ], - NEUT% 75.53 [ 40 - 70 ], -  
LYMPH% 11.09 [ 20 - 40 ], - MONO% 10.23 [ 3.0 - 10.0 ], - EO% 2.87 [ 0 - 5 ], - BASO%  
0.28 [ 0 - 2 ], - NEUT# 4.663 [ 1.5 - 6.6 ], - LYMPH# 0.685 [ 1.1 - 3.5 ], - MONO# 0.632 [ 0.21 - 0.92 ], - EO# 0.177 [ 0.00 - 0.67 ], - BASO# 0.017 [ 0 - 0.13 ], **K** - 3.8 [ 3.5 - 5.1 ], **LDH**  
- 127 [ 0 - 250 ], **Magneziu** - 1.94 [ 1.7 - 2.6 ], **Na** - 143 [ 136 - 146 ], **Proteina C reactiva** -  
9.40 [ 0 - 1 ], **Timp de protrombina** - PT (sec) (plasma) 11.9 [ 9.4 - 13.6 ], - PT (%) (plasma)  
91.8 [ 70 - 130 ], - INR (plasma) 1.03 [ 0.8 - 1.2 ], **Trigliceride** - 98 [ 0 - 150 ], **Uree** - 28 [ 0 - 50 ], **VSH** - 49 [ 1 - 15 ], **D-Dimeri** - 2.31 [ 0 - 0.55 ]

#### 13.07.2020

**Creatinina** - 0.64 [ 0.7 - 1.2 ], **Feritina** - 194.5 [ 23.9 - 336.2 ], **Fier** - 19 [ 33 - 193 ], **GOT** - 14 [ 0 - 45 ], **GPT** - 23 [ 0 - 45 ], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 7.5 [ 3.7 - 9.5 ], -  
Hematii 4.34 [ 4.32 - 5.66 ], - Hemoglobina 13.0 [ 13.3 - 17.6 ], - Hematocrit 37.2 [ 39.0 - 51.0 ], -  
VEM 85.8 [ 82.0 - 98.0 ], - HEM 29.9 [ 25.0 - 33.0 ], - CHEM 34.9 [ 31.6 - 35.8 ], -  
RDW-CV% 13.3 [ 9.9 - 15.5 ], - Trombocite 299 [ 150 - 450 ], - MPV 7.4 [ 6.5 - 14.0 ], -  
NEUT% 73.59 [ 40 - 70 ], - LYMPH% 11.21 [ 20 - 40 ], - MONO% 13.18 [ 3.0 - 10.0 ], -  
EO% 1.48 [ 0 - 5 ], - BASO% 0.54 [ 0 - 2 ], - NEUT# 5.543 [ 1.5 - 6.6 ], - LYMPH# 0.845 [ 1.1 - 3.5 ], - MONO# 0.992 [ 0.21 - 0.92 ], - EO# 0.111 [ 0.00 - 0.67 ], - BASO# 0.040 [ 0 - 0.13 ], **K** - 4.1 [ 3.5 - 5.1 ], **LDH** - 143 [ 0 - 250 ], **Na** - 141 [ 136 - 146 ], **Proteina C reactiva** -  
3.43 [ 0 - 1 ], **Uree** - 22 [ 0 - 50 ], **D-Dimeri** - 4.39 [ 0 - 0.55 ]

**14.07.2020**

**Covid-19 (SARS-CoV-2) - Nedetectabil [ Nedetectabil - ]**

**16.07.2020**

**Creatinina** - 0.69 [ 0.7 - 1.2 ], **Feritina** - 244.1 [ 23.9 - 336.2 ], **Fier** - 30 [ 33 - 193 ], **GOT** - 31 [ 0 - 45 ], **GPT** - 62 [ 0 - 45 ], **Hemoleucograma completa** - Leucocite 6.3 [ 3.7 - 9.5 ], - Hematii 4.23 [ 4.32 - 5.66 ], - Hemoglobina 12.4 [ 13.3 - 17.6 ], - Hematocrit 36.4 [ 39.0 - 51.0 ], - VEM 86.0 [ 82.0 - 98.0 ], - HEM 29.3 [ 25.0 - 33.0 ], - CHEM 34.1 [ 31.6 - 35.8 ], - RDW-CV% 13.3 [ 9.9 - 15.5 ], - Trombocite 339 [ 150 - 450 ], - MPV 7.4 [ 6.5 - 14.0 ], - NEUT% 68.96 [ 40 - 70 ], - LYMPH% 15.31 [ 20 - 40 ], - MONO% 13.40 [ 3.0 - 10.0 ], - EO% 2.02 [ 0 - 5 ], - BASO% 0.31 [ 0 - 2 ], - NEUT# 4.323 [ 1.5 - 6.6 ], - LYMPH# 0.960 [ 1.1 - 3.5 ], - MONO# 0.840 [ 0.21 - 0.92 ], - EO# 0.127 [ 0.00 - 0.67 ], - BASO# 0.019 [ 0 - 0.13 ], **K** - 4.5 [ 3.5 - 5.1 ], **LDH** - 180 [ 0 - 250 ], **Na** - 140 [ 136 - 146 ], **Proteina C reactiva** - 5.85 [ 0 - 1 ], **Uree** - 27 [ 0 - 50 ], **D-Dimeri** - 3.91 [ 0 - 0.55 ], **Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG** - Nonreactiv (Index=0.584) [ Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert >= 1.2 Reactiv - ], **Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM** - Nonreactiv (Index=0.416) [ Index < 0.8 Nonreactiv >= 0.8 - < 1.2 Incert >= 1.2 Reactiv - ]

---

#### Examen paraclinice:

**EKG**

**ECO**

**Rx**

T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 10.07.2020RGR PULM D= 4.2 Gym2Cord, aorta radiologic normale.Fara focare de condensare pulmonara. SCD libere. || T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 14.07.2020RGR.PULM.D= 4Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare vizibile rgr. || T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 16.07.2020RG PULM D=3.8 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr.

**Altele**

---

#### Tratament efectuat

ALGOZONE 500MG X 20 CPR LABORMED || AMPIPLUS 1.5G\*50FL [ANT] || AMPIPLUS 1000MG/500MG \* 25FL || APA OXIGENATA 3%-200ML \*ADYA || BANEONIN PUDRA 10G || BRUFEN 400MG X30CPR.FILMATE || DALACIN C 300MG CLINDAMICINA || DIAZEPAM 10MG\*20cpr GEDEON R. || IBUPROFEN 400MG- PADUDEN FORTE || IODOMED 10%\*SOL.DEZ. || KALETRA 200mg/50mg\*120cpr.filmate || MYDOCALM 150 MG\*30CPR || PARACETAMOL 500MG ZENTIVA\*20CPR || REFFLOR FORTE ADULTI \* 10 CPS || RIVANOL 0.1%... -200ml Vitalia || SER FIZIOLOGIC 0.9% - 100ML

#### Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului:

##### EPICRIZA

Pacient in varsta de 31 ani, fara APP semnificative, se transfera in Clinica noastra via IRGH, in data de 10.07.20 cu diagnosticul de COVID-19, apendicita flegmonoasa perforata, cu peritonita, operata 06.07. In perioada 06.07.20-10.07.20 a fost internat pe sectia de chirurgie, unde s-a efectuat apendicectomie laparoscopica si lavajul si drenajul cavitatii peritoneale. Ulterior pacientul a fost testat ptr COVID-19, iar rezultatul fiind pozitiv si evolutia postchirurgicala buna, este transferat in Clinica noastra pentru investigatii si tratament de specialitate. Mentionez ca pacientul este asimptomatic.

Din ancheta epidemiologica, retinem ca este nevaccinat antigripal, nu a avut contact cu persoane cu infectii respiratorii, nu a intrat in contact cu persoane suspecte sau confirmate cu COVID 19, a vizitat unitati sanitare cu 14 zile anterioare debutului bolii.

Obiectiv la internare: stare generala buna, afebril, prezinta 3 plagi postchirurgicale la nivelul ombilicului , subombilical si in hipocondru drept (plagi posttrocure), una din plagi cu secretie sero-sangvinolenta, MV prezent, fara raluri supraadaugate, SaO2=98% in aa, zgomote cardiace ritmice, bine batute, fara sufluri supraadaugate, TA=140/90mmHg, AV=80 b/min, abdomen elastic, liber la palpare, nedureros, tranzit intestinal prezent pentru materii fecale si gaze, diureza prezenta. fara semne de iritatie meningeana sau de focar neurologic.

Biologic : -(10.07.20): limfopenie usoara, usoara monocitoza, usor sindrom anemic, fier scazut, sindrom inflamator( CRP=9.4 mg/dl, fibrinogen crescut, VSH crescut), D-dimeri crescuti, feritina in limite normale.

Radiografia pulmonara(10.07, 16.07.20); nu evidentiaza modificari active pleuropulmonare.

In data de 14.07.2020, pacientul acuza o nevralgie intercostala bazal dreapta, ce iradiază in inspir pana la nivelul umarului, pentru care se completeaza schema de tratament cu antiinflamatoare nesteroidiene, sustine ca somnul este neodihnitor si agitat in ultimele nopti si se decide administrarea de Benzodiazepina in doza minima. Pacientul a avut o evolutie favorabila pe parcursul noptii ulterioare, somn linistit si odihnitor, nevralgie in remisie.

15.07.2020- PCR SARS COV-2 NEDETECTABIL

Serologie: Ac anti-SARS-COV-2 - IgM- NONREACTIV

- IgG- NONREACTIV

Pe parcursul internarii, pacientul a fost izolat, a urmat tratament cu Ampplus 12 g/zi,(timp de 5 zile), Kaletra 400 mg/zi,( timp de 3 zile), probiotic, antialgice la nevoie, s-a efectuat toaleta plagilor chirurgicale si suprimarea firelor de sutura in 16.07.2020, cu evolutie favorabila.Probele de control din 17.07 releva mentinerea sindromului inflamator moderat si a D-dimerilor crescuti cu hemoleucograma normala.

Se externeaza afebril, apetent, vindecat, cu stare generala buna, stabil hemodinamic si respirator cu urmatoarele recomandari:

#### **Tratament recomandat**

1. repaus la domiciliu inca cel putin 4 zile
- 2.concediu medical inca 4 zile pentru COVID-19, eventual prelungirea concediului medical prin medicul de familie pentru recuperarea post-peritonita
3. consult de control in IRGH in cazul reaparitiei febrei sau simptomatologiei abdominale
4. Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mci apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat :

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranută sau tuseste,sau sa stranută si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane si in spatii inchise. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii; sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

**Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate**

**Indicatie pentru revenire la internare**

X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescripție medicală, caz în care se va înscrie seria și numărul acesteia
- ☐ Nu s-a eliberat prescripție medicală deoarece nu a fost necesar
- ☒ Nu s-a eliberat prescripție medicală

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

CCMAM 4169924

- ☒ S-a eliberat concediu medical la externare, caz în care se va înscrie seria și numărul acestuia
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare deoarece nu a fost necesar
- ☐ Nu s-a eliberat concediu medical la externare

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu
- ☒ Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu, deoarece nu a fost necesar

Se completează obligatoriu una din cele două informatii:

- ☐ S-a eliberat prescripție medicală pentru dispozitive medicale în ambulatoriu
- ☒ Nu s-a eliberat prescripție medicală pentru dispozitive medicale în ambulatoriu deoarece nu a fost necesar

(cu viza Unității județene de implementare a programului, pentru diabet)

Unitate județeană de diabet zaharat:	
Nr. înregistrare al asiguratului:	

Data 17.07.2020

**Sef sectie:**

**Dr. IUBU ROXANA**

**Medic primar**

Dr. ROXANA IUBU  
medic primar boli infectioase  
medic specialist pediatrie  
cod D51627

**Medic curant:**

**Dr. MARCU CRISTIAN**

**Medic primar**

Dr. MARCU CRISTIAN  
medic primar  
boli infectioase  
647932

**Medic rezident:**

Calea de transmitere:

- prin asigurat
- prin posta .....

\*) Scrisoarea medicală se întocmește în două exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultația/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicală sau biletul de ieșire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externării, într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;