

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca Str. Iuliu Moldovan Nr. 23, 400348 Tel: +40-264-594655/565758; 593105. Fax: +40-264-593105; E-mail: infectioaseci@vahoo.com_web:

E-mail: infectioasecj@yahoo.com web: www.infectioasecluj.ro



BILET DE EXTERNARE / SCRISOARE MEDICALA *)

Stimate(a) coleg(a), va informam ca MUSCAN MIHAI , nascut la data de 08.03.1992, CNP / cod unic de asigurare 1920308314023 , Adresa: Jud.SALAJ Loc.Zalau Str.MARGARETELOR Nr.27 a fost internat in serviciul nostru in perioada: 27.07.2020 11:27 - 29.07.2020 13:53, FO: 18307 F.O. / nr. din Registrul de consultatii BOLI INFECTIOASE II-ADULTI si se externeaza: STATIONAR

Diagnostice:

INFECTIE COVID-19.FORMA ASIMPTOMATICA

Examene de laborator: 27.07.2020 APTT - APTT (sec) 19.5 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 1.05 [0.7 - 1.2], D-Dimeri - 0.37 [0 - 0.55], Feritina - 184.4 [23.9 - 336.2], Fibrinogen - 212 [180 - 400], Glicemie - 99 [70 - 105], GOT - 23 [0 - 45], GPT - 44 [0 - 45], Hemoleucograma completa - Leucocite 6.1 [3.7 - 9.5] , - Hematii 4.65 [4.32 - 5.66] , - Hemoglobina 14.4 [13.3 - 17.6] , - Hematocrit 40.8 [39.0 - 51.0] , - VEM 87.6 [82.0 - 98.0] , - HEM 30.9 [25.0 - 33.0] , - CHEM 35.3 [31.6 - 35.8] , - RDW-CV% 12.8 [9.9 - 15.5] , - Trombocite 203 [150 - 450] , - MPY 7.6 [6.5 - 14.0] , - NEUT% 70.79 [40 - 70] , - LYMPH% 20.61 [20 - 40] , - MONO% 7.67 [3.0 - 10.0] , - EO% 0.60 [0 - 5] , - BASO% 0.33 [0 - 2] , - NEUT# 4.307 [1.5 - 6.6] , - LYMPH# 1.254 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.467 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.037 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.020 [0 - 0.13], LDH - 176 [0 - 250], Proteina C reactiva - 0.26 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.1 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) 107.5 [70 - 130] , - INR (plasma) 0.97 [0.8 - 1.2], Urce - 33 [0 - 50], VSH - 3 [1 - 15] 29.07.2020 Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG - Nonreactiv (Index=0.564) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > = 1.2 Reactiv -], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Nonreactiv (Index=0.342) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > = 1.2 Reactiv -]. Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Nonreactiv (Index=0.342) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > = 1.2 Reactiv -].	Motive	Aotivele prezentarii			
Examene de laborator: 27.07.2020 APTT - APTT (sec) 19.5 [22.1 - 28.1], - APTT (%) [-], Creatinina - 1.05 [0.7 - 1.2], D-Dimeri - 0.37 [0 - 0.55], Fertitina - 184.4 [23.9 - 336.2], Fibrinogen - 212 [180 - 400], Glicemie - 99 [70 - 105], GOT - 23 [0 - 45], GPT - 44 [0 - 45], Hemoleucograma completa - Leucocite 6.1 [3.7 - 9.5], - Hematii 4.65 [4.32 - 5.66], - Hemoglobina 14.4 [13.3 - 17.6], - Hematocrit 40.8 [39.0 - 51.0], - VEM 87.6 [82.0 - 98.0], - HEM 30.9 [25.0 - 33.0], - CHEM 35.3 [31.6 - 35.8], - RDW-CV% 12.8 [9.9 - 15.5], - Trombocite 203 [150 - 450], - MPV 7.6 [6.5 - 14.0], - NEUT% 70.79 [40 - 70], - LYMPH% 20.61 [20 - 40], - MONO% 7.67 [3.0 - 10.0], - EO% 0.60 [0 - 5], - BASO% 0.33 [0 - 2], - NEUT# 4.307 [1.5 - 6.6], - LYMPH# 1.254 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.467 [0.21 - 0.92], - EO# 0.037 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.020 [0 - 0.13], LDH - 176 [0 - 250], Proteina C reactiva - 0.26 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.1 [9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 107.5 [70 - 130], - INR (plasma) 0.97 [0.8 - 1.2], Uree - 33 [0 - 50], VSH - 3 [1 - 15] 29.07.2020 Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG - Nonreactiv (Index=0.564) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert >= 1.2 Reactiv -]. Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Nonreactiv (Index=0.342) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert >= 1.2 Reactiv -]. Examene paraclinice: EKG ECO Rx T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 27.07.2020RG, PULMD=3.7 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr.Cord de aspect rgr.normal.	Anamı	neza			
Examene de laborator: 27.07.2020 APTT - APTT (sec) 19.5 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 1.05 [0.7 - 1.2], D-Dimeri - 0.37 [0 - 0.55], Feritina - 184.4 [23.9 - 336.2], Fibrinogen - 212 [180 - 400], Glicemie - 99 [70 - 105], GOT - 23 [0 - 45], GPT - 44 [0 - 45], Hemoleucograma completa - Leucocite 6.1 [3.7 - 9.5], - Hematil +65 [4.32 - 5.66] , - Hemolglobina 14.4 [13.3 - 17.6] , - Hematocrit 40.8 [39.0 - 51.0] , - VEM 87.6 [82.0 - 98.0] , - HEM 30.9 [25.0 - 33.0] , - CHEM 35.3 [31.6 - 35.8] , - RDW-CV% 12.8 [9.9 - 15.5] , - Trombocite 203 [150 - 450] , - MPV 7.6 [6.5 - 14.0] , - NEUT% 70.79 [40 - 70] , - LYMPH% 20.61 [20 - 40] , - MONO% 7.67 [3.0 - 10.0] , - E0% 0.60 [0 - 5] , - BASO% 0.33 [0 - 2] , - NEUT# 4.307 [1.5 - 6.6] , - LYMPH# 1.254 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.467 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.037 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.020 [0 - 0.13] , LDH - 176 [0 - 250], Proteina C reactiva - 0.26 [0 - 1] , Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.1 [9.4 + 13.6] , - PT (%) (plasma) 107.5 [70 - 130] , - INR (plasma) 0.97 [0.8 - 1.2], Uree - 33 [0 - 50], VSH - 3 [1 - 15] 29.07.2020 Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG - Nonreactiv (Index=0.564) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > = 1.2 Reactiv -] Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > = 1.2 Reactiv -] Examene paraclinice: EKG ECCO Rx T03501 - radiografia toracica - Rezultat: 27.07.2020RG. PULMD=3.7 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr.Cord de aspect rgr.normal.	factor	i de risc			
Examene de laborator: 27.07.2020 APTT - APTT (sec) 19.5 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 1.05 [0.7 - 1.2], D-Dimeri - 0.37 [0 - 0.55], Feritina - 184.4 [23.9 - 336.2], Fibrinogen - 212 [180 - 400], Glicemie - 99 [70 - 105], GOT - 23 [0 - 45], GPT - 44 [0 - 45], Hemoleucograma completa - Leucocite 6.1 [3.7 - 9.5] , - Hematii 4.65 [4.32 - 5.66] , - Hemoglobina 14.4 [13.3 - 17.6] , - Hematocrit 40.8 [39.0 - 51.0] , - VEM 87.6 [82.0 - 98.0] , - HEM 30.9 [25.0 - 33.0] , - CHEM 35.3 [31.6 - 35.8] , - RDW-CV% 12.8 [9.9 - 15.5] , - Trombocite 203 [150 - 450] , - MPV 7.6 [6.5 - 14.0] , - NEUT% 70.79 [40 - 70] , - LYMPH% 20.61 [20 - 40] , - MONO% 7.67 [3.0 - 10.0] , - EO% 0.60 [0 - 5] , - BASO% 0.33 [0 - 2] , - NEUT# 4.307 [1.5 - 6.6] , - LYMPH# 1.254 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.467 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.037 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.020 [0 - 0.13] , LDH - 176 [0 - 250] , Proteina C reactiva - 0.26 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.1 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) 107.5 [70 - 130] , - INR (plasma) 0.97 [0.8 - 1.2] , Uree - 33 [0 - 50] , VSH - 3 [1 - 15] 29.07.2020 Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG - Nonreactiv (Index=0.564) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > = 1.2 Reactiv -] , Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Nonreactiv (Index=0.342) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > = 1.2 Reactiv -] . Reactiv -] . Reactiv - [1.2 Reactiv -] . Reactiv - [1.3 Reactiv - 2.2 Reactiv -] . Reactiv - [2.3 Reactiv - 2.3 Reactiv - 3.4 Reactiv - 3.					
27.07.2020 APTT - APTT (sec) 19.5 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 1.05 [0.7 - 1.2], D-Dimeri - 0.37 [0 - 0.55], Feritina - 184.4 [23.9 - 336.2], Fibrinogen - 212 [180 - 400], Glicemie - 99 [70 - 105], GOT - 23 [0 - 45], GPT - 44 [0 - 45], Hemoleucograma completa - Leucocite 6.1 [3.7 - 9.5], - Hematii 4.65 [4.32 - 5.66], - Hemoglobina 14.4 [13.3 - 17.6], - Hematocrit 40.8 [39.0 - 51.0], - VEM 87.6 [82.0 - 98.0], - HEM 30.9 [25.0 - 33.0], - CHEM 35.3 [31.6 - 35.8], - RDW-CV% 12.8 [9.9 - 15.5], - Trombocite 203 [150 - 450], - MPV 7.6 [6.5 - 14.0], - NEUT% 70.79 [40 - 70], - LYMPH% 20.61 [20 - 40], - MONO% 7.67 [3.0 - 10.0], - EO% 0.60 [0 - 5], - BASO% 0.33 [0 - 2], - NEUT# 4.307 [1.5 - 6.6], - LYMPH# 1.254 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.467 [0.21 - 0.92], - EO# 0.037 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.020 [0 - 0.13], LDH - 176 [0 - 250], Proteina C reactiva - 0.26 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.1 [9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 107.5 [70 - 130], - INR (plasma) 0.97 [0.8 - 1.2], Uree - 33 [0 - 50], VSH - 3 [1 - 15] 29.07.2020 Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG - Nonreactiv (Index=0.564) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > = 1.2 Reactiv -], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Nonreactiv (Index=0.342) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > = 1.2 Reactiv -]. Reactiv -] Examene paraclinice: EKG ECO Rx T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 27.07.2020RG. PULM-D=3.7 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr.Cord de aspect rgr.normal.	- local				
APTT - APTT (sec) 19.5 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 1.05 [0.7 - 1.2], D-Dimeri - 0.37 [0 - 0.55], Feritina - 184.4 [23.9 - 336.2], Fibrinogen - 212 [180 - 400], Glicemie - 99 [70 - 105], GOT - 23 [0 - 45], GPT - 44 [0 - 45], Hemoleucograma completa - Leucocite 6.1 [3.7 - 9.5] , - Hematii 4.65 [4.32 - 5.66] , - Hemoglobina 14.4 [13.3 - 17.6] , - Hematocrit 40.8 [39.0 - 51.0] , - VEM 87.6 [82.0 - 98.0] , - HEM 30.9 [25.0 - 33.0] , - CHEM 35.3 [31.6 - 35.8] , - RDW-CV% 12.8 [9.9 - 15.5] , - Trombocite 203 [150 - 450] , - MPV 7.6 [6.5 - 14.0] , - NEUT% 70.79 [40 - 70] , - LYMPH% 20.61 [20 - 40] , - MONO% 7.67 [3.0 - 10.0] , - EO% 0.60 [0 - 5] , - BASO% 0.33 [0 - 2] , - NEUT# 4.307 [1.5 - 6.6] , - LYMPH# 1.254 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.467 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.037 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.020 [0 - 0.13], LDH - 176 [0 - 250], Proteina C reactiva - 0.26 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.1 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) 107.5 [70 - 130] , - INR (plasma) 0.97 [0.8 - 1.2], Uree - 33 [0 - 50], VSH - 3 [1 - 15] 29.07.2020 Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG - Nonreactiv (Index=0.564) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > = 1.2 Reactiv -], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Nonreactiv (Index=0.342) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > = 1.2 Reactiv -] Examene paraclinice: EKG ECO Rx T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 27.07.2020RG. PULMD=3.7 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr.Cord de aspect rgr.normal.	Exame	ene de laborator:			
D-Dimeri - 0.37 [0 - 0.55], Feritina - 184.4 [23.9 - 336.2], Fibrinogen - 212 [180 - 400], Glicemie - 99 [70 - 105], GOT - 23 [0 - 45], GPT - 44 [0 - 45], Hemoleucograma completa - Leucocite 6.1 [3.7 - 9.5], - Hematii 4.65 [4.32 - 5.66], - Hemoglobina 14.4 [13.3 - 17.6], - Hematocrit 40.8 [39.0 - 51.0], - VEM 87.6 [82.0 - 98.0], - HEM 30.9 [25.0 - 33.0], - CHEM 35.3 [31.6 - 35.8], - RDW-CV% 12.8 [9.9 - 15.5], - Trombocite 203 [150 - 450], - MPV 7.6 [6.5 - 14.0], - NEUT% 70.79 [40 - 70], - LYMPH% 20.61 [20 - 40], - MONO% 7.67 [3.0 - 10.0], - EO% 0.60 [0 - 5], - BASO% 0.33 [0 - 2], - NEUT# 4.307 [1.5 - 6.6], - LYMPH# 1.254 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.467 [0.21 - 0.92], - EO# 0.037 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.020 [0 - 0.13], LDH - 176 [0 - 250], Proteina C reactiva - 0.26 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.1 [9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 107.5 [70 - 130], - INR (plasma) 0.97 [0.8 - 1.2], Uree - 33 [0 - 50], VSH - 3 [1 - 15] 29.07.2020 Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG - Nonreactiv (Index=0.564) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Nonreactiv (Index=0.342) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -] . Reactiv -] Examene paraclinice: EKG ECO Rx T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 27.07.2020RG. PULMD=3.7 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr.Cord de aspect rgr.normal.		27.07.2020			
Glicemie - 99 [70 - 105], GOT - 23 [0 - 45], GPT - 44 [0 - 45], Hemoleucograma completa - Leucocite 6.1 [3.7 - 9.5], - Hematii 4.65 [4.32 - 5.66], - Hemoglobina 14.4 [13.3 - 17.6], - Hematocrit 40.8 [39.0 - 51.0], - VEM 87.6 [82.0 - 98.0], - HEM 30.9 [25.0 - 33.0], - CHEM 35.3 [31.6 - 35.8], - RDW-CV% 12.8 [9.9 - 15.5], - Trombocite 203 [150 - 450], - MPV 7.6 [6.5 - 14.0], - NEUT% 70.79 [40 - 70], - LYMPH% 20.61 [20 - 40], - MONO% 7.67 [3.0 - 10.0], - EO% 0.60 [0 - 5], - BASO% 0.33 [0 - 2], - NEUT# 4.307 [1.5 - 6.6], - LYMPH# 1.254 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.467 [0.21 - 0.92], - EUT# 4.307 [1.5 - 6.6], - LYMPH# 1.254 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.467 [0.21 - 0.92], - FUP 0.037 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.020 [0 - 0.13], LDH - 176 [0 - 250], Proteina C reactiva - 0.26 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.1 [9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 107.5 [70 - 130], - INR (plasma) 0.97 [0.8 - 1.2], Uree - 33 [0 - 50], VSH - 3 [1 - 15] 29.07.2020 Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG - Nonreactiv (Index=0.564) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Nonreactiv (Index=0.342) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -] Examene paraclinice: EKG ECO Rx T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 27.07.2020RG. PULMD=3.7 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr.Cord de aspect rgr.normal.		APTT - APTT (sec) 19.5 [22.1 - 28.1] , - APTT (%) [-], Creatinina - 1.05 [0.7 - 1.2],			
completa - Leucocite 6.1 [3.7 - 9.5] , - Hematii 4.65 [4.32 - 5.66] , - Hemoglobina 14.4 [13.3 - 17.6] , - Hematocrit 40.8 [39.0 - 51.0] , - VEM 87.6 [82.0 - 98.0] , - HEM 30.9 [25.0 - 33.0] , - CHEM 35.3 [31.6 - 35.8] , - RDW-CV% 12.8 [9.9 - 15.5] , - Trombocite 203 [150 - 450] , - MPV 7.6 [6.5 - 14.0] , - NEUT% 70.79 [40 - 70] , - LYMPH% 20.61 [20 - 40] , - MONO% 7.67 [3.0 - 10.0] , - EO% 0.60 [0 - 5] , - BASO% 0.33 [0 - 2] , - NEUT# 4.307 [1.5 - 6.6] , - LYMPH# 1.254 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.467 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.037 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.020 [0 - 0.13], LDH - 176 [0 - 250], Proteina C reactiva - 0.26 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.1 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) 107.5 [70 - 130] , - INR (plasma) 0.97 [0.8 - 1.2], Uree - 33 [0 - 50], VSH - 3 [1 - 15] 29.07.2020 Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG - Nonreactiv (Index=0.564) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > = 1.2 Reactiv -], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Nonreactiv (Index=0.342) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > = 1.2 Reactiv -] . Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Nonreactiv (Index=0.342) [EEGG EEGO . Rx T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 27.07.2020RG. PULMD=3.7 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr.Cord de aspect rgr.normal.					
- 17.6], - Hematocrit 40.8 [39.0 - 51.0], - VEM 87.6 [82.0 - 98.0], - HEM 30.9 [25.0 - 33.0], - CHEM 35.3 [31.6 - 35.8], - RDW-CV% 12.8 [9.9 - 15.5], - Trombocite 203 [150 - 450], - MPV 7.6 [6.5 - 14.0], - NEUT% 70.79 [40 - 70], - LYMPH% 20.61 [20 - 40], - MONO% 7.67 [3.0 - 10.0], - EO% 0.60 [0 - 5], - BASO% 0.33 [0 - 2], - NEUT# 4.307 [1.5 - 6.6], - LYMPH# 1.254 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.467 [0.21 - 0.92], - EO# 0.037 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.020 [0 - 0.13], LDH - 176 [0 - 250], Proteina C reactiva - 0.26 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.1 [9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 107.5 [70 - 130], - INR (plasma) 0.97 [0.8 - 1.2], Uree - 33 [0 - 50], VSH - 3 [1 - 15] 29.07.2020 Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG - Nonreactiv (Index=0.564) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Nonreactiv (Index=0.342) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -] Examene paraclinice: EKG ECO Rx T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 27.07.2020RG. PULMD=3.7 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr.Cord de aspect rgr.normal.		Glicemie - 99 [70 - 105], GOT - 23 [0 - 45], GPT - 44 [0 - 45], Hemoleucograma			
], - CHEM 35.3 [31.6 - 35.8], - RDW-CV% 12.8 [9.9 - 15.5], - Trombocite 203 [150 - 450], - MPV 7.6 [6.5 - 14.0], - NEUT% 70.79 [40 - 70], - LYMPH% 20.61 [20 - 40], - MONO% 7.67 [3.0 - 10.0], - EO% 0.60 [0 - 5], - BASO% 0.33 [0 - 2], - NEUT# 4.307 [1.5 - 6.6], - LYMPH# 1.254 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.467 [0.21 - 0.92], - EO# 0.037 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.020 [0 - 0.13], LDH - 176 [0 - 250], Proteina C reactiva - 0.26 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.1 [9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 107.5 [70 - 130], - INR (plasma) 0.97 [0.8 - 1.2], Uree - 33 [0 - 50], VSH - 3 [1 - 15] 29.07.2020 Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG - Nonreactiv (Index=0.564) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Nonreactiv (Index=0.342) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -] Reactiv -] Examene paraclinice: EKG ECO Rx T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 27.07.2020RG. PULMD=3.7 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr.Cord de aspect rgr.normal.		completa - Leucocite 6.1 [3.7 - 9.5] , - Hematii 4.65 [4.32 - 5.66] , - Hemoglobina 14.4 [13.3			
], - MPV 7.6 [6.5 - 14.0], - NEUT% 70.79 [40 - 70], - LYMPH% 20.61 [20 - 40], - MONO% 7.67 [3.0 - 10.0], - EO% 0.60 [0 - 5], - BASO% 0.33 [0 - 2], - NEUT# 4.307 [1.5 - 6.6], - LYMPH# 1.254 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.467 [0.21 - 0.92], - EO# 0.037 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.020 [0 - 0.13], LDH - 176 [0 - 250], Proteina C reactiva - 0.26 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.1 [9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 107.5 [70 - 130], - INR (plasma) 0.97 [0.8 - 1.2], Uree - 33 [0 - 50], VSH - 3 [1 - 15] 29.07.2020 Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG - Nonreactiv (Index=0.564) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > = 1.2 Reactiv -], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Nonreactiv (Index=0.342) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > = 1.2 Reactiv -] Reactiv -] Reactiv -] Examene paraclinice: EKG ECO Rx T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 27.07.2020RG. PULMD=3.7 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr.Cord de aspect rgr.normal.		- 17.6], - Hematocrit 40.8 [39.0 - 51.0], - VEM 87.6 [82.0 - 98.0], - HEM 30.9 [25.0 - 33.0			
MONO% 7.67 [3.0 - 10.0] , - EO% 0.60 [0 - 5] , - BASO% 0.33 [0 - 2] , - NEUT# 4.307 [1.5 - 6.6] , - LYMPH# 1.254 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.467 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.037 [0.00 - 0.67] , - BASO# 0.020 [0 - 0.13], LDH - 176 [0 - 250], Proteina C reactiva - 0.26 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.1 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) 107.5 [70 - 130] , - INR (plasma) 0.97 [0.8 - 1.2], Uree - 33 [0 - 50], VSH - 3 [1 - 15] 29.07.2020 Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG - Nonreactiv (Index=0.564) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Nonreactiv (Index=0.342) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -] Examene paraclinice: EKG ECO Rx T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 27.07.2020RG. PULMD=3.7 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr.Cord de aspect rgr.normal.], - CHEM 35.3 [31.6 - 35.8], - RDW-CV% 12.8 [9.9 - 15.5], - Trombocite 203 [150 - 450			
1.5 - 6.6], - LYMPH# 1.254 [1.1 - 3.5], - MONO# 0.467 [0.21 - 0.92], - EO# 0.037 [0.00 - 0.67], - BASO# 0.020 [0 - 0.13], LDH - 176 [0 - 250], Proteina C reactiva - 0.26 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.1 [9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 107.5 [70 - 130], - INR (plasma) 0.97 [0.8 - 1.2], Uree - 33 [0 - 50], VSH - 3 [1 - 15] 29.07.2020 Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG - Nonreactiv (Index=0.564) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Nonreactiv (Index=0.342) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -] Examene paraclinice: EKG ECO Rx T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 27.07.2020RG. PULMD=3.7 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr.Cord de aspect rgr.normal.], - MPV 7.6 [6.5 - 14.0], - NEUT% 70.79 [40 - 70], - LYMPH% 20.61 [20 - 40], -			
0.67], - BASO# 0.020 [0 - 0.13], LDH - 176 [0 - 250], Proteina C reactiva - 0.26 [0 - 1], Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.1 [9.4 - 13.6], - PT (%) (plasma) 107.5 [70 - 130], - INR (plasma) 0.97 [0.8 - 1.2], Uree - 33 [0 - 50], VSH - 3 [1 - 15] 29.07.2020 Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG - Nonreactiv (Index=0.564) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Nonreactiv (Index=0.342) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -] Examene paraclinice: EKG ECO Rx T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 27.07.2020RG. PULMD=3.7 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr.Cord de aspect rgr.normal.		MONO% 7.67 [3.0 - 10.0] , - EO% 0.60 [0 - 5] , - BASO% 0.33 [0 - 2] , - NEUT# 4.307 [
Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.1 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) 107.5 [70 - 130] , - INR (plasma) 0.97 [0.8 - 1.2], Uree - 33 [0 - 50], VSH - 3 [1 - 15] 29.07.2020 Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG - Nonreactiv (Index=0.564) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Nonreactiv (Index=0.342) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -] Examene paraclinice: EKG ECO Rx T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 27.07.2020RG. PULMD=3.7 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr.Cord de aspect rgr.normal.		1.5 - 6.6] , - LYMPH# 1.254 [1.1 - 3.5] , - MONO# 0.467 [0.21 - 0.92] , - EO# 0.037 [0.00 -			
130], - INR (plasma) 0.97 [0.8 - 1.2], Uree - 33 [0 - 50], VSH - 3 [1 - 15] 29.07.2020 Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG - Nonreactiv (Index=0.564) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Nonreactiv (Index=0.342) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -] Examene paraclinice: EKG ECO Rx T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 27.07.2020RG. PULMD=3.7 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr.Cord de aspect rgr.normal.		0.67] , - BASO# 0.020 [0 - 0.13], LDH - 176 [0 - 250], Proteina C reactiva - 0.26 [0 - 1],			
29.07.2020 Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG - Nonreactiv (Index=0.564) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Nonreactiv (Index=0.342) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -] Examene paraclinice: EKG ECO Rx T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 27.07.2020RG. PULMD=3.7 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr.Cord de aspect rgr.normal.		Timp de protrombina - PT (sec) (plasma) 11.1 [9.4 - 13.6] , - PT (%) (plasma) 107.5 [70 -			
Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG - Nonreactiv (Index=0.564) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Nonreactiv (Index=0.342) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -] Examene paraclinice: EKG ECO Rx T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 27.07.2020RG. PULMD=3.7 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr.Cord de aspect rgr.normal.		130], - INR (plasma) 0.97 [0.8 - 1.2], Uree - 33 [0 - 50], VSH - 3 [1 - 15]			
<pre>< 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Nonreactiv (Index=0.342) [</pre>		29.07.2020			
Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 - < 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -] Examene paraclinice: EKG ECO Rx T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 27.07.2020RG. PULMD=3.7 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr.Cord de aspect rgr.normal. Altele		Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG - Nonreactiv (Index=0.564) [Index < 0.8 Nonreactiv>= 0.8 -			
Examene paraclinice: EKG ECO Rx T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 27.07.2020RG. PULMD=3.7 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr.Cord de aspect rgr.normal. Altele		< 1.2 Incert > =1.2 Reactiv -], Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM - Nonreactiv (Index=0.342) [
EKG ECO Rx T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 27.07.2020RG. PULMD=3.7 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr.Cord de aspect rgr.normal. Altele		Index < 0.8 Nonreactiv $>= 0.8 - < 1.2$ Incert $> =1.2$ Reactiv -]			
Rx T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 27.07.2020RG. PULMD=3.7 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr.Cord de aspect rgr.normal. Altele	Exame	ene paraclinice:			
Rx T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 27.07.2020RG. PULMD=3.7 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr.Cord de aspect rgr.normal. Altele	EKG				
T03501 - radiografia toracica ~ Rezultat: 27.07.2020RG. PULMD=3.7 Gym2Fara leziuni pleuro-pulmonare evidente rgr.Cord de aspect rgr.normal. Altele	ECO				
evidente rgr.Cord de aspect rgr.normal. Altele	Rx				
Altele					
Frotoment efectuat	Altele				
	Treter	nent efectuat			

Alte informatii referitoare la starea de sanatate a asiguratului: EPICRIZA

Pacient in varsta de 28 de ani, fara APP semnificative, se prezinta in serviciul nostru pentru infectie cu virus SARS CoV-2 (testare rtPCR SARS CoV-2 detectabil in data de 24.07.2020 in serviciu priva- Regina Maria). Afirmativ pacientul este asimptomatic. Din ancheta epidemiologica retinem ca nu a avut contact cu persoane cu simptomatologie respiratorie sau cu persoane suspecte/confirmate cu infectie COVID19.

Obiectiv, la internare, stare generala buna, afebril, constient, cooperant, OTS, stabil hemodinamic si respirator, TA= 124/73 mmHg, AV= 82 bpm, SaO2= 98%, zgomote cardiace ritmice, bine batute, MV fiziologic, abdomen liber, mobil cu respiratia, fara sensibilitate la palparea superficiala si profunda, Giordano negativ bilateral, loje renale libere, fara semne de focar neurologic, fara semne de iritatie meningiana.

Biologic: hemoleucograma si coagulograma fara modificari, functie renala si hepatica in limite normale.

Se efectueaza radiografie pulmonara in data de 27.07.2020 care nu evidentiaza leziuni pleuro-pulmonare.

Pe parcursul internarii pacientul s-a mentinut asimptomatic. A urmat tratament timp de 2 zile cu Vitamina C 1000mg, 1x1/zi.

Tratament recomandat

Conform Ordinului 1321/22.07.2020 se indica izolare la domicliu/locatia declarata pe o perioada de 11 zile de la externare (pana la implinirea a 14 zile de la momentul internarii). In aceasta perioada nu se va parasi domiciliul/locatia declarata.

Acestia pot desfasura activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, dupa incheierea perioadei de izolare.

Dupa ce ajungeti acasa se recomanda efectuarea dusului, hainele cu care ati plecat acasa se vor pune intr-un sac impermeabil (fara a fi scuturate). Hainele (inclusiv hainele care pe care le-ati folosit in spital) se vor pastra in sac intr-un loc separat (preferabil pe balcon) timp de 5 zile, ulterior vor fi spalate la masina de spalat haine (la cea mai mare temperatura permisa de producator) cu dezinfectant pentru haine si calcate ulterior. Se vor folosi manusi pentru manipularea hainelor, care ulterior vor fi aruncate si va veti spala pe mcu apa si sapun. Telefonul, ceasul si alte obiecte electronice se vor dezinfecta cu servetele impregnate cu alcool.

Masuri de igiena individuala de respectat la domiciliu:

Sa se evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuinta si, daca este posibil, sa se izoleze camera separata, cu baie separata.

Daca se foloseste aceeasi baie, aceasta va fi dezinfectata dupa folosire, se va dezinfecta toaleta si toate obiectele atinse (inclusiv clante, intrerupatoare). Dezinfectarea se va face cu solutii pe baza de clor (ex. Domestos) sau alcool (min 70 %).

Sa nu primeascvizitatori in perioada de izolare la domiciliu/locatia declarata.

Sa se spele pe maini cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar (dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).

Sa curate si sa dezinfecteze zilnic toate suprafetele pe care le atinge frecvent (ex: mese, clante, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse si de alte persoane).

Sa isi acopere gura si nasul cu servetel de unica folosinta sau cu o tesatura atunci cand stranuta sau tuseste, sau sa stranute si sa tuseasca in plica cotului. Batista se arunca imediat la gunoi, in sac de plastic, dupa care se spala pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde.

Sa pastreze distanta de minim 1,5 m atunci cand se intalneste cu alte persoane.

Sa poarte masca cand se intalneste cu alte persoane. Masca trebuie sa acopere nasul si gura.

Purtarea mastii este una dintre masurile de prevenire si limitare pentru raspandirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea determinata de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei masti nu este suficienta pentru a asigura un nivel adecvat de protectie si ar trebui adoptate si alte masuri la

fel de relevante. Folosirea mastii trebuie combinata cu igiena adecvata a mainilor si cu alte masuri de prevenire si control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.

- -in timpul utiliztrebuie sa evitati atingerea mastii;
- -sa indepartati masca folosind tehnica adecvata (nu atingeti partea din fata, ci indepartati snururile din spate), actiune urmata de spalarea IMEDIATA a mainilor cu apa si sapun;
- -sa nu reutilizati mastile de unica folosinta. Masca se schimba la maxim 4 ore sau mai repede caz de umezire.

S-a eliberat concediu medical pe perioada 30.07.2020-09.08.2020

Monitorizarea dupa externare:

Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domicliu se face de catre medicul de familie zilnic, prin sistemul de telemedicina. Pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie vor fi monitorizati zilnic de catre DSP judeteana. In cazul aparitiei unor probleme de sanatate se va lua legatura telefonica cu medicul de familie sau se va suna la 112.

Nota: Se va specifica durata pentru care se poate prescrie de medicul din ambulatoriu, inclusiv medicul de familie, fiecare dintre medicamentele recomandate

indicade pend d revenire la internare	
X Nu, nu este necesara revenirea pentru internare	
Se completeazã obligatoriu una din cele douã informati S-a eliberat prescriptie medicalã, caz în care se v Nu s-a eliberat prescriptie medicala deoarece nu X Nu s-a eliberat prescriptie medicala Se completeazã obligatoriu una din cele douã informati X S-a eliberat concediu medical la externare, caz în Nu s-a eliberat concediu medical la externare de Nu s-a eliberat concediu medical la externare Se completeazã obligatoriu una din cele douã informati S-a eliberat recomandare pentru ingrijiri medical Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medical Nu s-a eliberat recomandare pentru îngrijiri medical S-a eliberat prescriptie medicalã pentru dispoziti Nu s-a eliberat prescriptie medicalã pentru dispoziti Nu s-a eliberat prescriptie medicalã pentru dispoziti Nu s-a eliberat prescriptie medicalã pentru dispoziti	a înscrie seria si numarul acesteia a fost necesar : CCMAM 4945127,CCMAM 4945128 a care se va înscrie seria si numarul acestuia barece nu a fost necesar :: te la domiciliu/paliative la domiciliu icale la domiciliu/paliative la domiciliu, :: ve medicale in ambulatoriu
viza Unitatii judetene de implementare a programului, p	entru diabet)
Unitate judeteana de diabet zaharat:	
Nr. inregistrare al asiguratului:	

Data 29.07.2020

(cu

Sef sectie: Medic curant:

Asist. Univ. Dr. IACOB TEODORA

Medic rezident:

Medic specialist

Dr. IACOS TEDDORA Medic Specialist Reliable ESDISO

Dr. MONICA MUNTEAN medic primar bolt infectioase cod 828242

Sef Lucrari Dr. MUNTEAN MONICA

Calea de transmitere:	
prin asigurat	
prin posta	

*) Scrisoarea medicala se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care a efectuat consultatia/serviciul în ambulatoriul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate.

Scrisoarea medicala sau biletul de iesire din spital sunt documente tipizate care se întocmesc la data externarii , într-un singur exemplar care este transmis medicului de familie / medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct ori prin intermediul asiguratului;